





VERMONE B. 9























*GH 148*

N. d' inventario

8243

*Note di Botanica*





8243

*Note to the Editor*

81.5. III

Tab.  
54  
f. 4.

Tab.  
58.  
fig. 1.  
page



# Lichen-Agaricus.



## Ordo I. Pag. 104.

*Lichenes agarici erecti, ramosi, & non ramosi.*

1. Lichen-agaricus nigricans, ligno adnascens, plerumque multifidus, & compressus, in parte villosus, summa vero glaber, albidus, et pubescentulus  
Tab. 55. f. 1. .... Clavaria hypoxylon Linn.

In putrescentibus lignis.

2. Lichen-agaricus, qui Licophioides terrestris, digitatus, nigrum (Tab. 54. f. 4)

3. Lichen-agaricus nigricans, cypressiformis, ramosus, & non ramosus, lignis aridis adnascens Tab. 55. Fig. 2.

In Quercineis lignis.

Tab. 54. f. 4. 4. Lichen-Agaricus terrestris, digitatus, niger, apicibus albo-rufis, seminibus griseis, undique confertis conspersis, radice membranacea, longissima, varie divaricata, & implexa.

In umbrosis ambularis, ubi radicem suam usque ad cubitalem longitudinem in humo demittit.

## Ordo II.

*Lichenes agarici, alii tuberosi, alii crustacei, receptaculis florum vel supra, vel infra superficiem locatis.*

Lichen-Agaricus tuberosus, niger, Agarici officinalis facie, cortice nitido, et fere splendente.

Ad segetarum arborum caudices erigitur.

Tab. 55. fig. 1. 2. Lichen-agaricus crustaceus, initio subhirsutus, & olea condita coloris, per siccitatem glaber, niger, & veluti deustus, receptaculis florum mammiformibus elegantissimis.

pag. 106. Ad emortuas Lauri radices &c.



*Hypoxylon  
ustulatum  
Williard.*

3. *Lichen-agaricus crustaceus, crassus, Boonum renem &c. Vid. Bull. p. 30.* Tab. 54. Fig. 1.  
*Ad emortuas fagi radices frequens in Vallepidii.*

4. *Lichen-agaricus crustaceus, crassus, lignis emortuis adnascens, albus.*  
*Ad putrida Castanearum ligna.*

5. *Lichen-agaricus crustaceus, niger, et veluti daustus, sub soluta <sup>Castanearum</sup> arborum dejectarum cute innascens, capsulis oblongis, cylindraceis et late se diffundens.*

6. *Lichen-agaricus crustaceus, niger, et veluti daustus, sub soluta arborum dejectarum cute innascens, capsulis oblongis, cylindraceis.*

7. *Lichen-agaricus, obscurus, in arborum corticibus, et praecipue ad Flices innascens, Superficie savi, et veluti subhirsuta.* Tab. 55. Fig. 2.

*Variolaria punctata Bull.* 8. *Lichen-agaricus, bullatus, parvus, ex obscuro-nigricans. &c.* ... Tab. 54. f. 2.  
*In corticibus Fagi.*

9. *Lichen-agaricus terrestris, scutatus, albus. ... In agnis Martis.* Tab. 54. f. 3.

### Ordo III.

*Lichenes-agarici non crustacei, sed caespitosi; receptaculis florum in Superficie.*

1. *Lichen-agaricus caespitosus, acaulis, nigricans sub cute Anagyridis non foetidae erumpens.* T. 54. f. 5.

2. *Lichen-agaricus ~~non~~ caespitosus, acaulis, ruber, sub cute Anagyrinis foetidae erumpens.*

3. *Lichen-agaricus caespitosus, acaulis, ruber, in Abietum corticibus innascens, receptaculis florum sphaericis & artidis.*

4. *Lichen-agaricus caespitosus, acaulis, ex rubro-ferrugineus, in arborum caulis innascens. Ad Ulmos, et Castaneas plerumque oritur.*

5. *Lichen-agaricus caespitosus, acaulis, nigricans, et dum sub arborum cute erumpit, pulvisculo farinaceo, quo est involutus se se exonerat.*

*In variis arborum exsiccatarum ramis.*

### Lichenoides

1. *Lichenoides crustaceum, arboribus adnascens, tenuissimum, ex cinereo-nigrum, capsulis majoribus et minoribus* T. 56. Fig. 1.

*In sylvis ad arbores, et praecipue ad Coriflos.*

pag. 106. 2. *Lichenoides crustaceum, arboribus adnascens, tenuissimum, ex cinereo-album, capsulis majoribus, crebris.*



pag. 106. 3. Lichenoides crustaceum, arboribus adnascens, tenuissimum, ex cinereo-rufum, Tab. 56.  
Capsulis exiguis, crebris . . . fig. 2.

## Agaricum.

### Ordo I.

p. 107. Agarica duplici substantia praedita, quorum pars inferior a superiori facile separa-  
bilis, & innumeris, cylindraceis, angustissimis, et in ore marginatis tubulis inter se se-  
gregabilibus composita, in quibus continentur ovata, et minutissima semina, ut in  
Sullo demonstrabimus.

p. 117. Agaricum esculentum, castanea adnascens, latissimum, hepatis facie, superne ex  
rubro-ferrugineum, interne sanguineum, subus ochroleucum. . . . . Tab. 60.

### Ordo II. . . . . Boletus Linn. . . . . Bulliard. &c.

p. 118. Agarica simpliciter substantia, quorum inferior pars in nonnullis speciebus breviter, in aliis  
altius perforata, in omnibus vero ex angustissimis et cylindraceis tubulis invicem con-  
junctis, ut in Anurina Indica facta constat, quibus tubulis adherent semina.

1. Agaricum igniarium, Agarici officinalis facie, sed non amarum, superne ex  
albo-cinereum, et glabrum, inferne primum ejusdem coloris, deinde obscurum, argutissi-  
me & densissime perforatum, foraminulis rotundis

Agar. pedis Equini facie. Tourn. & R. H. 262.

Fungus in caudicibus nascens unguis equini figura. C. B. Pin. 372.

2. Agaricum Quercubus, & Illicibus adnascens, ferrugineum & glabrum, inferne  
album, & argutissime, & densissime perforatum, foraminulis rotundis. Esca bastarda.

3. Agaricum Qelsis, seu Moris adnascens, ex obscuro-ferrugineum, inferne al-  
bum, tenuissime, et densissime perforatum, foraminulis rotundis. . . . . Lingua di Moro cattiva.

4. Agaricum Quercubus & Illicibus adnascens figura varians, superne ferrugi-  
neum, inferne album, & argutissime & densissime perforatum, foraminulis rotundis.

Fungus Ventilabii figuram habens. Aldrov. Dendr. 120. Lingua lignosa di quercia gambara.

5. Agaricum flabelliforme, superne e rufo-flavum, cute laevis, & veluti  
subhirsuta, inferne album, et tenuissime porosum, foraminulis rotundis, pediculo bre-  
viori ad latera donatum. . . . . Lingua di Cerro.

Augusto. Ad Cerros, & ad alias glandiferas arbores erumpit.

6. Agaricum squamosum, Illicibus, Lauris, et Oxijacanthae plerumque in-  
nascens, superne hirsutum, et obscurum, subus ex fulvo-aureum, densissime, et te-  
nuissime perforatum, foraminulis rotundis, brevissimis.

Bol. hirsutus  
Scopoli



Pag. 118. 7. Agaricum Gelsis, seu Moris adnascens, squamosum, & lignosum sordide luteum ubique, superne subhirsutum, inferne tenuissime, densissime, & breviter perforatum, foraminulis rotundis.

8. Agaricum tuberosum, crassum, odoratum, tenacioris substantiæ, intus & extra egriseo-rufescens, inferne tenuissime, densissime, & superficialiter perforatum, foraminulis rotundis. — Ad Ulmorum radices, iuxta aqueas foveas.

Pag. 119. 9. Agaricum tuberosum, durum, Prunis, aut Malis adnascens, initio album, deinde e fulvo-flavescens, inferne perbrevis, rotundis, atque angustissimis foraminulis munitum. — In Pomariis, atque in agris ad prædictas arbores in.

10. Agaricum Esculentum, flabelliforme, superne fulvum, cute lacea, & veluti squamosa, inferne album, tenuissime, densissime, ac rotunde perforatum, pedicula concolore, obeso. — Septembri & Martio fuit, tum in hortis, tum in agris arumq[ue].

11. Agaricum squamosum, superne sericeum, & versicolor, inferne album, foraminulis brevibus, densissimis, angustissimis, et quasi pentagonis.

12. Agaricum squamosum, & bichenosum, superne hirsutum, & album, inferne griseo-plumbeum, foraminulis rotundis, densissimis, brevissimis, ac peræquis.

13. Agaricum squamosum, cespitosum, Esculentum, cristatum, & laciniatum superne obscurum, inferne album, foraminulis brevissimis, rotundis, æquis, ac densioribus. — Autumnalis. — Garvel. icon. 1272?

14. Agaricum squamosum, superne album, & villosum parvi coloris, inferne aurum, tenuissime, ac densissime perforatum, foraminulis brevissimis, rotundis. — Autumno.

15. Agaricum squamosum, superne album & villosum, inferne cæruleum, tenuissime, ac densissime perforatum, foraminulis brevissimis, rotundis.

16. Agaricum squamosum, albidum, superne villosum, & per longitudinem sulcatum, inferne foraminulis rotundis, angustis, brevibus, ac densis.

17. Agaricum squamosum, superne villosum, per longitudinem sulcatum, album, inferne dilute griseum, & foraminulis rotundis, densissimis, ac minutissimis insculptum. Ad Pyros veteres. februario.

18. Agaricum crustaceum, placensiforme, superficie in semiglobulos veluti subdivisa, foraminulis rotundis, et densioribus.

19. Agaricum Gelsis, seu Moris adnascens, subpurpureum, superne hirsutum, inferne porosum, foraminulis angustis, rotundis. — Pellicia di Re.



pag. 119.

## Ordo III.

Boletus  
Laricis

Agaricia Simplicii Substrata, quorum inferior pars, modo late, modo anguste  
& varie perforata, in ipsius foraminulis autem adherent semina ut supra.

Agaricum, sive fungus Laricis.

Tab. 61.

pag. 120. 2. Agaricum caespitosum, maximum, esculentum, Abietibus adnascens,  
Superne rufescens, & veluti filamentosum, inferne album, varie, et argute  
perforatum. — Autumni tempore.

3. Agaricum Dadaletis Sinubus excavatum. In dom. quam in spont.  
Arboribus nascitur.

4. Agaricum esculentum, Gelsis, seu Moris adnascens, luteum, tinc-  
torium, Superne villosum, inferne subasperum, alius perforatum, forami-  
nulis angustis, et ore inaequalibus.

Rustici Mulieres non solum hoc Agaricum coquunt ad Esu, sed  
etiam ad pannos lineos, colore sordide luteo tingendos: ideoque dicitur  
Lingua di Moro bona attingere, & a mangiare.

5. Agaricum tuberosum, esculentum, album, inferne brevissime, ac  
tenuissime varie perforatum. — Ad Cerros estate plerumque.

6. Agaricum squamosum, Superne aurum, et in aliqua parte  
rubore vivacissimo perfusum, inferne ochroleucum, et favi ad instar  
perforatum, foraminulis brevibus, densis, et angustis. Aestivus.

7. Agaricum squamosum, crispum, Superne album, & lanuginos-  
um, inferne primum ejusdem coloris, postea rufescit, tenuissime, elegan-  
ter & varie perforatum. — Decembri.

8. Agaricum esculentum, candidum, flabelli forme, multiplex  
pediculo donatum, & favi modo ample perforatum — junio — Tab. 61.  
f. 2.

Boletus  
imbricatus  
Scopul.  
Var. 1.

9. Agaricum squamosum, crassum, & mollius in Rosam plerumque  
congestum, lobis cristatis, alius radicum, ex rufo-ferrugineum, inferne  
tenuissime, et varie perforatum. — ad Olea radices — Decembri.

10. Agaricum squamosum, crassum, et mollius, in Rosam plerum-  
que congestum, lobis cristatis, alius radicum, album, inferne tenuissime  
et varie perforatum. — Loco, ubi anterior.

11. Agaricum squamosum, album, Superne non striatum, sed instar  
serici nitens, inferne pulchre, et tenuissime perforatum.

Tempore brumali in variis Arborum caudicibus.



12. Agaricum Squamosum, villosum, <sup>esulentum, album, inferne pat-</sup> ~~superne non striatum, sed instar~~ ~~serici nitens~~ lesiens, pulchre, varie, & omnium angustissime perforatum.
13. Agaricum Squamosum, superne album & villosum, inferne griseum subtilissime, pulchre, & diversimode perforatum, foraminulis brevioribus, ac densioribus. . . . . Ad Castaneas.
14. Agaricum Squamosum purpureum, superne lanugine sericea praeditum, inferne subtilissime, densissime, & varie perforatum, ~~foraminulis brevioribus, ac densioribus~~. In arborum stipitibus.
15. Agaricum Squamosum pediculo donatum, rufescens, inferne albidum, & varie perforatum. . . . . Ad quercus.
16. Agaricum Squamosum, durum, totum album, superficialiter in filamenta tenuissima serici instar veluti scissum, inferne accurissime, & varie perforatum. . . . . In agris super putrida ligna.
17. Agaricum terrestre album, crassum, lichenis facie, varie perforatum, foraminulis usque ad supernam superficiem excurrentibus. . . . . In sylvis. Octob.
18. Agaricum Squamosum, & villosum, album primum, postea ad fulvum vergens, inferne favi instar perforatum, foraminulis densis, brevibus, & angustis. . . . . Autumni tempore in Acerum Campestrium semimortuorum caudicibus, necnon vitium columnis, & quandoque in sylvis ad glandiferas arbores.
19. Agaricum Squamosum Gelsis, seu Moris innascens, superne album, & villosum, inferne griseum, densissime & pulchre perforatum.
20. Agaricum Squamosum, superne variegatum, & instar serici nitens subris album, pulchre, & tenuissime perforatum.
21. Agaricum lichenis facie, rufescens, cartilagineum, verrucosum, & varie perforatum. . . . . ad & Flices.
22. Agaricum terrestre lichenis facie, minimum, album, in humidis proveniens, varie perforatum. . . . . In humectis, ad aquarum scaturig. & stillicidia.
23. Agaricum Crustaceum, durum, varie perforatum, opibus Equinis innascens.
24. Agaricum Crustaceum, album, tenuioris substantie, varie perforatum. Super & inter semiputrida quercus folia & ligna viget.



## Ordo IV.

7.

*Agarica simplicis substantia, & ex pluribus laminis, vel asperculis instat superpositis  
Constantia, quorum singuli ex una, usque ad alteram superficiem ita densissime  
& tenuissime perforati, ut quasi cylindraceis tubulis inter se colligatis, quæ  
madidum in Arundine Jlica, compositi videantur, in quorum cavitate  
Semina continentur ut supra.*

*Agaricum durum, crassum, assulatum, Filicibus innascens, griseum. Tab. 62.  
Per plures annos vixit in arborum caudicibus.*

## Ordo V.

*Agarica simplicis substantia, ubique spongiosa, quorum in foraminulorum  
superficie adherant semina.*

1. *Agaricum album, terrestre, medullam pavis reficiens ..... Autumn. ad Madic. Arbor. - Tab. 63. f. 2.*
2. *Agaricum spongiosum, nigrum, in plantarum diversarum caulis  
parti innascens, eamque amplectens. - - - Tine, Orce, gramine, - Tab. 63.  
Vicia maritima, cyclamino, aliisque consimilibus plantis adnascitur, easque am. f. 1.  
-plectitur, ut in Icône patet.*
3. *Agaricum album, spongiosum, Brenella plerumque adnascens.  
Sub Pinis, &c. julis.*

## Ordo VI.

*Agarica singulari substantia; semina adherent superficiem denticulorum, vel teretium, vel planorum.*

1. *Agaricum esculentum, album, clavos effigie, aculeis longis, innoxius, munitum. - - - Tab. 64. fig. 1.*
2. *Agaricum esculentum, album, capitosum, multifidum, & denticulatum, denticulis asperis - - - Ad Filices, & ad Moros, sed rarum, etiam - que super fagos, & albetes. Tab. 64. fig. 2.*
3. *Agaricum esculentum, latum, maximum, superne, & inferne Capreolini coloris, denticulis longioribus, teretibus, pediculo breviori ad latera donatum.*
4. *Agaricum squamosum, album, superne villosum, inferne denticulis longioribus, & planis proeditum. Tab. 64. f. 3.*
5. *Agaricum squamosum, album, superne subhirsutum, inferne inferne pectinatum. - - - Ad Vitiæ pedamenta. Tab. 64. f. 4.*







8. Agaricum squamosum, ex rufo-fulvescens, Squamis amplioribus & longioribus, laciniatis, non hirsutis, inferne lamellatis — bis.

9. Agaricum squamosum, fulvum, lobis pectunculiforma, superne hirsutum, inferne lamellatum. — Ad quercus viger verno tempore.

10. Agaricum squamosum, esculentum, non hirsutum, totum album. — Ad quercus.

11. Agaricum squamosum, superne album, et villosum, inferne lamellis densis, aureis, et undosis.

Ag. lingua 12. Agaricum squamosum, Squamis parvis, superne fulvis & glabris, inferne lamellis purpureis. — Ad Populos nigras semimortuas. Tab. 65. f. 3.

13. Agaricum esculentum, carnosum, album, desuper globulosum, subter lamellatum. — Ad caudices Mali Armeniaci.

14. Agaricum squamosum, & laciniatum, superne album, & villosum, inferne lamellis subruptis. — Ad Pinus & quercus. Tab. 65. f. 4.

15. Agaricum squamosum juglandibus adnascens, totum album, superne villosum, inferne lamellis cartilagineis.

16. Agaricum infundibulum dimidiatum imitans, per oras undulatum, Tab. 65. f. 5. superna parte obscurum, & veluti sericum, inferne lamellatum, & album.

17. Agaricum infundibuliforme, ad oras undulatum, superne gilvum, inferne album, & tenuissime lamellatum.

18. Agaricum squamosum, rufescens, pediculo donatum, subter lam. densis. — Ad detruncatas arbores, & in campestribus ad Vrium Colum- nas. Tab. 65. f. 7.

agar. 19. Agaricum cespitosum, sordide luteum, Cochlearis, vel spatulae forma, glabrum — Ad quercus. Tab. 65. f. 6.

Cespitosus } 20. Agaricum cespitosum fulvum, cochlearis, vel spatulae forma, hirsutum. — Cum superiori. Tab. 65. f. 8.

21. Agaricum squamosum, adiposum, lamellatum, foetidum, fulvum. Agaricum squam. adipos. foetid. superna limbi parte ramosa, supra baland ossa adhuc pinguedine repleta natum. H. Pis. Tab. 3.



## Ordo VIII.

*Agarica* singulari substantia, nullis foraminulis, denticulis, et lamellis interrupta, sed laevi, quaedam superne, quaedam infernae superficie semina donata.

1. *Agaricum auriculæ-forma* - - - - - T. 66. f. 1.
2. *Agaricum membranaceum, violaceum, minimum,*  
ad detumescens *Filicum* radices, necnon ad columnas vitium
3. *Agaricum gelatinosum, membranaceum, aureum, sinuatum, & crispum.*  
*ostoch luteum, mesenterii-forma.* Bot. Paris. Tab. XIV. f. 4. — Fungo giallo in-  
-crispato di gelatina. — In defectis, & semiputridis arboribus — hyemale.
4. *Agaricum gelatinosum, cepitosum, infundibulum dimidiatum reficiens,*  
sordide aureum. — *Abietinum, ad caudices.*
5. *Agaricum squamosum, & lichenosum, substantia gelatinosa superne* T. 66.  
variegatum, & villorum, inferne primum violaceum, postea griseum, & mesenterii f. 4.  
instar cornigatum. — ad illinos, &c.
6. *Agaricum, & lichenosum, rufum.* — In *Filicibus*, &c. —
7. *Agaricum alpinum squamosum, membranaceum, superne obscurum,* T. 66.  
& sericeum, inferne ex albo-rufescens. — f. 2.
8. *Agaricum squamosum, & lichenosum, membranaceum, superne chisu-*  
tum, & variegatum, inferne subobscurum, & instar lintei sericei nitens.
9. *Agaricum Lichenis facie caeruleum* — Post pluvias in Pergularum lignis. T. 66.  
f. 6.
10. *Agaricum Lichenis facie cinereum.* — In *Filicum* caudicibus.
11. *Agaricum Lichenis facie aureum.* — Ad truncata ligna.
12. *Agaricum Lichenis facie rufescens, lava, mollionis substantia.*
13. *Agaricum Lichenis facie, sordidissimum, rugosum, & verrucosum* T. 66.  
odoratum — In Pergularum lignis &c. — f. 7.
14. *Agaricum terrestre Lichenis facie album.*
15. *Agaricum Lichenosum album, eleganter laciniatum.* — Tab. 66.  
Humili tempore inter humum, & putrida folia late se diffundit ac crescit. f. 6.
16. *Agaricum coriaceum, latissimum, rufescens, in emortuorum fagorum*  
Ligni substantia crescit. Cum sequenti.



- p. 128. 17. Agaricum membranaceum, dichotomum, & radiceum, in emortuorum  
 fagorum ligni substantia crevit — In jugis varium, Supradictum vero magis  
 obrium.
18. Agaricum terrestre, erectum, membranaceum, fulvum, ensiforme,  
 in summitate bifidum.
19. Agaricum luteum, radicibus arborum fibrosis simile, inter humum  
 & lignum, vel lapidas innascens.
20. Agaricum nigrum, reticulatum, compressum, emortuis arboribus T. 66  
 inter corticem & lignum, interdum in ipso ligno innascens ac late se diffundens f. 3.  
 Fungus niger compressus, varie divaricatus, & simplex inter lignum & corti-  
 cem. Hist. Synops. ed. 7. App. 333. et ed. 3. 13.  
 Fungus ramosissimus niger, compressus, in cribrum veluti formatus. Epist.  
 Hist. Tom. 3. 21.
21. Agaricum nigrum, reticulatum, non compressum. —  
 Quercuum Cavernis innascens ac late se diffundens. — varium.
22. Agaricum candidum, radicibus arborum fibrosis simile, inter hu-  
 mum & lignum, vel lapideum innascens.
23. Agaricum album, reticulatum, hirsutum, & fistulosum.  
 In testarum fungis inter saxa ad obstruenda earundem testarum foramina inservientia.

## Ceratospermum.

Ceratospermum est plantae genus, ab Agarico diversum, Seminibus cor-  
 niculatis, aut Luna crepentes figura in Superficie donatum.

1. Ceratospermum aquaticum, crustaceum, crispum, gelatinosum, Lu- T. 56.  
 bricum, latissimum, extra fulvum, intus album, & instar querni ligni vi- f. 2.  
 mosum — In aquarum rivulorum fundo toto anno viget, praesertim autum.
2. Ceratospermum nigrum, minimum, discoides, & diversarum arborum ra- T. 56.  
 morum emortuorum corticibus, & praecipue Corylo erumpens — f. 1.
3. Ceratospermum minimum, cornucopioides, album, & subhirsutum, Semini- T. 56.  
 bus incarnati coloris — Autum. Lauri corticibus adnascens. f. 3.

Ceratospermum dicitur a Vocibus Graecis κερας cornu, & σπέρμα Semen, quasi di-  
 ceretur Semen cornutum, vel corniculatum.



# Linckia

*Linckia* est planta quæ inter *Agaricum* & *Levatopneumum*, a quibus Tab. 67.  
differt ob seminum dispositionem, atque situm, quæ in tortuosam, nodosamque  
*Lineam Coralli*, aut *Margaritarum*, *moniliun* instar, disponuntur, quæ ad-  
modum *Microscopium* exhibet. A quæ semina ipsi plantæ corpori affiguntur.

1. *Linckia* *terrestis*, gelatinosa, membranacea, vulgarissima, ex  
pallida & virascente fulva.

Muscu fugax, membranaceus, pinguis, statim post pluvias oritur. Bot. m. 7. 67.

In *Pinetis* & *herosis* locis, in pratis & pascuis, &c. pluvio, vel humido Temp. f. 1.

2. *Linckia* *palustris*, gelatinosa, *Saxis* adnascens, ex obscuro fulva, 7. 67.  
& concava, vesicam referens. — In aquarum rivulis. f. 2.

*Linckia* a *Linkio* Joanne *Pharmacopæo* *Lipsiense*.

# Suillus

*Suilli* *unicolores*, *lutei*

1. *Suillus* *esulentus*, *crassus*, totus pallidus; Porcino o Cappatello buono, giallo.  
In *ericetis* & *Sylvis* *comis*. *varius*.

*Bicolors*, *albi*, & *pallidi*.

2. *Suillus* *esulentus*, *crassus*, *albus*, *subtus pallidus*, *pediculo ventricos*,  
*pauiter albo* — Provenit in *eadem* locis.

*Sulphurei*, *Achari*, seu *suave rubentis* *coloris*.

3. *Suillus* *esulentus*, *Alpinus*, *crassus*, *desuper Sulphureus*, *cute lacera*,  
*quasi hirsuta*, *inferne Achari* *dilutissimo rubore* *præditus*, *pediculo ventri-*  
*coso*, *superne pileoli parte concoloris*. — In *Sylvis* *abiegnis*.

*Lutei*, & *rubri*.

4. *Suillus* *esulentus*, *crassus*, *superne sordide rubens*, *vel ex rubro-*  
*ferugineus*, *inferne dilute luteus*. — *Autumn. Temp.* a *Rusticis* *Vanuatur*.

5. *Suillus* *parvus*, *crassus*, *initio dilute luteus*, *postea parum concolor*, *parum*  
*foecum vini* *simulans*, *interdum undique ruber*. — *Cambria* *colore*. — In *querc-*  
*tis*, & *ceduis* *Sylvis*, *non in ericetis*, *veta*, & *autumno*, *cum vulgari* *Crescit*.



p. 127.

## Rubro-ferruginei, &amp; albid.

6. *Suillus esculentus*, crassus, *superne* ex rubro-ferrugineus, *inferne* albidus, *pediculo* concolore, rimoso, vel striato. — In pinetibus.

## Ex auro-fulvi, &amp; ex albo-pallidi

*Suillus parvus*, crassus, *pileolo* desuper ex auro-fulvo, *inferne* ex albo pallido, *pediculo* *superne* *pileoli* *partis* ejusdem coloris.

In horris &amp;c.

## Fulvi &amp; Flavi.

*Suillus esculentus*, crassus, *superne* fulvus, *inferne* initio albidus, deinde ex flavo subvirescens, *pediculo* ventricosus, & *superne* *pilei* *partis* concolore. — In montosis sylvis & inter Ericas. — venundatur.

p. 128. 9. *Suillus esculentus*, *superne* pulchre fulvus, *inferne* citrinus, & 7. 68.  
subtilissime perforatus, *pediculo* concolore. — f. 1.

Porcino col capello di sopra di colore leonato bello, e di sotto insieme col gambo limonato.

10. *Suillus esculentus*, crassus, *superne* fulvus, *inferne* luteus, *pediculo* concolore, rugoso & aspero. *Leuino*. — In sylvis.

11. *Suillus crassus*, *pileolo* desuper fulvo, *inferne* sordide luteo, *pediculo* concolore, tenuiori. — Per prata.

12. *Suillus parvus*, crassus, *pediculo*, & *superne* *pilei* *parte* fulvis, 7. 68.  
*Saricea*, perbrevis lanugine infectis, *inferna* vero ochroleuca. f. 2.

Ad Sticum radices. — Porcinello peloso.

## Obscuri &amp; Flavi.

*Suillus esculentus*, crassus, *superne* obscurus, *inferne* initio albidus, deinde ex flavo, sordide virescens, *pediculo* ventricosus, & *superne* *pileoli* *parte* concolore. — Crescit in sylvis ubique.

14. *Suillus perniciosus*, *superne* obscurus, *inferne* ochroleucus, 7. 69.  
*pediculo* ventricosus, *superne* *pileoli* *partis* concolore, *radicem* in  
*macronem* longam sensim attenuatam producta. — In quercetis f. 3.

## Obscuri &amp; murini

*Suillus esculentus*, crassus, desuper obscurus, *inferne* murini coloris, *pediculo* *superne* *pileoli* *partis* concolore, & *Saricea*, perbrevis lanugine infecto. — In sylvis.



p. 128.

Tricolores albi, lutei, &amp; rubri.

*Suillus esculentus*, montanus crassus, pileolo desuper ex rubro ferrugineo, inferne albedo, pediculo longiore, albo, punctis rubris distincto. In Castaneorum Sylvis, autumnus.

Albi, lutei, &amp; obscuri.

*Suillus esculentus*, crassus, viscidus, superne obscurus, inferne sub-luteus, pediculo brevi, tenui, conicolore, punctis, & litoris rubris notato. Tab. 69. f. 1.

p. 129.

Fulvi, lutei, &amp; rubri.

*Suillus esculentus*, viscidus, crassus, superne fulvus, inferne luteus, pediculo subnitens albo, deinde ejusdem coloris, punctulis, & litoris sanguineis notato. — Pinazzo buono colore di foglia mora, e col gambo giallo puntato di rosso. — In Sylvis.

19. *Suillus esculentus*, viscidus, crassus, superne subfulvi pallescentis coloris, inferne ochroleucus, pediculo conicolore, litoris, vel punctulis sanguineis notato. — Pinazzo buono Rolfino, o biancastro. — &c. — in Sylvis.

Ex obscuro fulvi, lutei, &amp; luteo-rubentes.

*Suillus magnus*, crassus, superne ex obscuro fulvus, inferne luteus, pediculo ex luteo-rubente primium, postea simul cum superne pileoli parte ad elegantem ruborem instar fœcum vini vergans. — Porcino malefico, cambia colore.

21. *Suillus esculentus*, crassus, magnus, vernus, pileolo supina parte fulvo, pronaluteo, pediculo crassiore, conicolore, punctulis, & litoris rubris notato. Tab. 69. f. 2.

22. *Suillus* crassus, superne fulvus, & litoris, inferne luteus, pulpa rosea, pediculo ex fulvo-subrubente, ac veluti reticulato.

23. *Suillus esculentus* crassus, superne fulvus, & nonnihil hirsutus, inferne & inferne luteus, pediculo ex fulvo-subrubente. — Porcino bastardo buono, pelosiccio.

Eupurei ex aureo-fulvi, &amp; rubentes.

*Suillus* crassus, superne purpureus, inferne ex aureo-fulvus, pediculo tenuido subrubente. — Pinazzo malefico, rosso, di gambo corrucciuto.

Obscuri, lutei, &amp; medi coloris.

*Suillus* crassus, superne obscurus, inferne luteus, pediculo medi coloris & summa parte striato. — Pinarello.

*Suillus*, qui & *Porcinus* dicitur a Sues, quia non solum Sues ipsi libenter devorant, verum etiam, quia in locis ubi nascitur commorantur ad pasca.



# *Polyporus*

Fungus, cujus capitulum non separatur ab inferiori parte  
& non ex fistulis solatis composita est, sed instar cribri, aut  
Apium favi duntaxat perforata, in cujus foraminulorum ore  
reperiuntur flores, & in eorundem cavitate semina, que  
— in eodem in antecedenti genere.

p. 130.

## *Polypori unicolores, albi.*

*Polyporus exiguus, coriaceus, albus, lignis adnascens.*

T. 70. f. 7.

Fungus porus minor, candidus, siccioris substantiæ, ex ligno natus.

## *Cinerei*

*Polyporus alpinus, cinereus, pileolo superna parte lacero, & veluti T. 71. f. 2.*  
tepelato, inferne instar favi ample perforato — Per Sylvas fagi, et albas

## *Fulvi*

*Polyporus coriaceus fulvus, infundibuliforma, pediculo coarctiore T. 70. f. 4*  
In Castaneorum Sylvis — Septembri.

4. *Polyporus lignosus, fulvus, infundibuliforma, ad ora fimbriatus, pe- T. 70. f. 8.*  
diculo tenuiore

5. *Polyporus exiguus, coriaceus, fulvus, pileolo concavo, ac in medio T. 70. f. 9.*  
nonnihil umbilicato. — Michienus de Prati — Julio &c.

6. *Polyporus exiguus, alpinus, fulvus, infundibuliforma, pediculo T. 70. f. 10.*  
breviore — In Alpidibus.

## *Bicolors albi, & obscuri.*

7 *Polyporus esulentus, parvus, pileolo desuper obscuro, inferne T. 70. f. 3.*  
tenuissime poroso, & albo, pediculo superius pileoli parti concolore.  
— Scopetino ab Atraliis vocatus quod nascitur in Ericetis. Autumn.

## *Spadiceo-ruhi, et luteo-virides.*

8. *Polyporus Alni radicibus innascens, molli, & crassa pulpa, pileolo de- T. 70.*  
super ex spadiceo-fulvo, inferne luteo-viridi, pediculo brevi, superius f. 1.  
pileoli parti concolore. — Augustus & Sept. in Alnetis præsertim.



p. 130.

*Albi, & spadicis-rufi.*

*Polyporus exiguus*, pileolo hemisphaerico, ex spadicis-rufo, adoras Tab. 70.  
 piloso, subtus alba, rhomboideis, & duplicibus foraminulis fenestrato, f. 8.  
 pediculo superiore pileoli parte concoloro. — In sylvis — inajo —

*Albi, & grisei.*

p. 131.

*Polyporus esculentus*, parvus, & habitior, ex griseo, & obscuro ni- T. 70.  
 griseus, inferne albus, & tenuissime porosus, pediculo cum diperna f. 2.  
 pileoli parte ejusdem coloris — Fungo cono, Carbonajo — Octobri.

*Cespitosi, vel ramosi, unicolores, albi.*

*Polyporus Cespitosus & ramosus*, albus. .... Barrel. 117. ic. 1270.

*Unicolores, pallido-lutei.*

*Polyporus Cespitosus, ramosus*, pallide luteus. .... Barr. ic. 1269.

*Bicolores albi & rufi.*

*Polyporus esculentus*, ex ingenti, perenni, & tuberosa radice in lingua- T. 71.  
 los menses plerumque nascent, superiore rufescens, inferne simul cum pe- f. 1.  
 diculo albus. — fungo della pietra fungaja. — Battar. Tab. 24. A.

*Albi & nigri.*

*Polyporus lignosus*, & cespitosus, infundibulum imitans, superiore ni- T. 70.  
 griseus, inferne cum pediculo albus, areolis carbonariis innascens aut. f. 6.

p. 132.

*Erinaceus*

*Hydnum imbric.* *Erinaceus esculentus*, albus, <sup>Erin. unicol. albi.</sup> crassus — In Ericetis, Arbutatis, & ceduis sylvis. Tab. 72. f. 2.

*Lutei*

*H. repandum.* *Erinaceus esculentus*, pallide luteus. — — — — T. 72. f. 3.

*fulvi*

*Erinaceus infundibulum imitans*, coriaceus, colore ex fulvo ferrugineo, T. 71. f. 4.  
 pileolo desuper veluti sericeo, & pluribus Anis circularibus excavato.  
 Sarcocarino salvatico color di esca, o di foglia morta.



p. 137.

## 137

*Hydn. auriscalp.* 4. *Evinaceus Alpinus*, minor discoides, fulvo-ferugineus, Srecheri-  
L. -no alpigiano piccolo, colore di foglia morta. - In fagin & abiegn. Sylv. 7.72.  
estate. f.7.

6. *Evinaceus cespitosus*, conaceus, ferrugineus, Superna circula-  
-ribus foris excavatus, & sericeus, pediculo tenuiori - Octobri.

*Hydn. auriscalp.* 5. *Evinaceus parvus hirsutus*, ex fusca-falvus, pileolo semi-orbi-  
L. -culari, pediculo tenuiore 7.72.  
f.8.

## Nigri.

*Evinaceus niger*, ramosus, non vascus - In sylvis & venetis. 7.72. f.6.

## Bicolores ferruginei &amp; cinerei.

*Evinaceus* ex obscuro-ferrugineus, subtus denticulis longioribus, 7.72. f.1.  
cinereis - Septembri in Sylvis &c.

p. 133.

## Fuliginosi &amp; cinerei

*Evinaceus esculentus*, pileolo superne valvati squamoso, &  
fuliginoso, inferne cinereo, pediculo eam superne pileoli parte epis-  
-dem coloris.

## Nigri &amp; Plumbei

*Evinaceus infundibulumimitans*, colore nullo, superne seri-  
-ceus, & circularibus foris excavatus, inferne plumbecus, pediculo  
concolore - Srecherino vero malefico - Octobri



## F U N G I

p. 141.

~~Unicolores albi~~

- I. Fungi simplices, seu non cespitosi, nempe ab una radice singulares exeuntes.
- II. Ramosi.
- III. Solva non erumpentes.
- IV. Pediculo non annulato.
- V. Pileolo desuper non striato.
- VI. Neque lactescentes, neque acres

Unicolores, albi.

Fungus ramosus, parvus, albus, pileis in tubum valvati contractis. T. 79.  
Fungo ramoso — Octobr. in necronibus. f. 3.

II. Non ramosi

VI. Lactescentes, acres, vel non acres.

Unicolores, albi

Agaricus piperatus. Fungus piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens. F. 823. Inq. R. H. 558.

2. Fungus esculentus, piperatus, totus albus, lacteo succo turgens, lamellis angustioribus, pediculo altiori, & habitiori. — In Italia inter. vult.

3. Fungus piperatus, albus, parvus, lactescens, pileolo plano, umbilicato, subas lamellis densissimis, perangustis.

Coloris lateritii.

Fungus perniciosis, lateritio colore varians, succum acrem, & croceum fundens, pediculo breviori. — Majis & autumnis viger in Ericis.

Agar. deliciosus  
Scop. G. G. G.

2. Fungus esculentus, lateritio colore immutabili, succum acrem, & croceum fundens, pediculo breviori. —estate in Ericis, fagineis & abiegn.



## Rufi

- p. 141. Fungus pediculo, & superna pileoli parte atro-rufis, lamellis  
 Subrufis, seu rufis coloris, succum lacteum, & aerem fundens. Prat.  
 Ag. rufus Scop. 2. Fungus infundibuliformis, lactescens, rufescentis coloris. Syn. Sisse.  
 Agar. testaceus -- Scop. 3. Fungus parvus, pediculo, & superna parte pileoli ferrugineis  
 lamellis rufis, lacteum & dulcem succum fundens. erajo. Sylvestr.  
 p. 142. 4. Fungus parvus, lacteum, & dulcem succum fundens, ~~pediculo~~ pe-  
 diculo, & superna pileoli parte rufescentis coloris, lamellis vero  
 ejusdem sed paullo rufioris. Autumn.  
 5. Fungus aeris, lactescens, parvus, infundibuliformis, pileolo  
 parvo, saturate & obsolete rufescente, & quasi ferrugineo, lamel-  
 lis rufis, pediculo supernae pileoli parte concolore. Perino lattajuolo forte.  
 6. Fungus aeris, lactescens, parvus, dilute rufescens, pileolo com-  
 planato, & nonnihil umbilicato, circularibus zonulis saturate  
 concoloribus distincto — Sepino Amiciato.

## Aureo-fulvi.

- an? Ag. oedematopus Scop. Fungus estivus lactescens, ex aureo-fulvus, vel ex fulvo-aure-  
 us, sericea, & per brevi lanugine quasi infectus, lamellis angustis  
 onibus, dilute concoloribus. — Fungo lattajuolo d' estate dorato, elisco come  
 raro. — Estivus, & rarus.

## Ex atro-fulvi, vel ex aureo-ferruginei.

- Fungus ex atro-rufus, vel ex aureo-ferrugineus, aqueo-lacteo &  
 dulci succo turgens — Lattajuolo di latte inaquato, dolce. — Autumn. p. Sylvas frag.

## Rubro-ferruginei.

- Fungus bulbosus, lactescens, aeris, rubro-ferrugineus. — Sepino lattajuolo  
 di radice grossa. — Indivisi amplexarum autumn.

## Violores, albi, &amp; spadiceo-grisei.

- Fungus parvus, succo lacteo, & acri exuberans, superne e spadiceo-griseus,  
 subtus cum fistuloso pediculo albus. — Sepino lattajuolo di gambo scuro.  
 autumn cum superiori.



## Albidi &amp; sublatei.

Agar. Scrobiculatus *Fungus piperatus, lactescens crassus, pallidus, lamellis albidis, pediculo  
Scop. 1554* superna pileoli parte conicolore & Lichenis pulmonarii, arboris instar  
laminato. — Rivermeia, o Peperone giallo, di gambo buchevattoloso. — Aug.  
in fagineis Sylvis.

## Albi, &amp; grisei

*Fungus alpinus, aeris, lactescens, desuper egriseo-fuscus, inferne  
cum breviori pediculo albus.* — Lattajuolo forte, Alpigiano, di abetina - in fags.

2. *Fungus parvus, aeris, lactescens, desuper griseus, inferne cum pedi-  
culo albo.* In Sylvis.

3. *Fungus parvus, piperatus, lacteum succum fundens, pileolo griseo, Tab. 80.  
inammoso, papilla acuta, inferne cum pediculo albus.* f. 1.

Peperino con il capello grigio fatto a guisa di Poppa. — ubi?

## Albi &amp; cinerei.

p. 143.  
*Fungus alpinus, piperatus, lactescens, & viscosus, pediculo, & super-  
na pileoli parte cinerei coloris, inferne lamellis albis.* — Peperino lattaj.  
vischioso, alpestre, di Abetina. — Augusto in fagin. & Abiegnis Sylvis

## Albidi &amp; obscuri.

Agar. Rusticanus *Fungus parvus, succum lacteum, & aerem fundens, superne colore  
Scop. 1554* breviori, subus lamellis, & pediculo albis. — Lattajuolo forte, di capello oscuro.

2. *Fungus parvus, aqueo-lacteum succum minus aerem fundens,  
pileolo subobscuro, infundibuli modo cavo, inferne ex albo-virescente,  
pediculo superna pileoli parte conicolore.* — autunno - Sylvaticus.

## Dilute purpurei &amp; albi.

*Fungus aeris, lactescens, duironis substantia, pediculo cum superna  
pileoli parte sordide, et dilute purpureis, & ad tactum vini rubri colore  
accidentibus, lamellis primam albis, deinde virescentibus.* — Peperino  
duo col di sopra del capello di colore pavonazzo, che si accosta a quello del  
tattaro di vino rosso. — Autunno in Sylvis.



p. 143.

Tricolores, albi, fusi, & lateritii coloris.

Fungus lactescens, aeris, pileolo ampliore, centro cavo, & subfusco, reliqua parte conulis circularibus lateritii coloris nitidis, & saturis alternatim positis veluti fasciata, lamellis, & pediculo albis. — Augusto. Sylv.

VI. Non lactescentes, acri, vel alio fervido, ac peculiari sapore.

Unicolores, albi.

Fungus esculentus, aeris, albus, pileolo turbinato, ad oras angulato, & subtus repando. — In Sylvis, ericetis, atque arbutatis vere & autum. sed rarissime occurrit.

Lutei.

Fungus esculentus, aeris, pulchre croceus, pileolo turbinato, ad oras angulato, & subtus repando. — In Sylv. cum Superiori eod. Temp. sed copiosior.

p. 144. 2. Fungus esculentus, aeris, colore vitellino, pileolo turbinato, oris ex-  
Ag. Cantharellus, pennis, undulatis, ac pulchre laciniatis, lamellis, seu unavis costis crispis, & veluti ramosis.

Bicolores, albi, & spadicei.

Fungus pipervatus, non lactescens, pileolo admodum umbilicato, sordide spadiceo, lamellis albis, pediculo firmo, brevissimo, concolore. — Prateensis.

Albi & grisei.

Fungus exiguus, odore, & sapore Raphani, pileolo desuper albo, inferne griseo, pediculo superna pileoli parti concolore. — Fungo ramolacis minore. — Octobri, Sylvaticus.

Albi, & Lutei.

Fungus campestris, parvus, luteus, odore Allii, pediculo superna parte Tab. 78  
concolore. — Fungo Aglio de campi, & Campagnuolo. In fimo Equino f. 5.  
per agros fuso, Autum. Temp. viget, sed rarus.

Grisei & Nigricantes.

Fungus alpinus, odore, & sapore Allii, pileolo hemisphaerico, utraque parte sordide griseo, pediculo pro parte tenuiori, nigricante, fistuloso, & veluti sericeo. — In Sylvis fagis. T. 78. f. 4.



p. 144.

E cinereo-albicans, & spadicea.

Fungus non vascus, exilis, cinereo-albicans, pediculo spadiceo, odore Allii.

Tricolores, rufi, grisei, & medii inter utrumque coloris.

Fungus odore, & sapore Raphani, pileolo superna parte pulchre rufis, lamellis densis, griseis, pediculo medii coloris, cum cuticula laevi, veluti subhiolata. — Fungo Ramolaccio maggiore. Octobri & Novemb. in nem. freq.

p. 145. VI. Neque lactescentes, neque aures.

Unicolores, albi.

Fungus esculentus, totus albus, pileolo ampliore, pediculo brevi, Fungo biancone. — In Sylvis. autumnus.

2. Fungus esculentus totus albus, pileolo plano, pediculo brevior. — Fungo Torzolo. — Ubi antedictus, ac eod. temp. crescit.

3. Fungus esculentus, albus pileolo plano, viscidus, lamellis crispis. Fungo Magnajo. — Cum superioribus.

4. Fungus albus infundibulum imitans, pediculo tenuiori. — Autumn. in syl. h.

5. Fungus subalbidus, pediculo crassior, oris laevis, radice granulosa. —

6. Fungus albus, parvus, & habitior, pileolo umbilicato, ac in plures partes tanquam per elasticam vim ut plurimum se dividens, cute laevi. — Fungo bianco Niantese. — Octobri & Sylvis.

7. Fungus luteo albus, pileolo plano, pediculo longiore, cylindraceo, non fistuloso. — Autumnus in Sylvis.

8. Fungus esculentus, totus albus, farinam recentem moliram redolens. Megidone bianco, chespiri odore di farina di fresco macinata. — Toto autumnus in Ericetis & copiose provenit.

9. Fungus niveus per elegans, pileolo subrotundo cerebri instar crispato, pediculo brevior. — In trabibus aqua pluvi. diu madefactis. — autumnus.

Ag. Magnajus  
Scopol.  
Et Torzolus ejusd.



p. 145.

10. Fungus esculentus parvus, & habitior, totus albus, viscidus. - ad illud  
Octobri. - Fungo Geloso.

11. Fungus albus, esculentus, pileolo ampliori, fornicato, atque in medio paul-  
isper umbilicato, cute laevi, veluti squamosa, pediculo tenuiori brevissimo.  
Fungo Capellone, bianco. - Et state in Nivum & quare. (Cordicibus).

12. Fungus totus albus, infundibulum imitans, pileolo parvo, pedi-  
culo longiore. Autumno in Sylvis.

13. Fungus parvus, lamellatus, infundibuli forma, totus albus, pi-  
leolo usque plurimum in varias lacinias se dividente. - Oct. ubi sa.

14. Fungus parvus, totus albus, pileolo plano, ac umbilicato, pe-  
diculo brevi. - In Sylvis.

Ag. Valens. Scop. 15. Fungus nemorosus, viscidus, lacteo candore fulgens. Fungo Valen-  
te. - Autumn. in agro. in truncis - pil. diamet. 2. transvers. digitos.

Ag. niveus Scop. 16. Fungus inveni candoris annulus, viscidus, lamellis parvis, vari-  
-oribus, pediculo fistuloso. Ubi sa. - minor priora

17. Fungus esculentus, lamellatus, candidus pulcherrimo pileolo.  
Octobri & nemora.

p. 146  
18. Fungus parvus, albus, subous lamellis Torosis. - Autumno.

19. Fungus parvus, albus, pileoli substantia adeo tenui, ut lamellae  
ad supernam superficiem transpareant. Octobri

20. Fungus parvus, coriaceus, viscidus, totus albus, lamellis rarioribus, seu  
inter se longe distantibus. - Lumachino bianco. - In herbosis ambularis.

21. Fungus parvus, viscidus, totus albus, pediculo breviora. - Vernus.  
Lumachini bianchi di gambo corto.

22. Fungus fimetarius, hirsutus, subalbidus, pileolo conico, pediculo  
coarsiore. - In Equino fimo Vere & autumno post pluvias.

23. Fungus parvus, totus albus, pileolo in medio umbilicato. - In Ericetis.  
Fungo vello di scopeto, bianco.



pag. 146.

24. Fungus parvus, totus albus, gracilior, pileolo hemisphaerico, pediculo tenuiori, proalto, radice tumida in mucronem longum producta. Fungo dilegine, barbato. — Maio per loca herbida, &c.

25. Fungus proterus, parvus, albidus, radicibus Graminis Dactyloideis, Tab. 74. Spicis villosis, autumnate tempore nascent. — Fungus bianchiccio de 8.3. — prati, che nasce sopra le radici della Gramigna sanguinella delle spighe pelose. — In pratibus & pascuis.

26. Fungus parvus totus albus, inter Muscos nascent, pileolo acuto, extensorii forma. — Autumno in nemoribus.

agor. angularis 27. Fungus minimus candidus, pileolo chippei forma, & veluti angulato, T. 74. Gmel. p. 1471. Limbo superna parte repando. — Fungus bianco a foglia di Brocciere 8.4. — che nasce sopra i pezzi di legni invecchiati.

28. Fungus minimus cere alba colore, pileolo plano, in medium fastigiato, pediculo fistuloso, Musco Polygoni folio innascens. — Autumno.

Ag. Trichopus  
Scopoli.

29. Fungus minimus, candidus, pileolo hemisphaerico, pediculo altiori, T. 73. Capillaceo. — Autumno 8.4.

30. Fungus minimus, candidus, pileolo galericulato, pediculo proalto, T. 73. angustissimo, vix perforato. — Super Olivum caudicibus. — Octobr. 8.5.

31. Fungus minimus, totus albus, infundibulum imitans, Musco innascens — Severino piccolissimo, bianco, di ragnaja — Verino tempore crescit. 8.6. T. 73.

32. Fungus minimus, candidus, infundibuli forma, totus albus, emortuis gramineis foliis innascens. — Severino minimo, che nasce sopra le foglie di gramigna mezza secca. — Per vestibiles agros, autumno.

33. Fungus minimus, candidus, pileolo hemisphaerico, ilignis foliis, T. 80. Semiputridis innascens. 8.10.

34. Fungus minimus, albus pileolo hemisphaerico, in arborum caudicibus, T. 74. toto anno post pluvias oritur. 8.7.

p. 147

35. Fungus minimus, proorsus albus, inter Muscos nascent. — Octobr. post diuturnas pluvias, & locis Muscoris prodit.



p. 147.

*Leucophaei, grisei, adamantini, cinerei, murini*

1. Fungus esculentus, saturo-cineus, vel murini domestici coloris, farinam recentem molitram odolens, pediculo crassiore. — Toto autumno in Ericetis &c. ut plurimum copiosus provenit — et in foro venditur.

2. Fungus adamantini coloris, pileolo ampliciori, fornicato, pediculo brevi, tenuiore. — Fungo di colore diamantino, e carne bigio-perla — Septembri.

3. Fungus parvus, viscosus, pileolo griseo, semiovalato pediculo fistuloso, simul cum lamellis dilate concoloribus, & quasi leucophaeis.

4. Fungus parvus, intense griseus, superna pileoli parte lacera, veluti squamosa, pediculo in spiram modum intorto & filamentoso. — Stoppione col capello screpolato, e di gambo corto, e spilacciato.

5. Fungus griseus, gracillimus, pileolo gastericulato, pediculo lineam crasso, pro alto, fistuloso. — In sylvis inter muscos. Autumno.

*Aurei, lutei, crocei, pallidi, paleacei, straminei.*

Ag. inanis Scop. sed lamellae sunt rariores. 1. Fungus esculentus, paleacei, seu straminei coloris, pileolo pulvinato, lamellis crebris, tenuissimis, perangustis — Autumno in sylvis.

Agar. Crassus. Scop. 2. Fungus luteus, & ad prasinum nonnihil tendens, pileolo crasso.

A. Gjashiformis Allion. 3. Fungus aureus, infundibuli-forma — Revera nalespica dorata. et aut. in abiegnis sylvis.

4. Fungus parvus, e luteo-aureis, molliori substantia, pileolo plano, lamellis rarioribus, pediculo longiore. — Grassello buono. — Novembri.

5. Fungus parvus, campestris, luteus, pileolo hemisphaerico, pediculo longiore. Giallino cattivo di gambo lungo. — In agris vere & autumno.

6. Fungus parvus, lubricus, aureus, lamellis variis, amplioribus, pediculo crassiore. — Lumacone giallo, che sdruciuola di mano. — Autumno.

7. Fungus parvus, luteo pallore decolor, pediculo duriore. — Fungo di colore di Camoscio, che tira al pagliato.

Ag. filamentosus Scop. 8. Fungus ex luteo-rufescens, cute superna pileoli partis lacera, veluti squamosa. — In Castanearum sylvis.

9. Fungus parvus, sordide, vel obsolete luteus, vel luteus obsolete virescens, capitulo hemisphaerico, pediculo in spiram modum intorto. — Autumno.



pag. 148.

10. *Fungus minimus, aureus, Virga aurea majoris, foliis glutinosis, & graucolentibus, emortuis ramis innascens, pileolo hemisphaerico.*

### Spadicei

*Fungus parvus, totus spadiceus, pileolo iramutato, desuper quasi in sericea filamenta lacerato, atque in medietate veluti in papillam autem assurgente, pediculo tenuiori. — Canapino di buccia sfilacciata, e di gambo sottile. — mayo & Sylvas.*

### Rufi.

*Fungus esculentus, crispus, ex rufo albicans, vel ex albo rufescens, lamellis angustissimis, pediculo crassiore. — Soderello degli Uuellarj.*

2. *Fungus totus atro-rufescens, odoratus, pileolo ampliore, fornicato, tenuiori substantia, pediculo brevi, angusto. — Octobr. — fungo di colore d'Ontano che inclina all'Isabella.*

3. *Fungus parvus, esculentus, odoratus, coriaceus, rufus, lamellis inter se longe distans. — Fungo color d'Isabella. — In herbis, pratis, ac arbor. vitis.*

4. *Fungus parvus, infundibuli forma, crispus, pediculo, & suprema pileoli parte rufis, inferne lamellis ex rufo-purpureascentibus. Tamburino Crespo — In montibus — Verno tempore ut supradictus.*

5. *Fungus exiguus, atro-rufescens, pileolo ampliore, tenui substantia. Fungo di colore ceciato pieno. — Autunno.*

6. *Fungus exiguus, totus rufescens, lamellis ad pileoli peripheriam non usque excurrentibus, pediculo brevi, radice bulbosa. — Autunno.*

7. *Fungus parvus, lamellatus, rufescens, florem Genista redolens. — Autum.*

8. *Fungus parvus, sordide rufescens, vel ex rufo-ferrugineus, cute laevi, pediculo lineam crasso, fistuloso. — Autunno.*

### Fulvi, seu Mustellini

*Fungus parvus, lamellatus, fulvus, pileolo concauo, & veluti sericeo, lamellis to-rosis. — Fungo del colore di foglia morta, colla parte di sopra del capello liscia come seta, e colle laminette muscolosa. — Octobr.*

2. *Fungus parvus, fulvus, pileolo hemisphaerico, fornicato, desuper laevi, veluti subhirsuto, pediculo brevior. — Fungolino del colore di foglia morta colla pelle del capello scamosciata. — Vere et autumno vige.*



pag. 148

2. *Fungus parvus, fulvus, pediculo tenuiore, pileolo quasi complanato.*  
*Funghevello di Scapero, del colore di foglia morta, o leonato. — In Ericis autumn.*
149. 4. *Fungus parvus, fulvus, sive mustellinus, pileolo extenuati forma.*  
*Fungo spugnoso, minore, di gambo lungo, del colore di foglia morta. 8. 11.*
6. *Fungus parvus, Autumnali tempore stercore bovino innascens,*  
*pileolo hemisphaerico, superne subfulvo, inferne vero saturo, pediculo tenuiori,*  
*fistuloso, superna pileoli parte concolore. — Funghetto del colore di foglia*  
*morta, che l'autunno nasce nel conio di Bue, ed Vacca. — In pascuis ubi jumenta de-*  
*gunt.*
5. *Fungus campestris, minimus, et fulvo-ferrugineus, pileolo hemis-*  
*sphaerico, opsidarietinis innatus. — Fungo operano. — Tempore Autumnali*  
*variis rebus adnascens, & potissimum in opsidibus arietinis.*

## Obscuri, Fuliginosi, Fasci.

- Fungus ex obscuro-fulvus, pileolo amplissimo, crasso, hemisphaerico.*
2. *Fungus esculentus, odoratus, parvus, acetabuli modo cavi, obscuros,*  
*& ad Oliva conditis colorem nonnihil tendens. — Novembri & agro.*
3. *Fungus subobscurus, pileolo campanulato, ac desuper in sericea fila-*  
*menta, veluti lacerato, pediculo pro alto. — Fungo lanagione, sericcio, con la*  
*parte di sopra del capello sfilacciata. — Nemorosus & autumnalis.*
4. *Fungus acetabuli modo cavi, fuliginosus, pediculo pro alto. —*  
*Gambello di Colore effumicato — ubi supra crescit.*
5. *Fungus parvus, subobscurus, pileolo acetabuli modo cavo, ad ora*  
*undulato, & ubi in sericeo nitore pro alto. — Fungo scuro con capello liscio*  
*e lustrante come seta, fatto a ciotola. — In nemor. & herb. loc. ver. erant.*
6. *Fungus parvus, subobscurus, pileolo mammoso, papilla acuta.*
7. *Fungus parvus, obscurus, aut castanei veteris coloris, pileolo he-*  
*misphaerico. — Funghevello color di gusio di Marrone, o di Castagna*  
*vecchia, delle maniche di S. Piero in Grado — In Sylvis.*
8. *Fungus parvus, acetabuli modo cavi, colore subobscurus; Fungo*  
*Sugherello. (id est Luberellus a Substantia corticis Suberis denominatus.) —*  
*In herbosis ambulantibus Octobri &c*



pag. 149.

## Violacei, purpurei, Janthini.

Agar. violaceus L. & Fungus esculentus, bulbosus, dilute purpureus. — Grumato pavonazzo. Tab. 74. f. 1.

2. Fungus parvus, dilute purpureus, pileolo sursum reflexo, & concavo, pediculo longiore, intorto. — Fungo colore di Piniqe, chetira al gridolino. Octobr.

3. Fungus pileolo, & pediculo dilutissime purpurei, & quasi rufescentis coloris, lamellis vero suave-purpureis. — Cum sequenti.

p. 150. 4. Fungus totus subpurpureus, per vetustatem ad carneum colorem vergens, pileolo extintorii forma. — Inter folia semiputrida. autumnno.

5. Fungus parvus, dilute purpureus, pileolo pulverinato, pediculo non fistuloso. Lamellis valde remissis, pediculo fistuloso, intorto. — Fungo vedovino, di gambo vuoto, & storto. — Autumnno.

6. Fungus parvus, subpurpureus, pileolo pulverinato, pediculo non fistuloso. Vedovino di color di porpora dilavato, & di gambo pieno. — In Sylvis. Autumn.

7. Fungus pileolo parvo, hemisphaerico, Superne nigro-purpureo, inferne vero valde dilute, & quasi purpureo, pediculo concolore, praesto, intorto, fistuloso. — Novembri sub Alcibus &c.

8. Fungus dilute violaceus, pileolo parvo, pediculo gracili, praesto, fistuloso. — Fungo chiodo, violetto. — In Sylvis. Autumnno.

9. Fungus Janthinus, pileolo parvo, quasi semiorbiculato, pediculo tenui, praetunglabro, parvis subhirsuto. — Bulletoniino di colore fra la porpora, & il Violetto col gambo mezzo peloso. — Autumnno in Sylvis.

## Virides.

Fungus parvus, totus viridis, & ad aureum nonnihil tendens, ac limaiino glutine oblitus, pileolo extintorii forma, pediculo fistuloso. — Fungo vedovino, cattivo, lunareo. — In herbis & hortorum ambuletis. Autumnno.

## Coccinei.

Fungus alpinus, totus saturo-coccineus, seu kermesinus, pileolo hemisphaerico. — In Castanearum Sylvis viger.



pag. 150. Bicolores albidis, & leuophaei, grisei, cinerei, plumbei, giloi, murini.

1. Fungus parvus, leuophaeus, lamellis albidis, pediculo fistuloso, superna pileoli parti concolore. — Autumno in nemoribus.

2. Fungus esculentus, farinam vacenter molitam suaviter redolens, pileolo superna parte griseo, inferne lamellis angustissimis, simulcum pediculo albis. — Prugnolo nostrale buono, cinerino. — In Hypoetis & sentis locis, praesertim montosis Vera & autumno.

3. Fungus esculentus, pileolo superna egriseo subobscuro, inferne lamellis & pediculo albis. — Vera & autumno in Sylvis.

4. Fungus esculentus, desuper plerumque purpureus griseus, interdum vero in aliqua parte aeneo colore perfusus, inferne lamellis & pediculo albis. — Calceatropiola. — in Sylvis.

5. Fungus esculentus, pileolo ampliore, fornicato, tenui substrata, desuper ex plumbeo, & cyaneo albescente, inferne prius albo, deinde griseo, pediculo brevissimo, albo. Capelloniino. — Ibidem provenit.

ps. 151. 6. Fungus odoratus, parvus, infundibuli forma, desuper egriseo-spadi-  
ceus, pediculo concolore, lamellis torosis, sordide albis. — In Sylvis. — Eprumatella.

7. Fungus esculentus, egriseo-rufescens, inferne lamellis, & pediculo al-  
bis, in emortua Eriugii radice nasens. — Cicciolo, forte a carnis lotis & 2.  
colore, vulgo colore di Ciccia lavata. — Octobri.

8. Fungus esculentus, pileolo desuper griseo, inferne simulcum pediculo  
albo. — Corniola laodiva. — In Sylvis.

9. Fungus esculentus, pileolo superna egriseo-plumbeo, & veluti  
squamoso, lamellis simul cum breviori, & habitiori pediculo albis. — Autumn.

10. Fungus esculentus, pileolo desuper murini coloris, inferne lamellis,  
& tenuiori pediculo, albis. — In Ericetis &c. provenit etiam in agro.

11. Fungus esculentus, pileolo desuper cinereo, aut murino, & in  
filamenta quasi lacerato, inferne candido, & tenuissime lamellato, pedi-  
culo plerumque pariter candido. — In arenosis. Verius.

12. Fungus esculentus, parvus, & habitior, pileolo desuper cinereo,  
aut murini coloris, ac in filamenta veluti lacerato, inferne lamellis argen-  
teis, pediculo plerumque concolore. — In majore Sylvas.



p. 151.

13. *Funus pileolo plano, & griseo-subinereo, inferne albo, pediculo tenuiori, conicolore, cylindraneo.* — Novembri.

14. *Funus pileolo plerumque in plures partes usque ad centrum se dividens, utrinque griseo- & pediceo, superne filamentoso, pediculo albo, in ima & summa parte tumido.* — Octobri & Septembri.

15. *Funus pileolo amplo, fornicato, tenui substantia, superne leucophoro, lamellis angustissimis, albis, pediculo conicolore brevissimo.* —

*Ad dejecturam arborum truncis — Autumno.*

16. *Funus pratensis, esculentus, parvus, pileolo in medium umbilicato, & ad oras undulato, griseo, inferne albo, & tenuissime lamellato, pediculo brevissimo. pariter griseo.* — Melingozzano de prati — Autumno.

17. *Funus pileolo parvo, hemisphaerico, griseo, lamellis simulcum bulboso, & pro alto pediculo albis.* — Fungo budello. — Autumno viger.

18. *Funus pileolo disuper griseo, lacunato, & veluti crispato, inferne albo, pediculo conicolore pro alto, & intorto.* — Fungo Crespigno.

19. *Funus albus, maculis gilvis frequentissime conspersus.* Grigolino.

20. *Funus minimus, pileolo umbilicato, subinereo, lamellis & pediculo albis.* — Imbutino minimo di Scopero — Majo.

p. 152.

## Albi & lutei.

*Funus pileolo parvo, superna parte aureo, inferna cum crassiore pediculo albo.* — Or fagineis Sylvis. Septembri.

2. *Funus pileolo subluteo, pulvinato, crispato, & veluti pustulato, lamellis cum pediculo albis.* — In nemoribus Autumnali Tempore.

3. *Funus parvus, odoratus, pileolo ampliore, depurpureo luteo rufescente, subtus lamellis exarbis, albis, pediculo conicolore.* — Majo p. 54.

4. *Funus gatericulatus, lubricus, pileolo & pediculo luteis, lamellis albis;* — Spallino lunacoso, che s'innocia di mano. — In agris & hortis.

5. *Funus parvus, pileolo conico, viscido, & aureo, subtus lamellis, & crassiori pediculo albis.* — Octobri inter Muscos.



pag. 182.

6. Fungus parvus, pileolo conico, superna parte aures, lamellis, & pediculo tenuiore, albis. — autumno.

7. Fungus parvus, capitulo conico, superna parte aures de super luteo & limacino glaucine admodum splendens, lamellis, & fistuloso pediculo albis. Luncachino di capo giallo, e lutto, e di gambo bianco. — In agris super semiputrida tritici caulis fragmenta — autumno.

8. Fungus minimus, viscidus, pileolo hemisphaerico, superna parte & pediculo aures, lamellis vero albis. — Inter muscos autumno viget. Albi, & luteo-virides.

Fungus esculentus, pileolo pulvinato, de super e luteo-virescente inferne lamellis & pediculo albis. — Reperitur nontantum cum duobus antecedentibus, sicut etiam in erictis, & sylvis. Vere & autumno.

## Albi &amp; virides.

Ag. virens  
Scop.

Fungus esculentus, pileolo pulvinato, viridi, inferne cum pediculo albo. Fungo Verdore. — In nemoribus vere & autumno.

2. Fungus pileolo cucullato, viscido, intense viridi, & quasi vernigine obliquo, inferne lamellis, & pediculo albis. — Luncachino verde inverniciato. — In herbosis, & muscosis locis — autumno.

3. Fungus parvus, pileolo pulvinato, virescente, lamellis, & pediculo albis. — Verdachino di bosco. — In sylvis Quercinis autumno.

## Albi &amp; spadicei.

Fungus ad superficiem terre vix apparens, pileolo e spadiceo fulvo, forma fere extinetoni, lamellis, & pediculo albis. — Sub Pinetis autumno.

2. Fungus e spadiceo-flavescens, superna pileoli parte lacum, veluti hirsuta, pediculo albo, pulvisculo concolore asperso. — Canapino di capo sfilacciato, e con il piede forforoso. — Sylvaticus & autumnalis.

p. 183. 3. Fungus e spadiceo fulvus, pileolo parvo, in medio umbilicato, ad peripheriam rugoso, & crispo, lamellis albis, pediculo pro albo, radice lamida inaequantum mucronem veluti producta. — Fungo barbato — Sylvas.



1. *Fungus esculentus*, ex ingente, perveni, & plerumque complanata radice in singulos menses præcipue æstivos nascent, pileolo desuper ex spadiceo-rufo, lamellis, & pediculo albis. — In omnibus fere locis, ubi Solipponus 12. sed rarissime occurrit.

### Albi & rufi.

*Fungus esculentus*, farinam recentem molitam redolens, pileolo atro-rufescente, lamellis albis, pediculo superius pileoli parti concolore. — Autumn.

2. *Fungus esculentus*, infundibuli forma, farinam recentem molitam admodum redolens, pileolo late rufescente, lamellis & pediculo albicantibus.

3. *Fungus Alpinus*, pileolo ampliore, tum supra, tum subtus colore ex rufo-griseo, pediculo albo, viscoso, ac prædure. — In fag. sylv.

4. *Fungus vernus*, parvus, farinam rec. molitam admodum redolens, pileolo desuper late rufescente, inferius albo, lamellis vix lineam latis, pediculo crassiore, superius pileoli parti concolore. — Prignolo nostrale, colore & Osabella. — Vere & autumno in sylvis. — Rarus.

5. *Fungus vernus*, parvus, farinam rec. molitam admodum redolens, pileolo desuper rufo, & in centro fuscioro, subtus lamellis crebris, duas lineas latis, & pediculo albis. — In sylvis verno tempore.

6. *Fungus esculentus*, odoratus, parvus, pileolo rufescente, & umbilicato, lamellis albis, pediculo duriore, longiore, ac fistuloso, & superius pileoli parti concolore. — Martis &c. in agnis, & in cultis.

### Albi, & Fulvi.

*Fungus*, pileolo semicirculato, superne, & inferne fulvo, pediculo albo.

2. *Fungus*, pileolo parvo, fulvo, subhirsuto, lamellis albis, pediculo longissimo, fistuloso, pariter fulvo, & subhirsuto, radice inuasonata. — Autumn.

3. *Fungus* parvus, campestris, pileolo sursum reflexo, utraque parte atro-fulvo, pediculo albogriseo, radice bulbosa. — Inter Saxa majo.

p. 154. 4. *Fungus* pileolo parvo, pulvinato, fulvo, superficie laevi, lamellis albis, pediculo longo, concolore, radice bulbosa. — In sylvis. Autumno.



p. 154

## Albi &amp; Ferruginei.

1. Fungus visculus, desuper ferrugineus, inferne albus, pediculo superna pileoli parti concolore. — Octobri & Septemb.

2. Fungus ex rubro-ferrugineus, lamellis albis, pediculo crassiore, superna pileoli parti concolore. B. Psola Cattara. — In Sylvis humidioribus.

3. Fungus pileolo superna parte dilute ferrugineo, radiis concoloribus, & saturatioribus elegantius distincto, subius lamellis, & pediculo albis. — Fungus.

4. Fungus pileolo hemisphaerico, parvo, ferrugineo, lamellis albis, pediculo longo, superna pileoli parti concolore. — In nemoribus Autumnum cum 2. antec.

Albi & Obscuri, aliisque similibus coloribus, videlicet fuscis,  
Sive Fuliginosi.

1. Fungus magnus, esculentus, pileolo desuper obscuro & laevo, ac per elegantem papilla in medio ornato lamellis albis, pediculo superna pileoli parti concolore, radice bulbosa. — Autumnum.

2. Fungus esculentus, pileolo desuper subobscurus, inferne albo, pediculo crassissimo, pyriformi, concolore. — Autumn. in lenticis &c.

3. Fungus esculentus, pileolo ampliore, ad oras undulato, desuper obscuro, inferne albo, pediculo brevi, concolore, radice rostrata, peracuta. In Sylvis.

4. Fungus esculentus, odoratus, superne subobscurus, & veluti verrugine oblitus, inferne lamellis, & pediculo albis. — In Castanetis & Enicatis.

5. Fungus esculentus, pileolo superna parte obscuro, pronaveo cum breviori pediculo albo. B.igerella. — Octobri.

6. Fungus Alpinus, esculentus, virmus, parvus, & habitior, desuper 7. 74. 1. obscurus, inferne, & pediculo albis. — Fungo Marzuolo, o Dormiente. 8. 9. Martio mense. Sub nive latet, ac viget.

7. Fungus esculentus, pileolo ex obscuro nigricante, lamellis & pediculo albis.

Ag. Cristis  
Scopol.

8. Fungus esculentus, pileolo fornicato (anulo fugacissimo, tripite fistuloso) tenuioris substantiae, superne obscuro, inferne lamellis albis, pediculo longo, cylindrico, non fistuloso, concolore. — Fungo Appassionato. — Aprilis.

9. Fungus pileolo fornicato, vertice tantum fusco, reliqua parte albo, lamellis concoloribus, pediculo utroque colore pulchre variegato. — Fungo Serpentino.

10. Fungus pileolo obscuro, extensorii forma, cute lacera, & veluti filamentosa, subius lamellis, & cylindrico pediculo albis. — Autumnum.



11. Fungus sterquilinus, pileolo desuper ex obscuro-griseo, & in superficiei insquamis velute lacerato, lamellis albis, pediculo concolore pro-  
-alto, fistuloso. — In tumulis firmi Equini. Vera.

12. Fungus parvus, pileolo obscuro, ad ferrugineum nonnihil tendente, lamellis albis, pediculo graciliore, superne pileoli parti concolore. — ff. Sylv.

13. Fungus parvus, pileolo pulvinato, obscuro, maculis concoloribus, & saturationibus notato, subtus lamellis, & pediculo albis. — ff. nemora.

14. Fungus pileolo semiorbiculato, parvo, albo, lamellis varis, & longo, prostrato, & lineam crasso pediculo albis. — In Sylvosis locis super dejectis, & putridis lignis frequens.

### Albi & nigri.

Fungus hirsutus, parvus, candidus, tenuissimus, ac facile in aquam solu-  
-bilis, pileolo in exutum conum fastigiato, lamellis nigricantibus. Tab.  
-Pisciacane peloso. — ff. Sylvas. Autumno. 74. f. 3.

2. Fungus viscidus, pileolo cucullato, superne, & inferne nigro, pediculo albo, fistuloso. — Pisciacane vero. — In ruderatis. Veris Tempore.

### Albi & carnei, vel rubri, vel purpurei, aut caerulei.

Ag. rufula Scop.  
Var. 3.

Fungus esculentus, pileolo superne rubro, inferne primum albo, deinde  
obsolete luteo, pediculo longiore, & crassiore, semper albo. — Rosola buona, di  
gambo lungo. — In Ericetis & Castanetis primovare.

2. Fungus nemorosus, tenuissimus, pileolo ampliore, tenuis substantia, su-  
-perne albo, inferne suave rubente, pediculo fistuloso, perangusto, & superne  
pilei parti concolore. — Pisciacane di bosco, dilegissimum.

Ag. rufula Scop.  
Var. 2.

3. Fungus esculentus, pileolo pulvinato, desuper rubro, subtus lamellis, &  
brevis, pediculo albis — Rosola ordinaria. — Autumno in Sylvis ubique.

4. Fungus parvus, pileolo desuper Amaranthi saturationis colore, in-  
-ferne lamellis, & breviori pediculo albis — Rosola minore & Autumno

5. Fungus esculentus, infundibulum imitans, pileolo viscido, ad oras undu-  
-lato, saturate rubro, ad laevam colorem accedente, inferna vero parte, & pedica-  
-lo albis. — Lardajolo. — Autumno



p. 155.

Ag. rufula  
var. 2.

6. Fungus esculentus, magnus, suprema purpureus, inferne lamellis  
raris, & pediculo brevissimo, crasso, ac firmo albis. — Rosula maggiore.

idem.

7. Fungus esculentus, pileolo supina parte saturo-purpureo, prona vero  
& pediculo albis.

8. Fungus esculentus, pileolo desuper dilute purpureo, vinoso, & luteo  
albo vario, lamellis, & brevioribus pediculo albis. — Rosula mazzana. in sylv.

9. Fungus esculentus, albus, & subpurpureus varius, lamellis proorsus  
albis.

p. 156

10. Fungus in cœnosis nascent, pediculo, & suprema pileoli parte purpu-  
reo, & albo colore variegatis, lamellis albis. — Fungus brizzato. — in ulig.  
-nosis & cœnosis locis. — autumnali tempore.

11. Fungus esculentus, pileolo desuper dilute purpureo, inferne lamellis, &  
pediculo albis. — Prateasis.

12. Fungus esculentus, pileolo plano, carneo, vel roseo, subtus albo,  
pediculo crassiore, fistuloso, concolore, externe rugoso. — ubi 5.

13. Fungus parvus, pileolo inaequali, supina parte ex albo-subvino  
dilutissimo colore, prona vero saturo, pediculo candido, viz fistuloso. Autumn.

14. Fungus pileolo & pediculo caeruleis, lamellis albis. — Vedovino mag-  
giore — Autumno.

15. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, dilute caeruleo, lamellis albis,  
pediculo suprema pileoli parti concolore. — Vedovino minore, Turchino.

16. Fungus parvus, pileolo inaequali conum fastigiato, albo, purpureis  
maculis tigris ad instar notato, lamellis pariter purpureis, pediculo su-  
perna pileoli parti concolore. — Brizzato de Vasi. — In variis rueris bre-  
vioribus, non raro reperitur.

### Leucophæi & rufescentes.

Fungus esculentus, parvus, pileolo sursum reflexo, leucophæo, lamel-  
lis rufescentibus, pediculo suprema pileoli parti quasi concolore. — Severino.  
In sylvis & ericetis.

### Leucophæi & fuscis.

Fungus fimetarius, pileolo extensoris forma, leucophæo, subtus lamellis fuscis,  
pediculo pro parte tenuiore, fistuloso, & suprema pileoli parti concolore. — Piscicane  
Dilegine. — In sylvis & agris toto anno post pluvias exit.



## Griseo-fusci, &amp; carnes.

1. Fungus parvus, pileolo & griseo-fusco, subrusticulis carnis, pediculo summa pileoli parti dilute concolore, fistuloso.

2. Fungus parvus, pileolo pulvinato, utraque parte subfusca, vix ex griseo-fusco, pediculo firmo, ex albo-carneo.

Leucophæi, aut Grisei, aut Cervini, & Obscuri  
vel Nigricantes.

Fungus Stercorarius, pileolo leviter fastigiato, nitido, & griseo-cervino, inferne T. 73. obscuro, pediculo crassiore, non fistuloso, superna pileoli parti concolore. — 8. 1. Autumno in fimo Equini aggestis.

Ag. Stercorarius Scop. 2. Fungus in fimo equino natus, desuper cervini diluti coloris, subrus alius lamellatus, & fuscus, pediculo tenui, fistuloso, ac superna pilei parti concolore.

In fimo equini gravis, Vere & Autumno.

p. 157. 3. Fungus parvus pileolo <sup>sub</sup>obscuris, & veluti filamentoso, lamellis, & pediculo griseis. — Vere in Sylvis, Castanetis, &c.

4. Fungus parvus, infundibuliformis, obscurus, lamellis griseis, pediculo fove concolore. Octobri. per nemora nascent. non differt a N. 14. p. 145.

5. Fungus pileolo leviter fastigiato, superne obscuro, inferne griseo, pediculo tenuiori longo, superna pileoli parti concolore. — Autumno.

6. Fungus parvus, Eriophorus, pileolo campaniformi, superna parte cervini coloris, & in sericea filamenta lacerato, inferne lamellis concoloribus, pediculo albicante. — Fungo lanifero. — Octobri.

7. Fungus finetarius pileolo extractorii forma, leucophæo, lamellis nigris, pediculo tenuiori, præalto, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Pisciacane, spaguetio, diligine. — In Sylvis, & agnis super bubulo fimo. Vere & autumno.

8. Fungus finetarius, pileolo ex griseo-rufescente, rugoso, lamellis nigricantibus, pediculo præalto, tenuiori, ac fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Octobri in agnis.

9. Fungus parvus, Stercorarius, pileolo desuper griseo, cumenticula laeva quodammodo squamosa, inferne nigricante, pediculo superna pileoli parti saturationis coloris. — In fimo Equino cepata fermentatione, haud prorsus evaporata.

10. Fungus finetarius, teneberrimus, pileolo galericulato, cinereo, subrus lamellis nigricantibus, pediculo altiori, perangusto, pariter griseo. Pisciacane diligine &c. In tumulis fimo Equini non raro oritur.



## Spadicei &amp; grisei.

pag. 187.

Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, & spadiceo griseo, filamentoso, lamellis proceris griseis, pediculo supernae pileoli parti concolore. — Octobri.

## Spadicei &amp; olivacei coloris.

Fungus pileolo in plures partes, usque ad centrum fere diviso, desuper spadiceo, & filamentoso, inferne lamellis olivaceis, pediculo pileoli supernae parti concolore. — Fungus Strantherae. — Octob. p. agrorum sulcos humidiores.

## Lutei &amp; murini, aut cinerei.

Fungus obsolete luteus, pileolo hemisphaerico, parvo, lamellis murini coloris, pediculo proceris, tenuiori, fistuloso. — Fungus chiodo. — In nem. autumno.

2. Fungus pileolo parvo, in pyramidem quadrilateram veluti asurgente & simul cum longo, & fistuloso, & intorto pediculo aureo, lamellis cinereis, Seretta di Reta. — In hortis &c. autumno.

p. 158.

## Rufi, &amp; subpurpurei.

Fungus esculentus, ex rubro subpurpureus, inferne fulvus, pediculo crasso, pyriformi, & supernae pileoli parti concolore. — Fungus Zucchettino. — In nemora. Octobri.

2. Fungus parvus, pileolo raso, ac subhirsuto, lamellis dilute purpureis, pediculo intorto, fistuloso, & pileoli supernae parti concolore. — Pattoncino di gambo storto. — Novembri p. ambulacra &c.

3. Fungus pratensis, minor, superna parte, & bulboso pediculo fulvis, lamellis subpurpureis. — Pattoncino minore. — In harboris ambulacris.

## Fulvi &amp; lutei

Fungus pileolo desuper lacero, & veluti filamentoso, fulvi, pallentisque 7. 74. coloris, substantia, & lamellis buxidis, pediculo fistuloso, supernae pileoli parti concolore. — Octobri. in Sylvis.

2. Fungus Alno adnascens, pileolo amplo, clipeato, tenuiori substantia desuper ex fulvo lutescente, inferne lamellis, & pediculo breviori, obsolete luteis. — Fungus Giellone, di Ontano — ubi supra.

## Fulvi, &amp; violacei, vel dilute purpurei.

Fungus parvus, pediculo, & capitulo fulvis, lamellis dilute purpureis. In nem.

2. Fungus pileolo parvo, semiorbiculari, superne, & inferne fulvo, pediculo dilute violaceo, crasso, ac in acumen radicem versus desinente. — Nov. p. nem.



p. 158.

## Albi &amp; Fuscii

Fungus pileolo plerumque in plures partes usque ad centrum se dividente, superna parte, & procalo pediculo fulvis, inferne lamellis fuscis, radice bulbosa.

2. Fungus fimetarius, alius radicans, pileolo galericulato, simul cum pediculo fulvo, lamellis subfuscis. — In torrici gluma semiputr. nasens.

Fusci, vel obscuri, & purpurei.

Fungus pileolo hemisphaerico, superna parte, & pediculo fuscis, lamellis sordide, & dilute purpureis. — In nemoribus.

2. Fungus pileolo crispo, sursum reflexo, infundibulum imitante, superna parte, & pediculo obscuris, inferna vero lamellis dilute purpureis. — In nemoribus. novembri.

## Obscuri &amp; Carnei.

Fungus parvus, pileolo fornicato, obscuro, in medio umbilicato, & ubi vis inscribas, & tenuissimas squamas quasi laevato, lamellis carneis, pediculo dilute concolore, fistuloso. — Per Sylvas Castaneas, & Ericeta. Mayo.

## Obscuri &amp; Nigri.

p. 159.

Fungus fimetarius, pileolo desuper obscuro, cito lacero, & quasi filamentosa, lamellis nigricantibus, pediculo fistuloso, superna pileoli parti concolore. — In arenosis circa fossarum Aggeris Mayo.

## Obscuri, &amp; lutei, vel Auvei.

Fungus pileolo hemisphaerico, obsolete luteo, & ad vitellinum tendente lamellis obscuris, pediculo procalo, superna pileoli parti concolore. autumnus.

2. Fungus campestris, aureus, pileolo hemisphaerico, lamellis obscuris, pediculo superna pileoli parti concolore, radice bulbosa.

In stercoretis agris. Autumno.

3. Fungus totus luteus, pileolo ampliore, desuper maculis obscuris ubi vis radiato. — Octobri.

4. Fungus pileolo, & pediculo luteis, punctis subobscuris craberrime notatis, lamellis vero omnino subobscuris. — In Ericetis autumnus.



## Coccinei, &amp; aurantii coloris.

1. Fungus coccineus, inferne aurantii coloris. —

2. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, desuper coccineo, inferne lamellis aureis, pediculo summa parte plerumque coccinea, ima vero aurea. Oct.

## Rubri, &amp; lutei.

1. Fungus pileolo hemisphaerico, croceo, inferne lamellis, & pediculo rubris. In nemoribus autumnus.

## Tricolores, albi, grisei, &amp; spadicei.

1. Fungus pileolo ampliore, extensorii forma, oris lacris, superne spadiceo, & splendente inferne griseo, pediculo crassiore, cylindrico, albo. #. nem. octobri.

## Albi, grisei, &amp; lutei.

1. Fungus pileolo desuper dilute luteo, cuticula lacera, & quasi in sericea filamenta abscissa, subtus lamellis griseo-pallidis, pediculo albo, polline ejusdem coloris conperso. — Fungo Canapino, colore di Camoscio, & come di paglia. — Septembri & Sylvas.

2. Fungus parvus, superne ex luteo-refescens, inferne griseus, pediculo albo, arido, fistuloso. — Primavera in Nyctetis & arenosis.

## Albi, grisei, &amp; carnei, vel dilute purpurei.

1. Fungus esculentus, farinam recentem molitam redolens, pileolo desuper cinereo, inferne carneo, pediculo longiore, & crassiore, albo. — Grumato grigio. Octobri.

2. Fungus parvus, superne ex griseo-refescens, inferne purpureus, pediculo albo, tenui, cylindrico, fistuloso. — us. 10.

3. Fungus esculentus, superne griseus, inferne suave rubens, pediculo albo, tenui. — Mayo.

4. Fungus esculentus, farinam recentem molitam redolens, pileolo desuper griseo-argenteo, inferne lamellis rarioribus, carneis, pediculo albo. — Inguolo bastardo. — Mayo.



5. *fungus pileolo desuper e griseo rufescente, vel ex rufo griseo, inferne subpurpureo, pediculo cylindrico, albo, fistuloso. — Octobri.*

6. *Fungus parvus, subcinereus, lamellis purpureis, pediculo cylindrico, fistuloso, superne pileoli parti concolor. — In frum Equino, post pluvias.*

7. *Fungus superne pileoli parte ex albo grisea, inferne lamellis purpureis, pediculo albido. — Peverino — In erictis vere & autumno.*

### Albi, grisei, & Rufi.

*Fungus esculentus, farinam recentem redolens, pileolo desuper griseo, subtus lamellis primum carneo-rufis, postea fulvis, pediculo albo. — In sylvis.*

2. *Fungus parvus, gracilis, pileolo ampliore, griseo, lamellis subrufis, pediculo tenui, cylindrico, albicante, fistuloso. — In sylvis.*

3. *Fungus parvus, pileolo cucullato, superne e griseo rufescente, lamellis ex auro-fulvis, pediculo prateni, duro, albo-carneo, & tenuissime fistuloso. — Primovire in sylvis.*

4. *Fungus elegans, pileolo galeriulato, superne rugoso, & ex rufo fulvo, inferne saturo griseo, & tenuissime lamellato, pediculo radicem vestas crassescente, albo, fistuloso, crispo, & serici modo lucente. — Autumno in arvis Carbonariis.*

5. *Fungus minimus, pileolo acetabuli forma, centro rufo, reliqua parte albo, lamellis pariter albis, pediculo leucophæo, pulvisculo farinaceo referto. — Imburino di legni marci — Septembri super ligna putrida.*

### Albi, grisei, & Obscuri, vel nigri.

*Fungus infundibuli forma, desuper obscurus, subtus lamellis albis, pediculo griseo — Pratensis &c.*

2. *Fungus pileolo pulvinato, desuper e griseo-rufescente, inferne subobscurus, pediculo meatro, sesquilineam crasso, fistuloso, & candido. — Octob.*

p. 161 3. *Fungus pileolo campanulato, superne ex griseo-rufo, subtus lamellis obscuris, vel nigricantibus, pediculo gracili, albo, fistuloso — Sylvaticus.*



## Albi, Fulvi, &amp; Spadicei.

1. Fungus parvus, pileolo conico, crassiori substantia, Spadiceo, & stuposo, inferne lamellis fulvis, pediculo albo. — Fungo Canapino. — Octobri p. Sylvas & agros recentem aratos.

## Albi, Fulvi, &amp; rufi.

1. Fungus parvus, pileolo desuper rufescente, inferne lamellis dentatis, fulvis, pediculo cylindrico, albo, tenuissimo fistuloso. — Autumnus ad Populos.

2. Fungus parvus, pileolo ex rufo albo, lamellis fulvis, pediculo pro-  
-dus albo. — In Sylvis — Autumnus.

3. Fungus parvus, pileolo subhirsuto, & veluti araneosa lanugine infecto, colore subrufo, lamellis ex fulvo auriculis pediculo cylindrico, albo. — Autumn. p. prae.

## Albi, rufospadicei &amp; cervini.

Fungus odoratus, conaceus, Superne rufospadiceus, & subhirsutus, inferne primam albus, deinde rufescens, pediculo duro, cervini coloris. — Ad quercus. Mayo.

## Albi, Fulvi, &amp; obscuri, vel nigri.

1. Fungus pileolo catiniformi forma, fulvo, maculis obscuris notato, lamellis albis, pediculo cylindrico, fistuloso, tenuissimo, conicolore. — Piscivane perfrato. In fimo Equini aggestis. Errata.

2. Fungus pileolo fornicato, albo, in medio macula nigricante insignito, lamellis fulvis, pediculo brevi, Superne pileoli parti conicolore. In aggestis.

3. Fungus pileolo radiato, seu in tenuissimas partes tanquam radios usque ad centrum se dividente, fulvo, inferne lamellis obscuris, pediculo Crassior, albo, fistuloso, cylindrico. — Piscivane scapigliato. — In fimo Equini tumid.

4. Fungus esculentus, fulvus, & veluti filamentosus, lamellis albis, pediculo pro alto, obscuro, radice tumida in mucronem longum producta. Autumn.

5. Fungus pileolo superna parte fulvo, & filamentoso, ima albo, pediculo pro alto, intorto, coniceo, & subobsuro, radice tumida, in mucronem longum producta. — nemora autumnus.

6. Fungus pileolo amplo, obtuse fastigiato, atro-fulvo, lamellis obscuris, pediculo longiore, albo.

7. Fungus finetarius, pileolo conico, in superficie lacero, & veluti hirsuto, subfulvo, lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. — Piscivane peloso. In fimo Equino.



p. 161.

8. Fungus parvus, albus, pileoli vertice nigro, reliqua parte circularibus  
zonulis fulvis, inter se distinctis veluti interrupta, pediculo cylindrico, fistuloso.  
— Girasole, idest Solissequus — Majo in herbis, & ambulantibus hortorum,  
atque agrorum viget.

p. 162.

9. Fungus parvus, pileolo fornicato, albo, maculis fulvis, minutissime  
consperso, inferne nigricante, pediculo procerus albo. — In Quercuum Cavernis.

### Albi, rufi, & ferruginei

Fungus pileolo fornicato, tenuioris substantia, ferruginea aut torrefacta  
macula in medio insignita, in reliqua parte ex griseo-rufescente, & in pulcher-  
rimas, & quasi reticulatas rimas lacerato, lamellis tenuissimis albis, pediculo  
concolore, radice tumida. — Per prata — Octobri.

### Albi, rufi, & obscuri, vel nigricantes

Fungus minimus, pileolo hemisphaerico, superne rufescente, inferne albo  
& rarissime lamellato, pediculo nigricante, tenuissimo instar fili chalybis; De-  
cembris mense, super delapsa, & semiputrida querna folia pro nemora nascentis.

2. Fungus omnium minimus, super ardescensum junceum foliis articulo-Tab. 80.  
-sis nascentis, pileolo hemisphaerico, ex rufo fulvo, lamellis albidis, pediculo f. 9.  
Semiunciali, capillaceo, fusco; — In aliginosis nemoribus.

### Albi, lutei, aut pallidi & obscuri

Fungus pileolo extensorii forma, apice fusco, reliqua parte pallido, &  
guttis fuscis notato, lamellis, & longiore pediculo albis — Autumnas.

3. Fungus esculentus, pileolo desuper luteo, & obscure tineto, nunc  
commixti, nunc distincti coloris, lamellis, & pediculo albis — Cognata giallerella.

2. Fungus esculentus, pileolo pulvinato, desuper lutei & obscuri coloris in-  
ter se distincti, densissime variegato, inferne lamellis, & pediculo albis. —

4. Fungus parvus, pileolo pulvinato luteo, & obscuro colore vario, la-  
-mellis, & crassiore pediculo albis. — Tigratino di Tre Coloni. — In Ericetis.

### Albi, lutei, & nigri

Fungus pileolo hemisphaerico, sordide auresco, pediculo aliori, albo, lamellis  
concoloribus, ad oras punctis nigris notatis. — In Castanearum sylvis rarus.

2. Fungus esculentus, pileolo amplo, pulvinato, sordide luteo, lamellis al-  
-bis, ac per oras nigris punctis notatis, pediculo brevi, crasso, & veluti bulboso.



p. 163.

3. *Fungus pileolo conico, sordide luteo, lamellis nigricantibus, pediculo pro-*  
*-alto, albo, fistuloso. - Piscicane giallo. - In fimo bubulo. - Vere & autumno.*

*Albi, pallidi, & crocei.*

*Fungus parvus, perniciosus, colore varians, pileolo conico, per acuto, nunc croceus,*  
*nunc pallidus, interdum utriusque mixto, subrus albo, pediculo fistuloso, su-*  
*-perna pileoli parti conicolore. - In ambuletis inter graminia. - Autumno.*

*Albi, fusci, & purpurei.*

*Fungus esculentus, parvus, pileolo extinetorii forma, vertice fusco, reliqua*  
*parte albo, lamellis tenuissimis, & densissimis, concoloribus, pediculo purpureo-*  
*-caeruleo, radice bulbosa. - Autumno.*

2. *Fungus pileolo ampliori, extinetorii forma, superficie inequali, &*  
*fusca, lamellis purpureis, pediculo albo, lineis subfuscis, veluti reticulato.*  
*- Dormentone. - In nemoribus.*

3. *Fungus parvus, pileolo desuper fusco nigro, lamellis albis, pediculo cy-*  
*-lindrico, tenuiori, dilute violaceo. - Vedovino di Trecedoni.*

*Albi, Leucophaei, & spadicei.*

*Fungus pileolo amplo, ex spadiceo flavescens, cum limbo semper subrus*  
*replendo, lamellis albis, pediculo brevi, leucophaeo. - Autumno in Sylvis.*

*Albi, murici, & obscuri.*

*Fungus parvus, pileolo muricio, semiorbiculari, centro in papillam acutam vehi-*  
*-ti exprorecto, subrus lamellis crebris, albis, pediculo obscuro, radice bulbosa. - Octobr.*

*Albi, carnei, & obscuri.*

*Fungus parvus, pileolo complanato, obscuro, ac tenuissime corrugato, infer-*  
*-ne primum albo, deinde dilute rufescente, & ad carneum tendente, pediculo*  
*cylindrico, fistuloso, plerumque albo-pallido. - Maio & Sylvas.*

2. *Fungus parvus, pileolo fornicato, & griseo subobscuri, vertice nonni-*  
*-hil umbilicato, lamellis carneis, pediculo cylindrico, albo, tenuiori, vix fis-*  
*-tuloso. - In Sylvis.*

*Pallidi, Lutei, & Cocinei.*

*Fungus parvus, pileolo conico, aureo, & cocineovario, lamellis pal-*  
*-lidis, pediculo striato, atque intorto, fistuloso, & superna pileoli parti*  
*conicolore. - Autumno.*



p. 164.

Pallidi, lividi, & fusci.

Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, vertice fusco, reliqua parte, & pro parte pediculo pallidis, lamellis lividis. — Spallierello. — ad ficus. autumnus.

Lutei, cinnabarini, & nigri.

Fungus parvus, pileolo conico, partem coarctatam, partem vividam, cinnabaris rubore resurgens, inferne lamellis nigris, pediculo tumidiore, fistuloso, toto luteo.

Grisei, purpureo-caerulei, & nigri.

Fungus parvus, pileolo fastigiato, desuper nigro, subus griseo, pediculo tenuiore, ex purpureo caeruleo. — St. Sylvas autumnus.

Grisei, rubro-ferruginei, & obscuri.

Fungus pileolo cucullato, superna parte, & cylindrico pediculo in subobscuras, & rubro-ferrugineas lineas distinctis, atque laceratis, lamellis griseis. — Mayo.

Cervini, carnei, & obscuro-fulvi.

Fungus parvus, pileolo fornicato, desuper ex obscuro-fulvo, & vitido, lamellis alioribus, cervini coloris, cito in atramento solubilibus, pediculo cylindrico, tenuiore, sordide, & dilute carneo. — In fictilibus recenter fumo equino stercoratis.

Cinerei, dilute-purpurei, & obscuri.

Fungus parvus, pileolo cucullato, olivo, & umbilicato, atque in seneca filamenta lacerato, obscuro, lamellis dilute purpureis, pediculo tenuiori, cylindrico, cinereo. — Per ambulaia. — Verno tempore.

Rufi, obscuri, & nigri.

Fungus parvus, elegantissimus, pileolo umbilicato, ac trilobato, obscuro, T. 79. lamellis varioribus, torosis, & rufescentibus, pediculo coriaceo, nigro, fistuloso. — Super putridis, & humi projectis arborum truncis.

Fulvi, purpurei, & nigri.

Fungus pileolo ex fulvo-ferrugineo, & usque ad centrum in plures partes plerumque se dividente, lamellis nigricantibus, pediculo tenuiori, cylindrico, purpureo-violaceo diluto, fistuloso. — In nemoribus.

Albi, lutei, & medii inter utrumque coloris, scilicet albo-lutei.

p. 165.

Fungus alpinus, parvus, pileolo ex aureo-vitellino, subus albo, densissime, & tenuissime lamellato, pediculo quasi medii coloris. — Autumnus.



p. 165.

## Ex rubro-ferruginei, albi, &amp; medii coloris.

1. Fungus pileolo desuper ex rubroferrugineo, subius lamellis albis, pediculo medii coloris. — In Sylvis - autumno.

2. Fungus infundibuliformis, desuper rufescens, inferne albus, & tenuissime lamellatus, pediculo medii coloris. — Autumno in Pratis &c.

3. Fungus parvus, odoratus, infundibulacea imitans, pileolo desuper rufo, inferne albo, pediculo medii coloris. — In nemoribus autumno.

## Grisei, Lutei, &amp; medii coloris.

Fungus parvus, Autumnali tempore radicibus Allii adnascens, pileolo plano, griseo, lamellis luteis, pediculo medii quasi coloris. — Oxanino —

2. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, desuper ochroleuco, & limacino T. 74. glutine infecto, subius griseo, pediculo tenuiori, fistuloso, medii quasi coloris, F. 11. radice bulbosa. — Limacino pagliato di radice grossa. — In herbosis — post pluvias.

## Grisei, obscuri &amp; Medii coloris.

Fungus parvus, infundibuli forma, desuper obscurus, inferne griseus, pediculo medii coloris. — Variat aliquando totus albus, ideoque non differt a n. 14. pag. 144. — Octobri & nemora.

## Quadricolores albi, suave-rubentes, obscuri &amp; Sulphurei.

Fungus pileolo galeiculato, cute lacera, & quasi in sericea filamenta rissa, summa pileoli parte alba, media suave-rubescens, reliqua vero sub-obscura, lamellis crebris, sulphureis, pediculo albo, splendente, & veluti pustulato. — Autumno.

## Albi, grisei, pallidi, &amp; Rubri.

Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, sordide lutescente, inferne griseo, pediculo albo, maculis rubris notato. — In nemoribus autumno.

## Albi, dilute Coerulei, fulvi, &amp; nigri.

Fungus atramentarius, pileolo caucullato, apice fulvo, reliqua parte dilute coeruleo, lamellis nigris, pediculo albo, fistuloso. — In stercore Canino — Mayo.



Albi, cinerei, dilute purpurei, & atrii.

Fungus pileolo amplo, extintorii forma, vertice atro, reliqua parte cinereo, inferne lamellis, primis dilute purpureis, deinde nigris, pediculo fistuloso, albo, cylindrico. — In vineis, aliisque locis stercoratis. Autumno.

Albi, dilute purpurei, subfusi, & atrii.

Fungus nanus, pileolo amplo, extintorii forma, vertice atro, reliqua parte subfusco, inferne lamellis dilute purpureis, pediculo albo, ad radicem tumido. Capellone Piscinaceae. — Post diuturnas pluvias. Vere & autumno exit.

V. Pileolo desuper plerumque undique striato.

Unicolores, Albi.

Fungus Sterquilinius, gracillimus, totus albus, pileolo utrinque, & undique striato, pediculo atrio, tenui, fistuloso. — In fimo Equino - Octobri.

2. Fungus gracillimus, Androsacen, vel acetabulum marinum simulans, T. 79. primum totus albus, & farinallivis respersus, postea capitulo utraque parte f. 6. griseo, ac tandem lamellis ob vetustatem nigricantibus, pediculo fistuloso semper albo, radice scellata. — Maio & nemora.

Ag. umbelliferus L. 3. Fungus minimus, totus albus, pileolo hemisphaerico, utrinque striato, T. 80. lamellis rarioribus — Autumno variis in locis. f. 11.

Grisei, cinerei, Murini.

Fungus parvus, campestris, cinereus, pileolo galericulato, striato, pediculo in T. 79. superficie laevi. — Autumno in agris vulgo Stobbie. Fungo Stoppariae minores. f. 8.

2. Fungus minimus, acaulos ferre, griseus, pileolo fornicato, utrinque striato. T. 74. f. 8. — In caudicibus arborum post pluvias.

3. Fungus perpusillus, murini coloris, pediculo oblongo, pileolo tenui, utrinque striato, seu flabelli in modum plicatili.

Rufi.

Fungus ex rufo-fuscus, pileolo hemisphaerico, umbilicato, ac striato, subtus parum lamellato, pediculo pro albo, fistuloso, radice in tenuem & longum mucronem producta. — Fungo barbuto in sylvis.

2. Fungus parvus, totus rufescens, tenerimus, pileolo campanulato, utrinque & undique striato, pediculo tenuiori, fistuloso. — Maio.



p. 167.

3. Fungus parvas totus atro-rufescens, pileolo desuper undique, & leviter striato, subtus rare lamellato, pediculo paratenui, fistuloso. — Post diut. plu. in Syl. f. 8.

## Fulvi, seu Leonini coloris.

Fungus minimus fulvus, acaulos ferre, pileolo fornicato, & striato, necnon sparse lamellato, pediculo comulore vefecto. — Ad laud. arbor. post diut. plu. aut.

## Purpurei

Fungus fimetarius, minimus, subpurpureus, pileolo rare & utrinque striato, pediculo perangusto, fistuloso. — Funghietto di Lomeio, col capo rigato, tutto di colore violetto. — autumn. Super fimi equini tumulos.

## Bicolores albi, &amp; cinerei.

Fungus minimus, fimetarius, pileolo utrinque, & undique striato cinereo, aut murino, pediculo lanuginoso, & fistuloso, albo. — In primum fimo. Ver. f. 9.

2. Fungus minimus, tres, vel quatuor lineas altus, pileolo orbiculato, plano, utraque parte subcinereo, desuper in medio nonnihil umbilicato, reliqua parte striato, pediculo albo, fistuloso, infra & supra tumido. T. 79. f. 9.

Hicce fungus fugacissimus, vitam scilicet unico die finiens — Pluvia tempestare in vasis arena, fimo vacuo, & quisquiliis permixtis.

## Albi &amp; Rufi.

Fungus minimus bulbosus, tres, vel 4 lineas altus, pileolo galeularo, desuper undique, quasi striato, & rufo-albicante, inferne lamellis & fistuloso pediculo albis. — Varro tempore ubi procedens. T. 79. f. 10.

## Albi &amp; Lutei.

Fungus minimus, pileolo hemisphaerico, utrinque, & undique striato, super na parte luteo, prona vero & fistuloso pediculo albis. — Inter Muscos. — Gallian. f. 7. T. 75.

## Lutei &amp; Nigri.

Fungus sesquialter, gracillimus, pileolo desuper luteo & a vertice ad tertiam fere partem neri, reliqua vero striato, subtus lamellis nigris, pediculo aliori, sesquialteram crasso, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Piscicane dilegine, rigato, giallo, & nero. — In fimi equini aggestis — autumn. sed omnino varissimus.

p. 168.

## Albi, &amp; obscuri, vel fusi.

Fungus Campanulatus, pileolo obscuro, vertice lavi, reliqua parte kniato, subus lamellis, & fistuloso, ac cylindrico pediculo albis. — Rigatino di bosco.



2. Fungus pileolo ex obscuro griseo, vertice laevi, reliqua parte striato, lamellis albis, pediculo cylindrico, fistuloso, superna pileoli parti concolore. - Majo.

3. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, utrinque & undique striato, ac albo, vertice vero, & capillareo pediculo nigro. - In Sylvis. Octobri.

4. Fungus capitulo utrinque & undique striato ac albo, Præbiterorum pileolo aliquatenus simili, pediculo capillareo nigricante. - Marretta di Pate.

5. Fungus pileolo candicante, lamellis parvis (concoloribus) pediculo fusco splendente. Bot. Paris. 69. n. 58. Tab. II. f. 21. 22. 23.

### Grisei & obscuri, vel Nigri.

Fungus pileolo campanulato, desuper obscuro, in vertice laevi, reliqua parte sulcato, costis nitidis, sulcis vero transverse striatis, lamellis griseis, pediculo cylindrico, magis cavo, & superna pileoli parti concolore. - Hortensis.

2. Fungus fimetarius, minimus, griseus, pileolo cucullato, ubique striato, T. 74. lamellis nigricantibus, pediculo superna pileoli parti concolore. - In fimo Equi. f. 6.

### Rufi & Fulvi.

Fungus minimus, gracillimus, Musco Polygoni folio innascens, pileolo Tab. 80. galeculato, undique & leviter striato, fustoso, inferne rufa-griseo, pediculo f. 8. angustissimo, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. - Majo post pluvias.

### Virides & Carnei.

Fungus parvus, elegans, cantharidum colorem, splendorem, & odorem emulans, pileolo cum vertice laevi, reliqua parte pulchre striato, lamellis carneis, pediculo cylindrico, fistuloso. - Majo in Castaneis.

### Tricolores, albi, grisei vel cinerei, & fusci vel nigri.

Fungus pileolo ampliore, hemisphaerico, desuper pulchre, & undique fusco striato, griseo, inferne lamellis nigricantibus, pediculo cylindrico, albo, & fistuloso. - In fossarum aggeribus.

2. Fungus gracillimus, pileolo ampliori, cucullato, cinereo, & a fusco vertice ad tertiam fere longitudinis partem laevi, reliqua vero striato, lamellis pariter cinereis, pediculo albo, pro alto, fistuloso, & sesquilineam crasso. - Fungo gentile. - Inter herbas humectis Locis.



p. 169.

3. Fungus pileolo galericulato, ab imo ad summum striato, griseo, & lanuginoso, lamellis concoloribus, circa margines nigricantibus, pediculo cylindrico, albo, praefixo, fistuloso. — Autumno in fimo Equini aggestis.
4. Fungus pileolo parvo, conico, argutissime & undique striato, griseo, subtus lamellis nigris, pediculo aliori, albo lineam, vel sesquilineam crasso.
5. Fungus parvus, gracillimus, pileolo griseo, complanato, centro nonnihil umbilicato, & laevi, reliqua parte undique striato, lamellis nigricantibus, pediculo albo, lineam crasso, fistuloso. — Rigatino di Concio. Vere & autumno non solum in agris, sed etiam in sylvis super Equino fimo.
6. Fungus fimetarius, pileolo tenuis, substantia cinereo, centro nonnihil umbilicato, & laevi, reliqua parte striato, lamellis concoloribus, circa margines nigricantibus, pediculo lineam crasso, albo, fistuloso. — In hortis. majore.
7. Fungus minimus, terrestris, tenerimus, pileolo complanato, & umbilicato, proorsus striato, & cinereo-rufescente, inferne fusco, pediculo tenuissimo, albo, fistuloso. — Vere in fictilibus duobus renovatis saepe legitur.
8. Fungus minor, tenerimus, farina respergitus, pileolo superne cinereo, lamellis subtus tenuissimis, creberrimis, nigris (pediculo albo) Ray. Synops. &c.

Tricolores albi, fulvi, & medii inter utrumque coloris.

1. Fungus pileolo desuper fulvo-spadiceo, centro umbilicato & laevi, reliqua parte nigro ac veluti striato, inferne lamellis albis, pediculo praefixo, medii quasi coloris, radice tumida, in mucronem longius producta. — In hortis.
2. Fungus pileolo plano, fulvo, undique rugoso, & veluti striato, & inter peripheriam & centrum circulari, saturationi, & concolori macula notato, lamellis albis, pediculo medii coloris, radice olivae forma, in acutum & longum mucronem producta. — In nemora autumno.

Obscuri, fusi & medii inter utrumque coloris.

- Fungus parvus, pileolo fornicato, desuper obscuro, & magis ad oras, quam ad Tab. 74. reliquas partes pulchre striato, inferne lamellis fusco-griseis, pediculo lineam crasso, medii coloris & argutissime perforato. — In sylvis. majore.
- V. Omnia ut in ordine antecedenti, sed pileolo a dimidia fere longitudine usque ad peripheriam, vel circa ipsam duntaxat striato.

Albi.

- Fungus totus albus, pileolo extensorii forma, vertice peracuto, & ad oras nonnihil striato, pediculo longo, cylindrico, fistuloso, sesquilineam crasso. — In sylvis.



2. Fungus gracilis, totus albus, pileolo hemisphaerico, ad oras striato, pediculo altiori, fistuloso, sesquilineam crasso. — In fimo Equino, vel bubulo. Tab. 78. f. 6.  
 3. Fungus parvus, gracillimus, totus albus, pediculo conico, & media sui parte usque ad oras striato, pediculo biunciali, proterui. — Dillen.

### Grisei, aut Marini.

Fungus, sive Amanita, pileolo plano, orbiculari, oris nonnihil striatis D. Dilleni. Ex libro ejusdem de puto, ut etiam sequens.

2. Fungus, sive Amanita, parva, utrinque striata, pileolo coniformi, marini coloris Dill. Cat. Giss. 182.

### Lutei.

Fungus luteus, pileolo hemisphaerico, & a medio ad peripheriam striato, pediculo altiori, fistuloso, sesquilineam crasso — Spallino rigato. Inter semiputrida folia post diuturnas pluvias Vere & autumno oritur.

2. Fungus parvus, flavo-fuscus, pileolo galeinulato, a medio ad peripheriam striato. — Amanita parva, striata, flavofusci ubivis coloris Dill. Cat. 182.

### Fulvi.

Fungus parvus, fulvus, pileolo in obtusum conum fastigiato, & a media sui parte usque ad oras subtilissime striato, pediculo altiori, lineam crasso, & fistuloso — Fungus vello dilegine, colore di foglia morta, col capello a foglia di Campagna.

### Albi & Spadicei

Fungus viscidus, pileolo amplo, fornicato, spadiceo, & a medio ad peripheriam striato, castis ab origine ad tertiam fere longitudinis partem levibus, reliqua parte Margaritarum lineis in modum nodosis, lamellis, & pediculo albis. — Lunaeone rigato. — Autumno.

### Obscuri & nigri.

Fungus minimus, lignis foliis semiputridis innascens, pileolo semi-orbiculari, & a media sui parte usque ad oras striato, superne, & inferne obscuro, pediculo capillaceo, nigro.



IV. Pediculo anulato, anulo permanente, & adherente.

V. Pileolo desuper non striato.

### Unicolores Albi.

Fungus bulbosus, campestris, esculentus, totus albus, pediculo palmarum, non fistuloso, anulo perangusto cincto. —

p. 171. 1. Fungus finetarius, totus albus, pileolo fornicato, squamoso, pediculo cylindrico, obeso, cujus cutis in cinnamatas, & acutas squamas soluta. — fungo Pellucione ricciato maggiore. — In feni Equi Camalis per agros.

2. Fungus pratensis, totus albus, pileolo & pediculicute inenulofidas, & cinnamata squamas pulchras soluta. — Fungo Pellucione ricciato minore.

3. Fungus totus candidus, pileolo ampliore, glutine limacino infecto, pediculo tenuiori, cylindrico, anulo striationi cincto. — In Fag. Sylvis.

4. Fungus bulbosus, nemorosus, esculentus, albus, pileolo fornicato, pediculo cylindrico, crasso. — Autumno.

5. Fungus esculentus nemorosus, albus, pediculo longo, crasso, radice tumida. — Prapolo di ragnaja tutto bianco, buono, e di gambo lungo.

6. Fungus esculentus, pratensis, totus albus, pediculo brevi, obeso.

7. Fungus esculentus, totus albus, & splendescens, pileolo pulvinato, parvo, pediculo aliori, cylindrico, anulo peramplo cincto. — Ad Sepes.

8. Fungus totus candidus, pileolo fornicato, pediculo tenui, anulo striationi cincto, radice crassa & pyriformi. — Bubbolina bianca, buona &c.

9. Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato, pediculo cylindrico, tenuiori, anulato, fistuloso. — In Sylvis — Autumno.

Tab. 78  
f. 7.

### Lutei vel Crocei

Ag. Fitericus  
Scop. pol.

1. Fungus esculentus, odoratus, pileolo fornicato, pediculo longo cylindrico, anulato. — Lecino giallo. (Frag. solis. Splend. curricula filam. Pil. aur. Caro etiam flava)

2. Fungus parvus, totus luteus, pileolo pulvinato cum oris subres repandis, pediculo tenui, cylindrico, anulo perangusto ornato. — Giallini di gambo corto.

3. Fungus parvus, croceus, pileolo pulvinato, pediculo longo, angusto, cylindrico, & anulato. — In Ericetis & Sylvis ceduis. — Autum.



## Purpurei.

Fungus esculentus, bulbosus, subpurpureus, pileolo complanato, & in superficie laevo, pediculo brevi, annulato. — Bubboletta buona, colore di Argata, o di Principe, striato. — ~~et~~ venosa.

## Bicolores albi, &amp; grisei vel cinerei, aut Cervini.

Fungus esculentus, bulbosus, pileolo lato, nonnihil fornicato, saturo-griseo, vertice papillato, lamellis, & palmaris ac annulato pediculo albis.

2. Fungus campestris, bulbosus, pileolo fornicato, desuper cinini coloris, & in vertice quasi fastigiato, subtus lamellis albis, pediculo concoloris, annulato, & vix fistuloso, radice bulbosa. — In sylvarum locis.

3. Fungus bulbosus, esculentus, pileolo fornicato, desuper griseo-saturo, cute laevo, centro papillato, lamellis albis, pediculo longo concoloris, anulo subtecto cincto. — In Capretis & senecosis locis autumnis albis.

4. Fungus esculentus, parvus, pileolo griseo, fornicato, atque in medio fastigiato, lamellis albis, pediculo pariter albo, fistuloso & annulato.

5. Fungus esculentus, pileolo fornicato, griseo-plumbeo, lamellis albis, pediculo concoloris, quasi cylindrico, anulo perangusto cincto. — In herbosis. Mayo.

6. Fungus esculentus, pileolo fornicato, desuper cinini coloris, cute laevo, lamellis albis, pediculo concoloris, anulo perangusto cincto, radice quasi bulbosa. — In agris.

7. Fungus esculentus, parvus, pileolo pulvinato, albo, & limbo glutine infecto, lamellis murinis, pediculo pariter albo, gemino, & perangusto anulo cincto. — Frangole Bianca. — In agris. Vere.

## Albi &amp; lutei.

Fungus campestris, aestivalis, pileolo complanato, albo, lamellis luteis, pediculo longo, cylindrico, superius pileoli parti concoloris, & anulo perangusto cincto.

2. Fungus parvus, pileolo ochroleuco, lamellis albis, pediculo tumido, superius pileoli parti concoloris, & annulato. — Funghetto colore di lamorio, o di terra gialla. — In Apicis.

## Albi &amp; Rufi.

Fungus esculentus, bulbosus, pileolo amplo, fornicato, ex rufo-fulvo, cute valde laevo, & in filamenta veluti dissecta, lamellis, & annulato pediculo albis. — Indisus.

2. Fungus bulbosus, esculentus, pileolo desuper rufescente, & in media protuberante, inferius albo, pediculo longo, concoloris, anulo angusto cincto.

3. Fungus bulbosus, esculentus, pileolo ex rufo-fulvo, cute nonnihil laevo, centro papillato, lamellis, & annulato, ac longo pediculo albis. — In sylvis. — Bubba buona.



# 173.

4. *Fungus esculentus*, pileolo fornicato, desuper ex rufo-fulvescente, inferne albo, pediculo cylindrico, pro alto, crasso, concolore, & ample anulato. — Autumno.
5. *Fungus esculentus*, odoratus, pileolo superne rufescente, inferne albo, pediculo longo, concolore, anulato. — Ad ficus. autumno.
6. *Fungus bulbosus*, esculentus, pileolo rufo-ferrugineo, vel atro-rufescente, cute laevi, & veluti squamosa, lamellis albis, pediculo fistuloso, concolore, anulo per angusto radice reversus cineto. — Octobri.
7. *Fungus bulbosus*, esculentus, pileolo rufo-ferrugineo, vel atro-rufescente parvis, pileolo desuper ex albo-rufescente, inferne prorsus albo, pediculo concolore, fistuloso, & anulato. — In Enietis.
8. *Fungus bulbosus*, esculentus, pileolo rufo-spadiceo, vel rufo-griseo, lamellis albis, pediculo superne pileoli parti concolore, & vix anulato.
9. *Fungus esculentus*, pileolo plano, rufo-fusco, inferne albo, pediculo cylindrico, concolore, anulato. — Autumno.
10. *Fungus esculentus*, parvus, pileolo extensori forma, patulo, rufescente, lamellis unam cylindricis, ac anulato pediculo albis. — Vere in senticosis &.

## Albi &amp; Fulvi.

*Fungus* pileolo, & pediculo albis, ac maculis fulvis paucissimis infectis, lamellis prorsus fulvis. — Ad sepes, & in sylvis. autumno.

## Albi &amp; Obscuri, vel Fuliginosi.

*Fungus bulbosus*, esculentus, maximus, pileolo fornicato, subobscuro & laevi, centro papillato, lamellis albis, pediculo pro alto, fistuloso, & superne pileoli parti concolore, anulo firmo cineto. — Octobri in Sylvis. In Italia editur.

2. *Fungus esculentus bulbosus*, pileolo insigniter echinato, ex obscuro-ferrugineo, inferne lamellis subtilissimis, & densissimis, albis, pediculo superne pileoli parti veluti concolore, & anulo ampliore cineto. Viget ubi & quando s.

3. *Fungus esculentus*, pileolo ex obscuro fulvo-purpureo, inferne lamellis albis, pediculo ventricoso, superne pileoli parti concolore, anulo per-ample cineto, radice veluti vorticata. — Collarone, o Sottana di bosco.

4. *Fungus bulbosus*, esculentus, parvus, pileolo ex obscuro-ferrugineo-rufescente, inferne lamellis tenuissimis, albis, pediculo anulato, & superne pileoli parti colore nonnihil infecto. — Octobri.

# 174.

5. *Fungus esculentus*, parvus, totus albus, pileolo fastigiato, maculis subobscuris notato. — Rubbolina buona, odorifera, brizzolata. — In agrorum fossis, & in aggeribus. Autumno.



p. 174 6. Fungus parvus, pileolo albo, & quasi fuligine infecto, atque scrobiculis  
~~levis nate~~ seu lacunulis parvis excavato, lamellis, & anulato pediculo  
 prorsus albis. — In agris, arundinetis, & stagnosis locis — Estate.

7. Fungus Finetarius, pileolo obuse coniformi, fuliginoso, lamellis al-  
 bis, pediculo conicolore, proalto, cylindrico, fistuloso, duas lineas crasso, ad  
 radicem versus anulato. — Autumno.

### Albi & Rubri.

Fungus pediculo concolori & pileolo suave-rubentibus, lamellis albis.

### Albi & Purpurei.

Ag. pratensis  
 Scop.

Fungus esculentus, magnus, albus, pileolo fornicato, lamellis subrubentibus,  
 pediculo longiore, & crassiore ample anulato. — Pratajolo maggiore bianco, buono.

idem.

2. Fungus esculentus, major, pileolo lato, pulvinato, superna parte candido,  
 inferne lamellis purpurascens, pediculo brevi, superna pileoli parti conicolore,  
 & duplici anulo cineto. — Pratajolo maggiore di gambo cotto, bianco, e con doppio  
 anello. — In Italia editur.

3. Fungus esculentus, albus, pileolo insuperficie nonnihil lacero, ad oras  
 angulato, & limbo membranaceo cineto, lamellis dilatesime purpureis, pe-  
 diculo longiore plerumque rimoso, pariter albo, radice bulbosa.

4. Fungus esculentus albus, pileolo angulato, desuper nonnihil lacero,  
 ad oras limbo membranaceo cineto, lamellis ex albo subpurpureis, pediculo  
 longiore, plerumque rimoso, radice tenuiori. — Ad sepes & in majo-

5. Fungus esculentus, pileolo desuper albo, & in superficie lacero, sub T. 75.  
 tus subpurpureo, pediculo superna pileoli parti conicolore, anulo parvo F. 1.  
 cineto, radice candida, reticulata, tero alba immixta. — Pratajolo di rad. profon-  
 da, & reticulata.

6. Fungus esculentus, hortensis, parvus, pileolo desuper albo, & lacero, T. 75.  
 inferne subrubente, pediculo superna pileoli parti conicolore, anulo tenuiore F. 3.  
 cineto, radice candida, repente. — Pratajolo di radice serpeggiante

7. Fungus esculentus, pratensis, pileolo fornicato, desuper levi, & candido, in-  
 ferne subpurpureo, pediculo brevior, ample anulato, & superna pileoli parti  
 conicolore. — Pratajolo bianco.

Ag. campestris  
 L.

8. Fungus campestris, albus superne, inferne rubens. — In pratibus.



p. 178.

9. Fungus esculentus, pileolo fornicato, desuper albo, & lœvi, inferne vero subpurpureo, pediculo superne pileoli parti concolore, anulo peramplo cincto. Pratajola Turino. - In pratis.

10. Fungus parvus, nitide albus, lamellis carneis, aut roseis, pediculo - anulato, superne pileoli parti concolore.

### Albo-Purpurei, & prorsus Purpurei

Fungus esculentus, desuper ex albo purpurascens, & veluti subhirsutus, subtus sordide purpureus, pediculo brevissimo, superne pileoli parti concolore, & anulo perangusto cincto. - Pratajola Salvatica rosso. - Arcum.

### pallidi, & lividi, vel Grisei.

Fungus campestris, esculentus, desuper palacei coloris, lamellis livido-nigris, pediculo ample anulato, & superne pileoli parti concolore. - C. f. sp. 1.

2. Fungus vernus, pileolo superna parte albo-sulphureo, seu ochroleuco, inferius lamellis griseis, pediculo albo, ample anulato, radice bulbosa. - Ad fossas & locos aggerosos, necnon in sylvis, pratis, &c. crep.

### Grisei, Nigri, vel Obscuri.

Fungus bulbosus, esculentus, pileolo fornicato, desuper obscuro, inferne griseo, pediculo anulato, superne pileoli parti concolore, quasi.

2. Fungus bulbosus, serotinus, pileolo obuse coniformi, nitido, & griseo, inferne nigricante pediculo tenuissime fistuloso, & superne pileoli parti concolore. - Per feni Equini granulos.

### Tricolores albi, Grisei, vel cervini, & Purpurei, aut Subpurpurei

Fungus bulbosus, esculentus, superna lamina, aut cervini coloris, cute lacera, & veluti filamentosa, lamellis albis, pediculo pro albo, anulato, subpurpureo. - Bubbola Salvatica.

2. Fungus esculentus, pileolo hemisphaerico, griseo-cervino, inferne lamellis dilute purpureis, pediculo longo, cylindrico, albo, anulo perangusto cincto. - Pratajola Salvatica di gambo lungo, ed anello stretto. In syl. & ad sep.

3. Fungus perniciosus, superna griseus, & leucopholus, inferne dilute purpureus, pediculo albo, brevior, anulato. - Pratajola d. Turino minore. in hortis.



1. *Fungus esculentus, superna parte e griseo-albus, inferna subnubens, pediculo proorsus albo, radice repente. — In arundinetis & ad sepes.*

p. 176. 5. *Fungus minimus, esculentus pileolo e griseo subobscuro, cute lacera lamellis albis, pediculo cylindrico, anulato, subpurpureo. — In silvis.*

*Albi, Grisei, & Flavi.*

T. 78.  
f. 6.

6 *Fungus vernus, pileolo sulphureo, & ad paleaceum colorem tendente, lamellis griseis, pediculo albo, ample anulato, radice bulbosa. — In prat. hort. &c.*

2. *Fungus esculentus, parvus, pileolo hemisphaerico, desuper pallide luteo, subtus dilute purpureo, pediculo albo, cylindrico, gemino, & perangusto anulo cincto. — In agris post satum & enatum triticum.*

*Albi, rufi, & Flavi.*

6 *Fungus esculentus, odoratus, superna rufescens, inferne pallidus, pediculo albo, longo, cylindrico, & anulato. Ad sepes in sambuci vimis nascitur.*

*Albi, purpurei & Fulvi, vel fulvo-subobscuri.*

6 *Fungus esculentus, pileolo desuper ex fulvo-subobscuro, cute lacera, inferne dilute purpureo, pediculo longo, albo, anulato, ac radicem versus coarcescente. — Pratale Salvatico. Per fimi Equini tumulos.*

2. *Fungus esculentus, parvus, acaulis ferme, pileolo fornicato, intense fulvo, Superficie in ampliores squamas veluti scissa, lamellis carnis, vel suave-rubentibus, pediculo brevissimo, albo, anulato.*

*Albi, rufi, & Medii inter utrumque Coloris.*

6 *Fungus esculentus, e griseo-rufescens, inferne albus, pediculo longo, cylindrico, medii coloris, anulo perangusto cincto. — Autumno.*

2. *Fungus parvus, esculentus, pileolo atro-rufescente, patulo, ac in medio protuberante, subtus albo, pediculo cylindrico, medii coloris, & anulo perangusto cincto.*

3. *Fungus minimus, pileolo in medio papillato, undique atro-rufescente, cute lacera, veluti squamosa, lamellis albis, pediculo vix fistuloso, & anulato, medii Coloris.*

Tab. 78.  
f. 8.

*Albi, fulvi, & Fusc.*

6 *Fungus bulbosus, esculentus, pileolo extensorii forma, vertice fusco, reliqua parte fulva, & veluti squamosa, lamellis albis, pediculo anulato, & superna pileoli parti concolore. — Bubbola buona, Scagliosa.*



## Albi, Ferruginei, &amp; Fuscii.

Fungus bulbosus, parvus, pileolo extensori forma, ferrugineo, & maculis fuscis minutissimis undique infecto, lamellis albis, pediculo annulato, superna pileoli parte conicolore. — *Bubolina Calliva*.

## Flavi, rufi, &amp; Obscuri.

Fungus esculentus, pileolo in medio veluti hirsuto, & flavescente, reliqua parte ex atro rufescente, inferne colore non dissimili, sed valde dilato, pediculo crassiore, obscuro, inter pileolum, & protenue anulum striato.

## Quadricolores obsolete lutei, ferrugini, subpurpurei, &amp; Fuscii.

Fungus bulbosus, esculentus, pileolo complanato, limbo ferrugineo, reliqua parte obsolete luteo, & maculis pariter insignitis ferrugineis, subus lamellis dilute purpureis, pediculo annulato, fusco — *Bubola Buona di quattro colori*.

## IV. Pediculo annulato, anulo durabili, &amp; eidem pediculo non adhaerente.

## Unicolores, albi

Fungus collinus, candidus, duplici pileolo. — *Michel non vidit*.

## Bicolores albi, &amp; obscuri, vel Fuscii.

Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato.

2. Fungus quercinus, dipsaioides (pileolo conico — Fungus bulbosus, fuscus, duplici pileolo. C.B. Pin. 371. Inst. R.H. 557. — Per agros.

3. Fungus bulbosus, esculentus, maximus, pileolo inanimoso, obscuro, & in filamenta quasi lacerto, vertice papillato, subus lamellis albis, pediculo cubitali, fistuloso, superna pileoli parti conicolore, & pariter lacero, corolla amplissima, soluta cineto. — *Bubola maggiore coll'anello non fissato al gambo*. Tab. 81. f. 1.

4. Fungus bulbosus, esculentus, medius, pileo fornicato, obscuro, & in superficie lacero, lamellis albis, pediculo palinari, superna pileoli parti ferme conicolore, & pariter lacero. — *Bubola mezzana d. mazza da Tamburro*.

5. Fungus bulbosus, esculentus, medius, pileolo desuper obscuro, subus lamellis albis, pediculo palinari, facto, superna pileoli parti conicolore, anulo perangusto soluto cineto — Autumno in Ericetis, Capris sylvis, &c.



IV. *Pediculo anulato, anulo non permanenti, seu fugaci, qui ut plerimum dum pileolus dehiscit, in arenarium telum vel in membranacea frustula, modo ad pediculum, modo ad pilei circumferentiam solvitur atque disperditur.*

### Unicolores albi.

1. *Fungus major, albus, villosus, & quasi quadrilaterus dum a terra erumpit, ovum gallinaceum referens, postea aditus in oblongam notam producit, & in atramentum resolvitur, pediculo fistuloso, candido, ac anulo fugaci cineto, radice rostrata. — Vere & autumno in arenosis, in ripis, inter iuncos &c.*

2. *Fungus minor villosus, & ex albo-rufescens, dum nascitur ovum gallinaceum referens, postea in notam oblongam producit, & in atramentum resolvitur, pediculo fistuloso, candido, anulo fugaci cineto, radice rostrata. In pascuis.*

3. *Fungus totus albus, pileolo fornicato, pediculo crassiore, quadrilobato, anulo fugaci cineto. — Pluribus in locis autumno oritur.*

4. *Fungus parvus, totus albus, pileolo inaequali, pediculo cylindrico, in spiram modum plerumque intorto, anulo fugaci cineto. — Autumnalis.*

### Grisei.

*Fungus esculentus, griseus, pileolo pulverinato, & in medio nonnihil excavato, pediculo crasso, cylindrico, ac anulo fugaci cineto. — Autumnus.*

### Xanthini.

*Fungus bulbosus, xanthinus, pediculo longo, crassiori, anulo fugaci cineto. fungo vedovo, capelluto.*

### Fulvi.

*Fungus parvus totus fulvus, pileolo fornicato, pediculo gracili, cylindrico, anulo fugaci cineto. — In herbosis ambulatoris. Tab. 75. f. 4.*

2. *Fungus fulvus, pileolo expanso, ac leviter fastigiato, pediculo altiori cylindrico, anulo fugaci cineto.*

### Obsolete lutei.

*Fungus odore, & sapore raphanum simulans, obsolete luteus, & ad olivae conditae colorem accedens, pileolo pulverinato, in superficie laevi, pediculo anulo fugaci cineto, ac radicem versus crassescens.*



pag. 179.

2. Fungus odore, & sapore Raphanum simulans, obsolete luteus, & ad fulvum colorem tendens, pileolo leviter fastigiato, & quasi subhiolato, pediculo longo, cylindrico, anulo fugaci cineto. — Fungo Ramolaccio giallo &c. Autum. Tab. 78 fig. 2.

### Bicolores albi & grisei.

Fungus pileolo pulvinato, crassioris substantia, superne albo, inferne griseo, pediculo cylindrico, fistuloso, pariter albo, anulo fugaci cineto, radice plerumque bulbosa. — Primovese.

### Albi & Fulvi.

Fungus pileolo fornicato, Superne, & inferne ex rufo-fulvo, pediculo albicante cylindrico, anulo fugaci cineto. — In Sylvis.

2. Fungus pileolo pulvinato, ex rufo-fulvo, lamellis albis, pediculo Superne pileoli parti concolore, & anulo fugaci cineto, ac radicem versus coarcescente. — usi.

3. Fungus esculentus, albus, lamellis duntaxat fulvis, pediculo crasso quasi cylindrico, anulo non permanenti cineto. — Octobr.

4. Fungus pileolo fulvo, & limacino glutine admodum infecto, lamellis primum dilute purpureis, postea Superne pileoli parti concoloribus, pediculo cylindrico, anulo fugaci cineto, albo, cujus cutis in plures circulares Zonulas pulchre, & constanter se dividit. — Autumno in Sylvis passim.

5. Fungus parvus, superne ex fulvo-spadiaceus, inferne atro-fulvus, pediculo cylindrico, albo veluti sericeo, ac anulo non permanenti cineto. — In horis.

### Albi, & Castanei.

Fungus pileolo pulvinato, castanei coloris, inferne lamellis albis, pediculo tumido, Superne pileoli parti concolore, ac anulo fugaci ornato. —

pp. 180.

### Albi, & obscura Subpurpurei.

Fungus parvus, ex obscura-subpurpureus, pileolo hemisphaerico parvo, lamellis albis, pediculo cylindrico, pariter albo, ac anulo fugaci cineto. In nemoribus.

### Albi & Nigri.

Fungus atramentarius, vel potius in atramentum solubilis, pileolo cucullato, primum albo, post lacerationem cutis una cum lamellis nigro, pediculo cylindrico, fistuloso, candido, anulo non permanenti ornato. — Pisciarane Maggiore Bianco, enero. — In fine Equino.



## Lutei, &amp; Fulvi.

*Fungus esculentus*, pileolo desuper paleacei coloris, dilute luteus, pileolo for-  
-nicato, subtus ex obscuro nigricante, pediculo cylindrico, superna pileoli parti  
concolore, & anulo fugaci instructo, radice bulbosa. — Super equinum firmum adhuc  
a fermentatione calefactum.

*Fungus esculentus*, pileolo desuper paleacei coloris, lamellis extra-fulvis, pe-  
-diculo superna pilei parti concolore, anulo fugaci munito, radice fovee bulbosa.  
Prenato giallo.

2. *Fungus* pileolo fornicato, superiore luteo, subtus lamellis fulvis, pediculo  
fistuloso, turgido, superna pileoli parti concolore, & anulo non permanenti or-  
-nato. — Autumnali tempore.

## Lutei &amp; obscuri.

*Fungus stercorarius*, viscidus, dilute luteus, pileolo fornicato, subtus ex obscuro  
nigricante, pediculo cylindrico, superna pileoli parti concolore, & anulo fugaci  
instructo, radice bulbosa. — Super firmum equinum adhuc a fermentatione calefactum.

## Tricolores albi, Leucophæi, &amp; obscuri.

*Fungus parvus*, odore gravi, pileolo desuper obscuro, inferne albo, pediculo  
cylindrico, leucophæo, anulo non durabili praedito.

## Albicanter, Ochroleuci, &amp; rufo-pallidi.

*Fungus viscidus*, pileolo fornicato, desuper rufo-pallido, lamellis ochroleu-  
-cis, pediculo longo, cylindrico, albicante, ac anulo momentaneo cincto. —  
Autumno in Sylvosis.

## Albi, rufi, &amp; Rubentes.

*Fungus bulbosus*, pileolo hemisphaerico, crassioris substantia, superne ru-  
-fescente, inferne subrubente, pediculo albicante, anulo fugaci ornato;  
Octobri.

## Albi, aurei, &amp; Violacei.

*Fungus viscidus*, pileolo fornicato, desuper ex aureo-pallido, subtus  
dilute violaceo, pediculo albo, anulo non permanenti cincto, ac radicem  
versus crassescente. — In Sylvosis.



## Albi, Rosei, vel Suave-rubentes, & nigricantes.

Fungus in arenosis nascent, pileolo conico sex uncias longo, ex albo-roseo, vel suave rubente, lamellis nigricantibus, pediculo fragilis, cylindrico, fistuloso & candido, ac anulo non durabili ornato. — Pisciaeane de venis dicto abominanti Guglia.

## Albi, obscuri, & nigri.

Fungus bulbosus, pileolo complanato, obscuro, oris sursum reflexis, lamellis nigricantibus, pediculo candido, palmari, fistuloso, anulo non durabili instructo. — Super Equini fini Tumulos. autumnus.

## Albo-purpurei, spadiceo-pallidi, & fulvi.

Fungus viscidus, pileolo fornicato, desuper spadiceo-pallido, ad peripheriam rugoso, lamellis fulvis, pediculo cylindrico ex albo-purpurascente, anulo fugaci aucto. — autumnus.

## Fulvi, Violacei & Livido-fusci.

Fungus bulbosus, pileolo complanato, livido-fusco, ad oras dilute violaceo, lamellis fulvis, pediculo superna limbi pilei parti concolore, anulo non durabili ornato. — Ad Sepes.

IV. Pediculo anulato, anulo ut supra.

V. Pileolo desuper ubivis striato.

## Bicolores albo-grisei & nigricantes.

Fungus sterquilinus ex albo-griseus, pileolo striato, ac in superficie Tab. 80. laevo, vertice nigricante, pediculo cylindrico, albo-griseo, anulo fugaci munito. f. 3. Super fini Equini Tumulos.

III. Volva seu involucreo amplo, & valde apparente erumpentes, ad radicem diu permanente.

IV. Pediculo non anulato.

V. Pileolo desuper non striato.

## Unicolores Luteo-pallidi.

Fungus parvus, & volva erumpens, pallide luteus, pileolo pulvinato, pediculo brevissimo cylindrico. —

## Damae coloris.

Fungus minimus, & volva erumpens, Damae fusci coloris, & Serici instar lucens, pileolo leviter fastigiato, pediculo cylindrico. — Autumnus in nemoribus.



## Bicolores, albi, &amp; carnei.

*Fungus magnus, esculentus, e volva erumpens, pileolo villosus, albo, lamellis Tab. 76. carneis, pediculo cylindrico, glabro, pariter albo. — Super verustas & semimortuas fig. 1. arbores — astate.*

2. *Fungus parvus, e volva erumpens, pileolo fornicato, albo, & sericeo, lamellis carneis, pediculo cylindrico, fistuloso, superna pileoli parti concolore. Per herbosa ambularia, atque foparum aggeres. Autumno —*

3. *Fungus minimus, odoratus, e volva erumpens, pileolo albo, & veluti sericeo, inferne carneis, pediculo cylindrico, fistuloso, & superna pileoli parti concolore — Vere & Autumno.*

## Albi &amp; Grisei.

*Fungus e volva erumpens, pileolo supina parte e griseo subobscuro, pro-na vero primum albo, postea dilute purpureo, pediculo non fistuloso, semper albo, radice bulbosa. — Autumno & proata &c.*

## Albi &amp; Lutei.

*Fungus esculentus e volva erumpens, pileolo fornicato, supina parte luteo, inferne albo, pediculo longo, cylindrico, pariter albo. — In sylvis.*

## Albi &amp; Virides.

*Fungus e volva erumpens, pileolo superna parte viridi, & splendente, lamellis, & cylindrico pediculo albis. — Sylvaticus — ad Hices.*

## Albi &amp; Obscuri.

*Fungus parvus, e volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro viridicante cuti lacera, & veluti squamosa, inferne albo, pediculo cylindrico, superna pileoli parti concolore. — In Viridariis.*

## Grisei &amp; Fusci.

*Fungus griseus, e volva erumpens, pileolo fornicato, centro fusco, pediculo cylindrico tenuiore, in superficie lacero, & veluti squamoso. — Astate in clausura Chartusie Vallis Pisis, sed raro.*

## Tricolores albi, murini, &amp; rufescentes.

*Fungus esculentus, e volva erumpens, odore, & sapore Raphani, griseus, inferne rufescens, pediculo albo, longo, radice bulbosa. Loppajola. — Ad Tritici palearium inter glumas, & paleas semiputridas, tempore autumnali.*



## Albi, grisei-argentei, &amp; carnei.

1. Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo desuper griseo-argenteo splendente, subus carneo, pediculo longo albo, radice bulbosa. — Autumno per Fimi Equini Tumulos.

## Albi, rufi, &amp; murici.

1. Fungus e volva erumpens, pileolo leviter fastigiato, desuper murici coloris, inferne ex albo-rufescente, pediculo albo, cylindrico. — Juxta paleas.

V. Omnia ut in antecedenti divisione sed pileolo a medio ad peripheriam, vel in ipsa peripheria tantum striato.

## Unicolores, albi.

1. Fungus esculentus, e volva erumpens, major, totus albus, pileolo obtuse fastigiato, & ad peripheriam striato, pediculo cylindrico, fistuloso.

2. Fungus e volva erumpens, totus albus, pileolo fornicato, ad oras striato, pediculo cylindrico. — In campestribus. Autumno inter triticum.

## Bicolores, albi, &amp; aurei.

Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo desuper ex aureo-pallido, & a medio, ad oras striato, lamellis, & pediculo albis. — In Ericetis &c.

## Albi &amp; Grisei.

1. Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo fornicato, ad oras nonnihil striato, griseo-rufescente, inferne albo, pediculo cylindrico conicolore, & in superficie pulchre lacerato. — In digitis, necnon in Castaneis. Estate.

2. Fungus e volva erumpens, pileolo superne griseo, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, conicolore, angustissime fistuloso. — Mayo & Octobri.

## Albi &amp; Rufi.

1. Fungus parvus, e volva erumpens, pileolo raso, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, pariter albo, ac parum fistuloso. — Tab. 76. f. 2.

## Albi &amp; Fulvi.

#. 184 Fungus e volva erumpens, pileolo fulvo, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, pariter albo. — In agrorum sulcos inter triticum.

2. Fungus e volva erumpens, pileolo fulvo, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, superne pileoli parte veluti conicolore, & maculis saturationibus notato. — In silvosis locis.



p. 184.

*Albi & obscuri.*

*Fungus* e *volva* erumpens, pileolo desuper obscuro, & ad oras striato, inferne albo, pediculo concolore, cylindrico, valde fistuloso. — Octobri.

*Tricolores albi, grisei, & rufi.*

*Fungus* e *volva* erumpens, pileolo fornicato, desuper griseo, & ad oras tenuissime striato, inferne subrufo, pediculo cylindrico, crasso, albo, fistuloso, ac polline concolore resperso. — Autumno.

*Grisei, albi, & medii coloris.*

*Fungus* e *volva* erumpens, superne griseus, inferne albus, pediculo cylindrico, albiori, fistuloso, externe laevo, & medii quasi coloris.

*Obscuri, grisei, & medii coloris.*

*Fungus* esculentus, e *volva* erumpens, pileolo desuper ex obscuro-griseo, & ad oras striato, inferne griseo albo, pediculo fistuloso, medii quasi coloris. In pratulis.

IV. Pediculo anulato.

V. Pileolo ad oras non striato.

*Unicolores albi.*

*Fungus* esculentus magnus, e *volva* erumpens, totus albus, graviter odoratus, lamellis crebris, & creberrime denticularis, pediculo obeso anulato.

? *Fungus* e *volva* erumpens, totus albus, pediculo cylindrico, parvo, & anulato. — *Bubbola bianca*, o *Uovolo bastardo*. — In Sylvis autumnis.

p. 185.

*Purpureo-carnei.*

*Fungus* e *volva* erumpens, totus purpureo-carneus, pediculo cylindrico, anulato. — *Bubolina di Color Colombino*, o di principe. — In Sylvis Abnegis.

*Bicolores albi & ochroleuci.*

*Fungus* e *volva* erumpens, pileolo desuper ochroleuco, sive albo-pallido, inferne lamellis, & cylindrico, anulato, ac fistuloso pediculo albis.

? *Fungus* esculentus, e *volva* erumpens, parvo, pileo desuper pallidiori coloris, inferne lamellis albis, pediculo albiori, fistuloso, cylindrico, & anulato, pariter albo.



## Albi &amp; Grisei.

Fungus parvus, & Volva erumpens, pileolo desuper dilute griseo, inferne Tab. 76. cum fistuloso, ac anulato pediculo albo. — In pratens. &c. f. 3.

## Albi, &amp; Subpurpurei.

Fungus esculentus, & Volva erumpens, albus, pediculo palmaris, cylindrico, & anulato, pediculo maculis subpurpureis notato. — Cocolla bianca buona &c. Autumno in agrorum sulcis inter triticum.

## Fulvi, &amp; rufescentes.

Fungus & Volva erumpens, pileolo corticiformi forma, obtuse fastigiato, utraque parte fulvo, pediculo cylindrico, anulato, pro albo, & ex albo-rufescente. — In Ericetis, & Sametis &c. Autumnus.

## Tricolores Sulphureo-grisei, albi, &amp; pallidi.

Fungus esculentus, & Volva erumpens, pileolo desuper ex sulphureo-griseo, quandoque proterus griseo, inferne albo, pediculo nunc concolore, nunc pallido, cylindrico, altiori, anulato, & fistuloso.

## V. Pileolo ad oras striato.

## Unicolores albi.

Ag. Cocolla  
Scop.

Fungus esculentus, & Volva erumpens, totus candidus, pileolo ad oras striato, pediculo cylindrico, anulo ampliore cineto. — In agris juxta seminas.

2. Fungus & Volva erumpens, totus candidus, pileolo ad oras breviter striato, pediculo cylindrico, anulo perangusto cineto. — Uovolo Salvatico &c.

p. 186.

3. Fungus esculentus, & Volva erumpens, totus albus, pileolo ad oras striato, pediculo cylindrico, ampliore, anulato. — Uovolo buono, bianco. raris.

## Bicolores aurei, &amp; pallidi.

Tab. 77. f. 1. Fungus planus, orbicularis, aureus (pileo convexo) — Vere & autumnus.

## Albi &amp; Rubri.

Fungus pileolo desuper sature rubra, & ad laudem colorem aecedente, ad oras striato, inferne albo, pediculo palmaris, cylindrico, & anulato. — Uovolo malefico rosso. — In Abiegnis & fagineis sylvis estate, & autumnus.

III. Volva, seu involuero parvo, & minus epparente erumpentes, quod insuperna pileoli parte in fragmenta solida dissectum, ac distributum diu remanet.

IV. Pediculo non anulato.

V. Pileolo desuper non striato.



## Unicolores albi.

*Fungus* totus candidus, parvus, parvus, e Volva erumpens, pediculo non anulato, Tab. 80.  
ac radicem versus sensim, & leviter crassescente. Autumnus. — *Tignosa bianca senza* fig. 4.  
anello.

## Bicolores albi, &amp; cinerei, eunt plumbei.

*Fungus* perniciosus, e Volva erumpens, viscidus, Superne subcinereus, Subtus lamel-  
lis albis, pediculo non anulato, pariter albo, radicem versus sensim & leviter  
crassescente.

## Albi, &amp; Subobscuri.

*Fungus* e Volva erumpens, pileolo superna parte subobscurus, inferne albo, pediculo  
non anulato, pyramidato, pariter albo, radice bulbosa. — In nemoribus.

## Albi &amp; Sordide purpurei.

*Fungus* e Volva erumpens, pileolo sordide purpureo, & ad fusco-ferrugineum colo-  
rem tendente, inferne lamellis albis, pediculo pyramidato, non anulato, superna  
pileoli parti concolore, radice bulbosa. — *Tignosa cattiva, vopa, e bianca senza* anello.

p. 187. IV. Omnia ut in divisione antecedente, sed pediculo anulato.

## Unicolores albi.

*Fungus* magnus, totus albus, esculentus, e Volva erumpens, pediculo pro alto anulato,  
radice bulbosa. — *Tignosa bianca maggiore de' campi, di radice grossa.* — In agris.

2. *Fungus* magnus, e Volva erumpens, candidus, esculentus, inodorus, in arenosis  
nascens, pediculo pro alto, cylindrico, & anulato, radice rostrata. — Junio.

3. *Fungus* esculentus, totus albus, bulbosus, e Volva erumpens, pediculo anulato.

4. *Fungus* esculentus, e Volva erumpens, parvus, totus candidus, pediculo anu-  
lato, cujus cutis in reflexas, obtusas, & quasi in se convolutas squamas dissecta, ac  
pulchre distributa solvitur. — In prati, &c. primovere.

## Bicolores albi, &amp; grisei, aut cervini.

*Fungus* e Volva erumpens, pileolo desuper griseo, ac limacino glutine infecto, pe-  
diculo cylindrico, crassiore, albo, & anulato, radice bulbosa. — Autumnus.

2. *Fungus* e Volva erumpens, pileolo desuper griseo, inferne albo, pediculo pariter Tab. 78.  
albo, anulato, in eam partem versus sensim crassescente, radice bulbosa. — f. 1.

3. *Fungus* esculentus, e Volva erumpens, pileolo desuper griseo, inferne albo,  
pediculo cylindrico concolore, anulo strictioni cineto, radice bulbosa.



p. 187.

4. *Fungus esculentus, magnus, e Volva erumpens, pileolo desuper cervini dilutissimi coloris, lamellis albis, pediculo pariter albo, ample anulato, cujus cutis in oblongas, obtusas, ac deorsum pulchre convolutas squamas dissecta, ac distributa solvitur, radice acuta, & veluti rostrata. — Maio in agris & seorsum ambulacris.*

### Albi & spadicei.

*Fungus e Volva erumpens, pileolo desuper spadiceo, inferna parte & cylindrico, ac anulato pediculo albis. — Autumno induritur.*

### Albi & rubri, aut fuscipurei.

*Fungus magnus, e Volva erumpens, pileolo desuper rubro-aureo, inferne albo, pediculo anulato, conicolore, radice bulbosa. — Ovolo salutaris inalefio vopo, o. Liguosa maggiore vossa, e bianca. — In nemoribus.*

p. 188. 2. *Fungus bulbosus, magnus, e Volva erumpens, pileolo desuper rubro, inferne albo, pediculo anulato, palmari, externe conicolore, interna parte rubro, cujus cortex circa radicem in plures partes, tanquam vi elastica plerumque disrumpitur.*

4. *Fungus esculentus Alpinus, e Volva erumpens, pileolo superna parte rubro, inferna & anulato pediculo albis, radice bulbosa.*

3. *Fungus esculentus Alpinus, e Volva erumpens, desuper subrubens, subus lamellis & longo pediculo albis, radice bulbosa. — In sylvis abiegnis. Autumnus.*

Ag. Scandinicus Scop. *Fungus e Volva erumpens, pileolo desuper vinoso lundo colore tincto, inferne albo, pediculo anulato, superna pileoli parti conicolore. — Octobri.*

### Albi & ex obscuro-purpurascetes.

*Fungus e Volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro-purpurascete, dilute tincto, inferne albo, pediculo crassiore, ample anulato, pariter albo, radice bulbosa.*

Agaricus Rubens Scop. *Fungus esculentus, e Volva erumpens, pileolo ex obscuro-purpurascete, inferne albo, pediculo crasse albo, rubeo subpurpureo, anulato, radice bulbosa. M.*

### Albi & obscuri.

*Fungus e Volva erumpens, pileolo desuper obscuro, inferne albo, pediculo longo, anulato, conicolore, radice bulbosa. — Octobri.*

2. *Fungus esculentus, e Volva erumpens, pileolo desuper obscuro, inferna parte, & vix anulato pediculo albis.*

V. *Pileolo desuper, veta media ad peripheriam, vel per ipsam peripheriam tantum striato.*

### Bicolores albi & aurei.

Agar. Muscarius L. *Fungus bulbosus, e Volva erumpens, pileolo superna parte aureo, & ad oras striato, Tab. 78. inferna, & anulato pediculo albis, radice bulbosa. f. 2.*



## Albi &amp; Grisei.

Fungus esculentus, parvus, pileolo superna parte griseo, & ad oras striato, inferne albo, pediculo longo, cylindraceo, pariter albo, anulo perangusto cineto, radice bulbosa. — Verius.

## Albi &amp; Spadicei.

Ag. Scramineus  
Scop.

Fungus bulbosus, esculentus, & volva erumpens, pileolo desuper spadiceo, & ad oras striato, inferne albo, pediculo anulato, concolore, inam partem versus crassescente, radice bulbosa. — Tignosa bionda. — Autumno.

## Albi &amp; obscuri.

Fungus bulbosus, esculentus, & volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro-griseo, & ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico anulo perangusto cineto. — Autumno post diuturnas pluvias.

2. Fungus & volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro griseo ad oras striato, inferne albo, pediculo concolore, anulato, inam partem versus crassescente, radice bulbosa. — In silvis ceduis, & in Ericetis.

III. Volva, seu involucri parvo, & minus apparente, erumpentes, quod in minutos velati floccos per supernam pileoli partem, & etiam per pediculum tanquam in anulum resolvitur, & brevi tempore evanescit.

IV. Pediculo non anulato.

V. Pileolo desuper non striato.

## Bicolores Fulvo-ferruginei, &amp; grisei.

Fungus pileolo hemisphaerico, fulvo-ferrugineo, lamellis, & fistuloso, ac tenuiore T. 81.  
pediculo griseis — Mayo. f. 3.

III. Volva ut in divisione antecedenti, sed in superna pileoli superficie partim in floccosis micis, partim in stellata portiancula dumtaxat, remanente.

V. Pileolo a vertice, ad oras striato.

## Albi &amp; Plumbei.

Fungus, qui vix e volva egressus in atramentum resolvitur, pileolo campanulato, T. 80.  
vertice laevi, plumbeo, reliqua parte striato, pediculo cylindrico albo, fistuloso, f. 6.  
radice rostrata. — In hortis autumno. — Michel. vidit sup. gallin. finum.

## Quadricolores, Plumbei, rufi, albi, &amp; pulli.

Fungus, qui vix e volva egressus in atramentum resolvitur, pileolo campanulato, vertice laevi, & griseo-rufi, reliqua parte tenuissime striato, & plumbeo, lamellis densissimis, pullis, pediculo albo, fistuloso, inferiora versus sensim, & leviter crassescente, radice in longissimum mucronem producta. — Loco & temp. cum antedicto. — Fungo lesina, di. pollina. T. 80. f. 2.



p. 190.

- I. Fungi caespitosi, seu fasciculosi, nempe ab una tantum radice, plures exeuntes.  
 II. Ramosi. — III. Pediculo non annulato. IV. Pileolo superne non striato.

### Bicolores albi, & grisei.

Fungus ramosus, maximus, pileolo desuper griseo, inferne lamellis, & lanu-  
 -ginoso pediculo albis. — Autumnus. in sylvis. Tab. 79.  
 fig. 1.

II. Non ramosi.

### Unicolores albi.

Fungus esculentus, odoratus, infundibuliformis, multiplex, superne albus,  
 inferne prorsus albus, pediculo brevi, lanuginoso. — ad Populos nigras autum.

2. Fungus ex una radice multiplex, totus albus, infundibuliformis, pedi-  
 -culo tumido. — in nemora — autumno.

3. Fungus esculentus, infundibuliformis, albus, ex una radice multiplex  
 pileolo in plures partes se dividente, tenuioris substantiae, & in superficie  
 laevi, radice modo brevi, modo longissima. — Ad rad. populi & Sambuci.

4. Fungus alpinus, parvus, candidus, viscidus, ex uno pede multiplex  
 pediculo cylindrico. — In montibus inter Castaneas.

5. Fungus parvus, totus albus, ex uno pede multiplex, pediculo tumido.

6. Fungus minimus, fasciculosus, candidus, pediculo cylindrico. — In hor-  
 -tis ad puros, aliasque arbores. autumno.

### Grisei.

Fungus ex uno pede multiplex, bulbosus, griseus, pileolo sursum refle-  
 -cto, & acetabuli modo cavo, lamellis dilute concoloribus. — ad Fagorum radic.

### Rufi.

Fungus esculentus, ex una radice multiplex, sat ure rufescens, lamellis  
 primum albis, postea concoloribus, pediculo duro, plerumque crispo &  
 complanato, ac radicum versus in acutum sensim attenuato. — In sylvis.  
 Vere & autumno.

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, totus rufescens, pileolo  
 fornicato, tenuis substantiae, lamellis perangustis, pediculo cylindrico.  
 In nemoribus loco, & tempore praedicto.

p. 191. 3. Fungus parvus, rufus, ex una radice multiplex, pileolo complana-  
 -to, & ad oras plerumque undulato, & sursum reflexo, pediculo brevi,  
 fistuloso, subhirsuto. — Majo in hortis.



## Fulvi.

1. Fungus ex uno pede multiplex, fulvo-spadiceus, pileolo crasso, utrinque turbinato, ac desuper veluti subhiato, pediculo & lamellis primum quasi concoloribus, postea obscuris. — Octobri.

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, fulvus, pileolo fornicato, pediculo tenui, cylindrico. — Ad dejectas Nices.

## Spadicei.

Fungus cespitosus, elegans, pileolo fornicato, spadiceo, in superficie veluti in proexiguas squamas pulchre lacinato, lamellis albis, pediculo cylindrico, superne pileoli parti concolore. — Astivo tempore in sylvis.

## Aurei, Lutei, aut Pallidi.

Fungus ex uno pede multiplex, ruficaprini, seu lutei-pallescentis coloris, pediculo semiorbiculato, viscido, pediculo cylindrico. — Familiola buona de.

2. Fungus ex uno pede multiplex, totus luteus, pediculo radicem versus sensim & nonnihil attenuato. — In nemoribus, sed rarus.

3. Fungus perniciosus, intense aureus, ex uno pede multiplex, ad oleam nascent, pediculo radicem versus sensim & leviter attenuato. —

Fungo olivo dorato, malefico. — ff. Sylvas ad sepes & in agris. V. & A.

## Albi &amp; lutei.

Fungus esculentus, odoratus, ab una radice multiplex, totus albus, centro duntaxat pileoli luteo. — Autumno ad Populorum emortuorum pedamenta.

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo cucullato, citrini coloris, ac limacino glutine infecto, lamellis & cylindricis, ac fistuloso pediculo albis. — Familiola di Lumaichini limonati, bianchi. — Octobri Circa Palearia.

## Albi &amp; grisei.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo extensorii forma, griseo, lamellis albis, pediculo proalto, cylindrico, pariter albo. — Pisciacane speguitojo. Super frum. Equinum.

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, griseo, lamellis albis, pediculo & nonnihil rugoso, subtus concolore, pediculo albo, ~~proalto~~ cylindrico, fistuloso. — Super frum. Equinum.

3. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo fornicato, tenui substantia, ac desuper albo, inferne griseo, pediculo cylindrico, fistuloso, superne pileoli parti concolore. — In nemoribus.



## Albi & Purpurei.

Fungus ex uno pede multiplex, totus albus, purpureis, ac radiatis maculis, veluti acupunctis notato, pileolo parvo, extensorii forma, pediculo longo, radicem versus sensim crassescente. — Famiglia di Spegnitoj buona, brizzolata.

## Albi & Obscuri, fusci, vel nigri.

Fungus cespitosus, esculentus, parvus, pileolo pulvinato, superne obscuro, inferne cum cylindrico pediculo albo. — Olenarino buono. — Ad ulm. radices.

2. Fungus parvus, obesus, ex uno pede multiplex, superne fusco-nigricans, inferne cumbrexi, ac ventricoso pediculo albus. — Carbonajo ab atro colore, tamquam carbonum. — Autumno in arvis Carbonariis crescit.

3. Fungus ex uno pede multiplex, tenerimus, pileolo in longum & acutum conum attenuato, fusco, lamellis concoloribus, pediculo altiori, cylindrico, albo, punctis sulphureis notato. — Famiglia di Piscicani cattivi detti alorimenti Guglie. — In Stescore canino.

4. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo pulvinato, obscuro, lamellis albis, pediculo brevissimo, laterali pileoli parti ferme affixo, & pariter albo. — In agris & aggerosis. — Majo.

## Leucophaei & Spadiceo-rufi.

Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper spadiceo-rufo, in medio nonnihil umbilicato, & villosa, inferne lamellis multifidis, Leucophaei, pediculo nonnihil tumido, & superne pileoli parti conicolore.

## Grisei & Obscuri, vel Fusci, aut Pulli.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex & griseo subfuscus, pileolo hemisphaerico, pediculo cylindrico, spirae modo intorto, ac punctis nigris notato. — Per herbosa ambulacra.

2. Fungus ex uno pede multiplex, obscurus, & ad purpureo-ferrugineum tendens, pileolo pulvinato, subus lamellis griseis, pediculo cylindrico, angustissime perforato, & superne pileoli parti conicolore. — Octobri in fimi Equini tumulis.

## Cinerei & Rufi.

Fungus ex uno pede multiplex, Alpinus, esculentus, pileolo desuper cinereo-griseo, inferne lamellis copiosissimis, eleganter rufis, pediculo dilute conicolore. — Orcella East. Dur. 191.



#. 193.

*Rufi, & ex rufo-ferruginei.*

*Fungus parvus, pileolo amplo, superne eleganter rufo, inferne primum albo, deinde conicolore, pediculo ex rufo ferrugineo, inferiora versus sensim attenuato. — Ad Sapes. Mayo.*

*Fulvi & Ferruginei.*

*Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, fulvo, lamellis ferrugineis, pediculo cylindrico, ferre fistuloso, & superna pileoli parti conicolore. — In agris stercoreatis. Mayo.*

*Obscuro-fusci, & nigricantes.*

*Fungus caespitosus, parvus, gracillimus, pileolo campanulato, ex obscuro-fusco, lamellis nigricantibus, pediculo praetenui, vix lineam crasso, & superna pileoli parti conicolore. — In feni Equini Aggestis. V. Oct.*

*Lutei & carnei.*

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo conico, infra, & supra roseo, t. 78. vel carnei, pediculo cylindrico, fistuloso, luteo. — In resectis tabescentibus f. 3. Coniis oritur. Veris tempore.*

*Lutei, crocei, aurei, & prasini.*

*Fungus ex uno pede multiplex, pileoli vertice croceo, vel aureo, reliqua parte dilute conicolore, inferne lamellis prasinis, pediculo cylindrico, fistuloso, luteo. — In sylvis. Vere & autumno. ad Sapes &c.*

*Lutei & subnigri.*

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo extensorii forma, per vetustatem in plures partes, tamquam elastica vi se dividente, & subnigro, inferne luteo, pediculo fistuloso, cylindrico, superna pileoli parti conicolore. In pratis ad umbras, & in hortorum, & ambularis. — Octobri.*

*Aurei & lutei.*

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo aureo, & duorum reflexo, lamellis, & cylindrico pediculis luteis. — Ad quercus. Autumno.*

*Aurei, & ex albo-rufescentes.*

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo inequali, clipeato, desuper ex aureo-rufescente, in medio vero saturationis coloris, inferne lamellis rufis, pediculo cylindrico, fistuloso, conicolore, sericea, ac per brevi lanugine infecto.*



pag. 194.

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo utraque parte eleganter rufo, lamellis sinuatis, pediculo exaureo-ferrugineo, cylindrico, & fistuloso.

Aurei, aut lutei & fulvi.

Fungus luteus, ex uno pede multiplex, pileolo usque ad centrum in plures partes plerumque se dividente, ac desuper per maculis fulvis ob lacerationem cutis veluti asperso. — Octobri ad Quercus.

2. Fungus minimus, ex uno pede multiplex, pileolo conico, aureo, lamellis, & pediculo fulvis. In Equ. sim. globulis.

Tricolores, albi, spadicei, & ex obscuro-fusci.

Fungus esulentus, odoratus, ex uno pede multiplex, superna pileoli parte spadicea, inferna alba, pediculo longo, & ex obscuro-fusco.

Albi, griseo-rufo, & ex livido - Subpurpurei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, desuper & griseo-rufo, inferne lamellis albis ex livido - purpureis, pediculo fistuloso, albo. — Vere ad Populos in arenosis plerumque provenit.

Albi, grisei, & obscuri.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo obscuro, conico, cum oris subtus repandis, lamellis griseis, pediculo albo, radicem versus attenuato. Autumno.

2. Fungus cespitosus, duriusculus, esulentus, parvus, pileolo superna parte obscuro, inferne griseo, pediculo albo. — F. Soderino. — Pazzajolo.

Albi, rufo-grisei, & aurei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper ex rufo-griseo, subtus lamellis albis, pediculo cylindrico, aureo, fistuloso. Autumno.

Albi, obscuri-fusci, & nigri.

Fungus Cespitosus, pileolo ampliori, extinetorii forma, ex obscuro fusco, lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. — In Sylvis ad Quercus. A.

Rufi, obscuri, & purpurei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo extinetorii forma, rufo, maculis obscuris in vertice notato, lamellis, & pediculo purpureis. — In Dumetis ad Arbores - Autumno.



IV. Omnia aut supra, sed pileolo a vertice usque ad oras striato.

### Unicolores grisei, aut cinerei.

Fungus parvus, totus griseus, ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, ubi oris striato, pediculo tenui, fistuloso. 7.79. f.5.

2. Fungus parvus, cinereus, ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, ubi oris striato, pediculo tenui, fistuloso longo, capillaceo, fistuloso. — Autumno ad arbores, & super ligni putridi fragmenta.

### Obscuri, vel subfusci.

Agar. sulphureus  
Scopoli

Fungus parvus, cespitosus, obscurus, pileolo galericulato, ubi oris striato, pediculo crassiore. — Tempore & locis consimilibus, ut superior.

Idem.

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus, pileolo galericulato, ubi oris striato, pediculo tenui, fistuloso. — Majo ad detruentata, & semiputridas arbores.

### Albi & cinerei.

Ag. rotula

Fungus fimetarius, parvus, cespitosus, fugax, pileolo fornicato, utraque parte cinereo, desuper striato, ac in medio pileolo umbilicato, subtus lamellis naris, ad tubum quemdam cespitosus, ei denique junctis, cui inseritur pediculus albus, & fistulosus. — Super Vaccinium, & Oxonium finium. rago. 7.79. f.7.

### Albi & nigri.

Fungus cespitosus, parvus, pileolo fornicato, utraque parte albo, desuper striato, ac in medio pileolo umbilicato, subtus lamellis naris, tubo cuidam firmis, cui inseritur pediculus capillaceus, nigricans. — Autumno ad illinos &c. 7.74. f.8.

### Tricolores, albi, Murini, & obscuri.

Fungus loboliferus, fugax, pileolo galericulato, obscurus, vertice levi, reliqua parte subtilissime striato, lamellis murinis, pediculo albo, fistuloso. — Primovere in pseudum fimo.

Ag. lignorum  
Scopoli

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo griseo, & ubi oris striato, inferne nigricante, pediculo albo, fistuloso. — Ad arborum radices v. & aut.

### Albi, rufi, & nigricantes.

Ag. truncorum  
Scop.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, rufo-fulvo, vertice levi, reliqua parte striato, subtus lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. Ad arbor. & lign. Emort. pedes, tum in sylvis, tum in agris, & hortis passim. Autumno



2. Fungus sterquilinus, fugax, ex uno pede multiplex, pileolo fastigiato, rufescente, striato, lamellis primis obscuris, postea nigricantibus, pediculo altiori, albo, fistuloso. — Mayo in hort. sup. ovium finium.

3. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pediculo foenicato, rufo, centro umbilicato, & laevi, reliqua parte striata, subtus lamellis albicantibus, pediculo fistuloso, nigricante. — In fimo Equini aggestis cum reliquis congeneribus crescit.

IV. Pileolo a vertice ad medium laevi, reliqua parte, vel undique, vel juxta peripheriam striato.

### Unicolores Grisei.

Fungus alpinus, Cespitosus, pileolo conico, griseo, a medio ad peripheriam striato, lamellis torosis, remissi coloris, pediculo fistuloso, pariter griseo. — Ad putrida Ligra. Autumno.

### Bicolores albi, & lutei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo utraque parte albo, ac de super circum oras striato, pediculo luteo, fistuloso.

### Dilute purpurei.

Fungus Cespitosus, dilute purpureus, pileolo galericulato, a medio ad verticem crispo, reliqua parte striato, pediculo tenuiori, & altiori, fistuloso.

### Albi & grisei.

Fungus fasciculosus, pileolo ampliori, cucullato, a medio ad verticem laevi, & griseo, reliqua parte striato, & albicante, lamellis, & altiore ac fistuloso pediculo albis. — In disruptis Salicis fragilis caudicibus. Autumno.

### Grisei & obscuri.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, obscuro, livido, ad oras striato, lamellis & pediculo griseis. T. 78. f. 9.

### Albi, Griseo-fusci, & livido-purpurascetes.

Fungus Cespitosus, pileolo extinetorii forma, & griseo-fusco, & a medio ad peripheriam striato, inferne lamellis ex livido-purpurascetibus, pediculo albo, fistuloso. — Ad vitium Pedamenta. Autumno.

### Albi, lutei, & obscuri.

p. 197. Ag. galericulatus Scop. Fungus fasciculosus, pileolo obscuro, extinetorii forma, a medio ad peripheriam striato, lamellis albis, pediculo altiori, luteo, fistuloso. — In fimo Equino. &c.



III. *Pediculo anulo non permanenti cincto*. IV. *Pileolo desuper non striato*.

### Unicolores Ruffi.

*Fungus atro-rufescens, ex uno pede multiplex, esculentus, pileolo parvo, pediculo crassiore, cylindrico, anulo perangusto cincto.*

2. *Fungus parvus, ex uno pede multiplex, ex rufo-aureus, postea ad fulvum colorem tendens, pediculo anulato, fistuloso, radice bulbosa.* Tab. 80. f. 6.

### Lutei, vel Aurei.

*Fungus esculentus, totus luteus, ex uno pede multiplex, pediculo longo, cylindrico, anulato. — Fungiglicia buona, gialla. — Ad quercus &c. Autumno.*

2. *Fungus esculentus, luteus, nanus, ex uno pede multiplex, pediculo tumido, anulo perangusto cincto. Autumno.*

3. *Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, aureus, pediculo longo, cylindrico, anulo perangusto cincto, radice bulbosa.*

### Albi & Grisei.

*Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper griseo, & veluti in squamas lacerato, lamellis albis, pediculo cylindrico, concolore, anulo perangusto cincto.*

### Albi & Fulvi.

*Fungus minimus, ex uno pede multiplex, pileolo, & pediculo fulvis, lamellis albis.*

### Tricolores albi, Mellini, & Subobscuri.

*Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo fornicato, desuper mellino, subtus albo, pediculo cylindrico, anulato plerumque subobscuro. — In Sylvis ad Arbor. radices. Autumno.*

p. 198.

### Albi, Flavo-subobscuri, & Anei coloris.

*Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper e flavo-subobscuro, inferne albo, pediculo longo, cylindrico, anulato, & aeneo colore tincto.*

### Albi, grisei, & Purpurei.

*Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, griseus, inferne sordide, & dilute purpureus, pediculo albo, cylindrico, & anulato. — Famiglia di Portajoli.*



*Albi, rufi, & Fulvi.*

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo desuper rufo, & protuberante centro, inferne fulvo, pediculo albo, annulato, & circa medium tumido, ad radicem vero in rostrum veluti incurvato, atque attenuato.

*Albi, rufo-fulvi, & obscuri.*

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo desuper ex rufo-fulvo, subrus albo, pediculo alboni, cylindrico, annulato, subobscuro. — Ad Arborum radices. Familia buona, bianca, & Leonata.

*Quadricolores albi, cervini, Fulvi, & obscuri.*

Fungus esculentus, populeus, ex uno pede multiplex, pileolo corrugato, vel potius Lichenis Pulmonariae arboreae instar lacunulis excavato, colore primum obscuro, postea fulvo, & tandem in subalbida faciente, inferne lamellis lineam latis, cervini coloris, pediculo albo, annulo annulato. — Ad populos & Arbores campestres V. & A. cit. — Poppini. — alberini.

2. Fungus esculentus, populeus, ex uno pede multiplex, pileolo corrugato, vel potius Lichenis Pulmonariae arboreae instar lacunulis excavato, colore primum obscuro, postea fulvo, & tandem in subalbida faciente inferne lamellis cervinis, semiuinciam latis, pediculo albo, annulo per-arigato cincto. — Cum Super. crescit.

*IV. Pileolo a vertice ad oras striato.*

Fungus lespitosus, parvus, pileolo galeculato, & striato vertice fusco, Tab. 81. reliqua parte spadiceo, subrus lamellis albis, pediculo brevi, cylindrico, & ad radicem versus annulato. — In aggerosis locis, nec non in fimo Equino. V. 2.

*p. 199. IV. Pileolo ad oras tantum striato.**Albi, Spadicei, & Purpurei.*

Agaricus  
purpureus Scop.

Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper ex spadiceo — Tab. 81. glabrescente, ad oras nonnihil undulato, subrus albo, pediculo subobscuro, f. 2. inferiora versus crassescente, & veluti bulboso. — In Sepibus.

III. Pediculo annulo fugaci, seu non permanenti cincto. IV. Pediculo desuper non striato.

*Unicolores aurei, lutei, vel Pallidi.*

Fungus obesus, aureus, ex una radice multiplex, pileolo fornicato, centro umbilicato. — ad arb. radices.

2. Fungus ex una radice multiplex, totus aureus, pileolo nonnihil fastigiato, pediculo cylindrico, in superficie lacero, & veluti filamentoso. — Ad Arbores.



*A. Olivaceus* <sup>p. 199.</sup> 2. *Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo in medio saturate croceo, ad Tab. 80. latera vero dilute, subtus lamellis sulphureis, pediculo cylindrico, fistuloso, concolore. Autumno.*  
*Gmelin. p. 1417.*

### Bicolores albi, & obscuri.

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo fornicato, subobscuro, subtus lamellis albis, pediculo longo, superna pileoli parti concolore, & inferiora versus crescente. Semenzini. Edul.*

### Albi & rufi.

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo conico, rufescente, inferne concolore, sed ad griseum tendente, pediculo albo, cylindrico, fistuloso. — P. Prata.*

### Tricolores albi, grisei, & rufi.

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, rugoso, rufescente, & subhirsuto, inferne lamellis griseis, pediculo albo, fistuloso, radicem versus non-nihil crescente.*

3. *Fungus ex uno pede multiplex, pileolo subrufo, lamellis griseis, pediculo cylindrico, albo. —*

2. *Fungus ex uno pede multiplex, pileolo pulvinato, desuper rufescente, inferne griseo, pediculo albo, cylindrico, fistuloso. — In Sylvis.*

(pag. 200.)

### Albi, Pallidi, & rufescentes.

*Fungus ex uno pede multiplex, pileolo desuper pallido, subtus lamellis albis, pediculo cylindrico, atro-rufescente, ac pulvisculo superna pileoli parti concolore asperso. Octobri.*

### Albi, Flavescentes & fusi.

*Fungus Alpinus, bulbosus, ex uno pede multiplex, pileolo superna parte obscuro, & stuposo, inferne albo, pediculo flavescente. Octobri.*

### Albi, Glauco-Argentei, & nigri.

*Fungus in arenosis nasens, ex uno pede multiplex, pileolo cucullato, & glauco argenteo, splendente, inferne lamellis amplioribus, nigris, pediculo fistuloso, candido, radice rostrata. — Fungus multiplex, ovatus, cinereus. Bot. Paris. 73. n. 16. Tab. XII. f. 10 & 11. — Autumno in Populetis.*



# Fungoidaster.

Fungoidastri semine in superna parte donati.

Fungoidaster parvus, ex squadicea rufescens, capitulo villosa, sphaerico, Tab. 82.  
pede fornicato, fungis semiputridis innascens, semine stellato. fig. 1.  
Super fungis piperatis, albis, lacteo saucio turgentibus.

p. 201. 2. Fungoidaster parvus, gelatinosus, lubricus, pileolo subviridi, oris Tab. 82.  
subtus repandis, pediculo aureo, fistuloso. — Fungus gelatinus, flavus. f. 2.  
Bot. Paris. 58. Tab. XIII. n. 7. 8. & 9. — Funghevello di gelatina di color  
verde gajo, e dorato. — Autunno fr. sprata, & herbosa ambulacra.

3. Fungoidaster minimus discoides, albus, semine ovato donatus, foli- T. 82.  
is, vel lignis semiputridis innascens. f. 3.

4. Fungoidaster minimus, incarnati coloris, acaulis ferme, Ana- T. 82.  
gijridis non foetida, & semimortua innascens. — Funghevello incarnati di f. 4.  
legni mortui.

Fungoidastri semine in inferna parte donati.

Peziza cornuop. Fungoidaster caespitosus, superne fuscus, inferne cinereus. — In sylvis. T. 82.  
Pez. Cornuopoid. 5. Fungoidaster, qui fungoides nigricans, majus, cornuopid forma. Bot. f. 5.  
Par. 57. Tab. XIII. f. 2. 3.

7. Fungoidaster qui fungoides tubae acustiae forma, fuscus, externe T. 82.  
cinereus. D. Breijni. f. 6.

8. Fungoidaster Alpinus, infundibuli forma, cinereus. — Trombetta Tab. 82.  
di morto cenerina Alpina. f. 7.

9. Fungoidaster infundibuli forma, ex obscuro fulvus. — Trombetta  
di morto di color leonato. — Autunno.

10. Fungoidaster minimus, infundibuli forma, pullus.

Tab. 82.  
f. 8.

## Phallus.

Phalli pileolo cellulato, ac umbilicato pervio summa parte instructo,  
Donati.

Ph. Impudicus: Phallus vulgaris, totus albus, volva rotunda, pileolo cellulato, ac sum- T. 83.  
ma parte umbilico pervio, ornato.

p. 202. 2. Phallus albus, volva ovata, externe purpurascens, pileolo cellulato, ac  
summa parte umbilico pervio, ornato. — Lumacone bianco di guscio, e invoglia  
rossa, e ovata.



p. 202.

3. Phallus albus, parvus, pileolo cellutato, ac summa parte umbilico pervio, & peramplo ornato. — Autumno in Sylvis.

Phalli pileolo cellutato, umbilico pervio destituto, ornato.

Phallus Alpinus, volva subrotunda, alba, pileolo cellutato, umbilico pervio carente, pediculo dilate fulvescente. — D. Gron. Abb. Tozzi.

1. Phallus, qui fungus Phalloides Virginianus, glande tessellato. D. Banist. Raii Hist. Tom. 3. 25.

2. Phallus qui fungus Phalloides, parvus, seu penis caninus, Virginianus. D. Banist. Ejusd. ibid.

3. Phallus, qui fungus Phalloides Gallicus, pileo rugoso (absque umbilico) Ejusd. ibid. & Sterb. Theatr. fung. p. 280. n. 141. Tab. 30. H. F. Fung. qui Phalloidis genus J. B. 3. 845. XXIII. genus perniciosorum fungorum. Species Clusii. Hist. CCLXXXI.

4. Phallus Hadriani junii (capitulo non cellutato, sed umbilico pervio donato) Clus. Hist. CCXCV. Lob. icon. part. 2. 278. — Fungus — marinus. Dod. pempt. 483.

5. Phallus, qui fungus Phalloides Major, Germanicus, pileolo cor-rugato. Sterb. fung. 281. n. 114. 3. Tab. 30. K. L. M.

Phallus, aut potius Ichthyphallus, apud Graecos Phallōs, membrum virile sonat & ὀφθαλμὸς membrum virile erectum, nudata glande nam hac planta hominibus pudenda representat.

## Phallo-Boletus.

1. Phallo-boletus esculentus, pileolo conico, ampliore, subobsuro, pediculo Leucophaeo, fistuloso. — Verno tempore nascitur in arenosis locis &c. Tab. 84. f. 1.

2. Phallo-boletus esculentus, pileolo ampliore, rufescente, & crispo, pediculo Leucophaeo, fistuloso, foris reticulatis insignito — ad Rudera. Tab. 84. f. 2.

3. Phallo-boletus esculentus, pileolo parvo, conico, ex fulvo-subobsuro, pediculo Leucophaeo, fistuloso. — Primovere. Tab. 83. f. 3.



## Boletus.

Boletus Boletus dicitur a voce Graeca Βολη, id est gleba, ob figuram inaequalem, & superficiem perforatam, ut in glebis observatur.

- phallus  
Esculentus
1. Boletus esculentus, rugosus, ~~angustior~~, & orbicularis.  
Primovire in arenosis agris &c. Tab. 85.  
f. 1.
  2. Boletus esculentus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus -  
Primovire. Tab. 85.  
f. 2.
  3. Boletus esculentus, rugosus, fulvus. -
  4. Boletus esculentus, in metam fastigiatus.
  5. Boletus esculentus, compressus, deinde foraminulatus, & per longitu-  
dinem costatus, & cinereo-virescens, pediculo crassiore, albo. - p. agros. Tab. 85.  
f. 3.

pag. 204.

## Fungoides.

## Fungoidea Fungiformia.

- Helvella mitra
1. Fungoides magnum, tricuspidatum, oris retro reflexis, obsolete luteum,  
pediculo fistuloso. - Sub Fagis - Autumno.
  2. Fungoides, quod Boletus Autumnalis, lutescent. D. Breijni.
  3. Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum, & varie complicatum,  
pediculo crasso, striato, rimoso, ac fistuloso. - In nemoribus post diu. plur. Tab. 86.  
f. 7.
  4. Fungoides fungiforme, crispum, & laciniatum, ~~superne nigrum, in-~~  
~~ferne sub obscurum fuscum, pediculo striato, rimoso, ac fistuloso tenuiori.~~  
In nemoribus humidioribus.
  5. Fungoides fungiforme, crispum & laciniatum, Superne nigrum,  
inferne albidum, pediculo fistuloso, crassiore albo. - Fungo Canino, o fungo  
Monacella fetido. - April.
  6. Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum, & varie complicatum, su-  
perne sub obscurum, inferne simul cum fistuloso pediculo album. - Cum superi. Tab. 86.  
f. 8.
  7. Fungoides fungiforme pullum, crispum, & varie complicatum, super-  
~~ne sub obscurum, inferne cum fistuloso pediculo~~ pediculo tenuiori, non fis-  
tuloso. - Autumno in pratis. Tab. 86.  
f. 9.
  8. Fungoides fungiforme, crispum, & varie complicatum, Superne sativae gri-  
seum, & ad subobscurum vergens, inferne cum pediculo non fistuloso album.
- phallus Monacella



p. 204.

9. *Fungoides fungiforme*, galericulatum, superne & fulvo subfuscum, inferne  
griseum, pediculo longiore, rugoso, albo, tubulato, intestinorum forma. — April.

p. 205. 101

### *Fungoidea cava, aut plana, pediculo donata.*

*Fungoides picipitatum*, coriaceum, maximum, sordide virescens, pediculo donatum.  
*Cistolone*. Autumno.

2. *Fungoides infundibuliforma* griseum, externe costis, seu venis ramosis,  
& invicem implexis minutum. — Maio.

3. *Fungoides fuscum*, acetabuli forma, griseum externe ramificatum, sive  
*Fungoides maximum picipitatum*. Bot. Paris. n. 4. Tab. XIII. f. 1.

4. *Fungoides cespitosum*, infundibuliforma, fulvum, pediculo donatum.  
Imbutini di bosco, colore di foglia morta. — Octobr.

5. *Fungoides cespitosum*, infundibuliforma, fulvum, radice nigra, cespitosa  
tuberosa, perenni. — April. In Sylvas. T. 86.  
f. 10.

6. *Fungoides picipitatum*, intus corineum, externe albidum, pediculo pro-  
sus albo. — Pispide Scarlatina. — Autumno. T. 86.  
f. 8.

per. ligans

7. *Fungoides hippocrateis* forma, pediculo donatum, superne fulvum, infer-  
ne album. — Fungo sottocoppa. T. 86.  
f. 6.

8. *Fungoides globosum*, striatum, griseum, pediculo longo, albo, fistuloso.  
April. T. 86.  
f. 3.

9. *Fungoides parvum*, picipitatum, externe ex obscuro-griseum, interne ni-  
grum, & pellucidum. T. 86.  
f. 11.

10. *Fungoides griseum*, infundibuliforma, pendulum, pediculo donatum. T. 86.  
f. 13.

11. *Fungoides minimum*, cernuum, corineum totum, pediculo donatum  
Brumali tempore super emortua ligna. T. 86.  
f. 12.

12. *Fungoides minimum*, picipitatum, album, externe hirsutum, pediculo  
donatum. — Maio. T. 86.  
f. 13.

13. *Fungoides minimum*, picipitatum, obscurum, externe hirsutum,  
pediculo donatum (fuscus). — Januario.

14. *Fungoides minimum* infundibuliforma, candidum, pediculo incurvo  
donatum. — Januario & Sylvas.

*Pezizalicyathoides* 15. *Fungoides minimum*, infundibuliforma, albicans (totum vivum pti-  
Bulliard. - pte brevi), pediculo donatum hederæ foliis semiputridis innascens. Tab. 86.  
f. 14.



# Fungoidea Scutellata, sive Olmoidea.

1. Fungoides Scutellatum, majus, cerea flavæ colore.

Fungus tenuis, cerea flavæ similis, ventricosus, mortarium referens, Romanus.  
Bocc. Mus. part. 1. 300. Lycopod. Mortarii forma J. R. H. 561.

Scodelaccia, o berrettaccia di conio. — In fimi Equini tumulis, necnon in agris eodem fimo impinguat. — Veranale tempore.

2. Idem album. Cum supradicto, sed raro.

3. Fungoides angulatum, acetabuli forma. J. R. H. 560. — Vere.

4. Fungoides crispum, & undosum, acetabuli forma, intus & foris obscurum. Octobri & prota.

5. Fungoides Scutellatum, asperum, sordide album.

6. Fungoides Scutellatum, asperum, & veluti aculeatum, fulvum. In fictilibus recens stercoreis interdum reperitur.

7. Fungoides Scutellatum album, & glabrum. — In Syl. & Lincet. octo.

Per. Labellum  
Bull.

8. Fungoides Scutellatum, interne album, externe obscurum, & subhirsutum. — Autumno in umbrosis et humeris Sylvis inter putrida folia. T. 86. f. 4.

9. Fungoides scutellatum, album, foris hirsutum. — Loco & temp. usq.

10. Fungoides Scutellatum, pullum, foris hirsutum, intus glabrum.

Periza Scutellata  
Bulliard.

11. Fungoides Scutellatum, coccineum, intus glabrum, foris ubique pilosum. T. 86. f. 17.

Helv. Ciliaris. Gm.

12. Fungoides coccineum, oris pilosis, acetabuli forma. — Autumnus.

Helvella Campy-  
nularia Scopoli

13. Fungoides coccineum, acetabuli forma. — Inst. R. H. 561. — Fungus membranaceus, seu coriaceus, acetabuli modo concavus, colore intus coccineus, seu lavisino saturo J. Dale. Ray. Synops. Ed. 2. 19. n. 39. & Ed. 3. 18. n. 5. Vere & autumno. Lignis adnatum.

14. Fungoides obscurum, scutellatum, crassioris substantiæ, externe subasperum. — Majo post pluvias.

15. Fungoides scutellatum, minimum, atro-purpureum, & ad pullum vergens.

16. Fungoides Scutellatum, pullum, interne lucidum, & quasi vernigine infectum.

17. Fungoides Scutellatum, semisphaericum, sordide coccineum, externe villis obscuris obsitum. — Vere & ambulaera.



18. *Fungoides parvum, nigrum, interne laeve, externe rugosum, & striatum.* T. 86. f. 18.

19. *Fungoides Scutellae nonnimis caeca forma, candidum, membranaceum, musco innascens - In montosis, & muscosis locis, ut plurimum.*

20. *Fungoides minimum, scutellatum, nigrum, in caudicibus arborum post pluvias toto anno oritur.*

21. *Fungoides scutellatum, minimum, membranaceum, candidum, arborum caudicibus innascens.*

22. *Fungoides coccineum, lentiforme, oris pilosis - Ad foveas & agg. loc.* T. 86. f. 19.

23. *Fungoides minimum, scutellatum, atro-purpureum, intus splendens.*

24. *Fungoides minimum, scutellatum, vernum, aureum, externe polline concolori aspersum. - P. vere.*

*Helvella lutea  
Scopoli.*

25. *Fungoides scutellatum, patulum, minimum, aureum, externe sub-hirsutum. (Cisthus parvus, lentis magnitudine, flavus, margine villosus), per foveas aquis iam plane caecantes.*

26. *Fungoides minimum, lentiforme, vix cavum, fusco-rubrum, externe hirsutum, & obscurum.*

27. *Fungoides coccineum, minimum, oris non pilosis - Inter muscos.*

28. *Fungoides aureum, omnium minimum, turbinatum, & vix cavum, foliis euphrasi semiputridis innascens.* T. 86. f. 20.

29. *Fungoides spadiceum, membranaceum, omnium minimum. In silvis in arborum detuncatarum celsuris.*

### *Fungoidea Turbinata, aut pyri inversi, vel vasis fusorii forma.*

*Fungoides pyri inversi forma, ore laevo, & veluti coronato, ex albo-griseum.* T. 86. f. 2.

2. *Fungoides pyri inversi forma, caespitosum, ex fulvo-fusum. - Circa Palearia, & in triticea gluma.*

3. *Fungoides pyri inversi forma, intus coccineum, ore veluti marginato, extra corallinum, & glabrum. - Secus aqueductum - januario.*

4. *Fungoides coccineum, cupulam glandium referens, Sup. Tabefacta Ligna.*

5. *Fungoides pyri inversi forma, intus griseum, exterius subobscurum.*

6. *Fungoides infundibuli forma, exterius album, intus coccineum. In pms.*

*Per. acetabulum.* 7. *Fungoides maximum, vasis fusorii forma, subalbidum. - - - - -* T. 86. f. 1.

8. *Fungoides parvum vasis fusorii forma, perangustum, & quasi tubulatum, albidum.*



p. 208.

29. *Fungoides minimum*, vasi fusorii forma, niveum, externe hirsutum, Tab. 86. f. 18. pendulum.

# Clavaria

## Clavaria non Cespitosa.

Cl. Pistillaris.

- 1. *Clavaria major, lutea*. - *Mazza d' Ercole gialla*. - - - - - Tab. 87. f. 1.
- 2. *Clavaria major alba*. - *Fungus clavatus, albidus, pistillaris, Lycopodium* ~~clav. effigie~~ *species crepitus lupi*. *Bocc. mus. part. 1. Tab. 307. - cum sup.*
- 3. *Clavaria major atro-rufescens, crispa*. - *Idem fere locis &c.* T. 87. f. 2.
- 4. *Clavaria major, ex rufo sordide aurea, vertice plano, & nonnihil cavo*. T. 87. f. 3.
- 5. *Clavaria media, albo-lutea*. *In sylvestris locis*.
- 6. *Clavaria Ophioglossoides nigra* - *herbida & umbrosa ambulacra*. T. 87. f. 4.
- 7. *Clavaria, quæ fungus Ophioglossoides viridis, serpentiformis. D. Brejini.*
- 8. *Clavaria minima nigra, clavi effigie, pediculo subhirsuto*. - - - - - T. 87. f. 8.
- 9. *Clavaria lutea, minima*. - - - - - T. 87. f. 9.
- 10. *Clavaria alba, pistillari forma*. *Bot. par. 39. n. 7. Tab. VII. f. 8.*
- 11. *Clavaria rufescens, truncialis, tenuissima*. - *Post diut. plu. Autumn.* T. 87. f. 7.
- 12. *Clavaria minima, nivea*. - *In sylvestris vere & autumn.* T. 87. f. 6.
- 13. *Clavaria omnium minima, sordide alba*. - *In fictilibus hortorum* T. 87. f. 9. *terra stercoreata repletis, ut plurimum.*

p. 209.

## Clavaria Cespitosa.

Cl. Vermiculata } Scopoli -

- 1. *Clav. Cespitosa, major, candida*. - *Autumno*. - - - - - Tab. 87. f. 10.
- 2. *Clavaria Cespitosa, media, lutea* - *Primali & autumn. Temp. pp. nem.* T. 87. f. 12.
- 3. *Clavaria vermiculata, non fistulosa, candida*. *In aggeribus*. - - - T. 87. f. 12.
- 4. *Clavaria Vermiculata, fistulosa, candida*. - *Cannelli de Prati*. - - - T. 87. f. 13.



## Coralloides

*Coralloides flavum*. D. R. H. 162. Y. & aut. in *Ericetis* &c.

2. *Coralloides albidum*. Ibid.

3. *Coralloides dilute purpurascens*. Ibid. Cum superioribus, sed raro.

4. *Coralloides dilute rufescens*. Cum antecess. sed non ita obvium.

5. *Coralloides album*, corniculis dilute purpureis. Octobri in Sylvis.

6. *Coralloides igneum*, vel corallini coloris, corniculis brevioribus. T. 88. f. 2.  
In *Ericetis* & Sylvis caeduis.

7. *Coralloides dilute luteum*, corniculis expansis, brevioribus, & ramosis, in summitate bifidis. T. 88. f. 4.

8. *Coralloides luteum* Barrel. icon. 1260. - Cum antecess. & sequens.

9. *Coralloides rufescens*, corniculis brevioribus. Octobri.

10. *Coralloides corniculatum*, griseum, parvum. Octob. & Sylvas.

11. *Coralloides album*, ramulis bifurcatis tenuioribus, longis (Warr. i. 1280)

12. *Coralloides ramosum*, ex rufocarneo, platyceron, seu latis corniculis, apicibus brevioribus. - Cum superioribus. Tab. 88. f. 3.

pp. 210.

13. *Coralloides rufescens*, corniculis tenuioribus, bifidis. - - - T. 88. f. 1.

14. *Coralloides parvum*, cristatum, rugosum, & verrucosum, album. T. 88. f. 6.

15. *Coralloides parvum*, gelatinosum, caeruleum. - Semiputr. & Tabidis Liq. adnascens.

16. *Coralloides luteum*, parvum, juniperi caudicibus adnascens. - - - T. 88. f. 5.

17. *Coralloides minimum*, capillare, dilute violaceum. Octobri.

## Bijssus.

*Bijssus* est planta genus a precedenti distinctum, quod meris filamentis cylindricis aut ramosis, aut non ramosis, aut utriusque formae constat. Ex his filamentis prout diversas species produxeris, quaedam longa, quaedam breviora, quaedam etiam brevissima reperies. Differt quoque a *Conferva*, quod eadem filamenta, neque recentia, neque exsiccata ullis externis nodis aspera appareant; a *Horripore* vero, quod diuturnior sit, neque fugacis adeo naturae, & quod ejus specimina spicati, vel racemati disposita non appareant, sed secundum cauliculorum longitudinem locata. Quaedam ex his plantis coriaceae, quaedam herbaceae substantia donatae donantur. Plures serierum filamentorum congeriem, ut *Conferva* referunt, aliae tapetum, aut villorum seriem, aliae murinam, vel felinam pellem, aliae ovium vellus, felinum aliae, vel pannum, quaedam denum aranearum telum eleganter simulant, quemadmodum in Iconibus tabularum patet. Semina, quae in quibusdam videre contingit, vel rotunda apparebant, vel oblonga.



p. 210.

1. *Bryssus maritima*, Conferoides, ramosa, viridis, sericum referens. — Tab. 89. f. 1.
2. *Bryssus palustris*, Conferoides, non ramosa, viridis, filamentis crassioribus, setas aprinas emulantes. — In aquosis foveis. Tab. 89. f. 6.
3. *Bryssus palustris*, Conferoides, non ramosa, viridis, sericum referens, filamentis longis, tenuissimis. Tab. 89. f. 7.
- Bryssus aurea* L. 4. *Bryssus minima*, saxatilis, aurea, inodora, filamentis partim simplicibus, partim ramosis. — In rimis, & cavernulis super ingentia & Tartarea saxa &c. Tab. 89. f. 2.
- B. Foliohus* L. 5. *Bryssus germanica*, minima, saxatilis, aurea, *Viola Martia* odorem spirans. Tab. 89. f. 3.
6. *Bryssus minima*, cinerea, tenuissima, plerumque non ramosa, inodora, basi, seu carne crassiore, junioribus arboribus in parte, terra proxima, innascens, eamque convestiens. Tab. 89. f. 4.
- B. Velutina* 7. *Bryssus terrestris*, viridis, herbacea, & molliissima, filamentis ramosis, & non ramosis. — Verno tempore in hortis ad umbras, nec non ad sepes, & circa fossas udas, & Scillitidia. Tab. 89. f. 5.
8. *Bryssus minima*, palustris, obscura, crassioribus filamentis, plerumque simplicibus. — per Scillitidia, & Scaturigines. Tab. 89. f. 8.
9. *Bryssus major*, speluncis, & cellis vinariis innascens, latissima, primum alba, deinde aurea, postea fulva, filamentis crassioribus, & longioribus fissilibus. — In speluncis & Ferri fodina fornicibus, ubi etiam in fornicibus Cellarum vinariarum, quae clausae nullo spiraculo gaudent, quandoque etiam in tubis, & canalibus ligneis, aquam ducentibus invenitur. Tab. 90. f. 1.
10. *Bryssus latissima*, speluncis, & cellis vinariis innascens, felorum, vel pannum laneum simulans, primum alba, deinde nigra, filamentis tenuissimis non ramosis. ubi antecedens. Tab. 89. f. 9.
11. *Bryssus serica*, fulva, per elegans, tenuissima, & ramosissima, rimis terre innascens, & glebas circumvestiens. — In aggerosis locis. Tab. 90. f. 4.
12. *Bryssus purpurea*, delicatesima, arborum corticibus adnascens, brevissimis, ac tenuissimis filamentis. — Autumnali, atque Hyemali tempore. Tab. 90. f. 3.
13. *Bryssus subpurpurea*, Lichenis facie, lauri caudicibus constanter innascens, filamentis brevissimis invicem implexis, & colligatis. — ad lauros copiosissima. Tab. 90. f. 2.
14. *Bryssus palustris*, subobscura, filamentis brevibus, non ramosis. Tab. 89. f. 10.
15. *Bryssus aquatica*, tenuissima, atro-virens, pellem murinam referens, brevissimis, & simplicibus filamentis. — Hyemali tempore in aqueductis. Tab. 89. f. 11.
16. *Bryssus serica*, ex viridi-nigricans, filamentis brevibus, partim bifidis, partim integris. — per Viridaria & ad Quercus. Tab. 90. f. 7.
17. *Bryssus sulphurea*, Lichenis facie, tenuissima, ac densissima, felorum & pannum laneum textura simulans. — Aestate, ad arbores, ubi ad Olives &c. Tab. 90. f. 6.
18. *Bryssus Cespitosa*, nigra, filamentis ramosis, & non ramosis. — Ad arbores. Tab. 90. f. 7.



p. 212. 19. *Bijssus minima* corulea, non ramosa, musco innascens — Ad saxa supra Tab. 90. f. 8.  
 muscos squamosos. Primo vere.

20. *Bijssus minima*, sacatilis, nigra, ramosissima, viticulis nudis. Tab. 90. f. 5.  
 In collibus ad Saxa. 6 Jan. & febr. mensibus oritur.

*Bijssus* vocatur, quia cum latius plerumque se diffundat, *bijssinam*,  
 latamque telam representat.

## Botrytis.

*Botrytis* est plantae genus, a *Bijssu* duntaxat discretum vitæ brevitate  
 & seminum racematum, vel spicatum in Cauliculorum, vel ramorum summo,  
 Constanti dispositione.

1. *Botrytis comata*, grisea, caule simplici, crassiore, seminibus rotundis. Tab. 91. f. 1.  
*Muffa griggia*, arborea. — Ad marcidam, & semiputrida ligna, & Cortici culmos.  
 tempore Hyemali, non raro invenitur.

*Mucor crustaceus* L. 2. *Botrytis non ramosa*, alba, seminibus rotundis. — Omnium vulgarissima, T. 91. f. 3.  
 est, & in quibuscunque corporibus, dum corrumpuntur, invenitur.

3. *Botrytis ramosa*, cinerea, seminibus rotundis. — ubi Superior. Tab. 91. f. 2.

4. *Botrytis spicata*, grisea, seminibus rotundis. — Per ambulacra fornicibus T. 91. f. 4.  
 tecta, &c.

*Botrytis* dicitur a Voce Graeca *Botrys* racemus, id est racemosa, nam haec in  
 hac planta semina racematum nascuntur.

## Aspergillus.

*Aspergillus* dicitur a forma aspersorii, quo in Sacris utimur, quam praefert.

*Mucor glaucus* L. 1. *Aspergillus capitatus*, capitulo glauco, seminibus rotundis. — *Muffa* var. T. 91. f. 1.  
*china*, *gambata*. — In Mali Limonii, atque Eidonii, & Syri, nec non in Cucurbitae frustulis, & aliis similibus locis semiputridis rebus oriri plerumque solet.

2. *Aspergillus capitatus*, capitulo aureo, seminibus rotundis. — *Muffa gambata*,  
*dorata*. — Cum antedicto, sed rarissime invenitur.

3. *Aspergillus capitatus*, capitulo pullo, seminibus rotundis. — *Muffa* *neva*  
*gambata*. — ubi supra.

p. 213. 4. *Aspergillus capitatus*, omnium minimus, albus, seminibus ovatis — T. 91. f. 2.  
 per Cellas Vinarias in vasis vitrei Veste.

*Muc. leprosus* L. 5. *Aspergillus caespitosus*, densissimus, initio niveus, deinde aureus, seminibus T. 91. f. 3.  
 ovatis. — Ad arborum radices, in earundem cavernulis.



6. *Aspergillus niveus, cespitosus, seminibus rotundis.* — Post diut. plu. ad arb. T. 91. f. 7.  
 7. *Aspergillus cespitosus, ex obscuro nigrescens, seminibus ovatis.* Muffa. T. 91. f. 6.  
 Toto anno viget in asperibus, quibus cancelli contexuntur, & ad ligneas columnas.  
 M. Cespitosus L. 8. *Aspergillus albus, tenuissimus, graminis Dactyloidis facie, seminibus* T. 91. f. 3.  
*rotundis.* — In dimidiatis & semiparvis Malis Limonibus.  
 M. Cespitosus L. 9. *Aspergillus terrestris, cespitosus, ac ramosus, albus.* — Tab. 91. f. 4.

## Puccinia. Maria, ~~Vittor~~ Hill

*Arthura Puccinia Patricio Pistoriense, in Florentino Lyceo Philosophia,  
 & Anthonis P. Professore.*

1. *Puccinia non ramosa, major, pyramidata.* — Martio super junip. T. 92. f. 1.
2. *Puccinia ramosa, bifurcata, omnium minima, candidissima, pruinam* T. 92. f. 2.  
*referens.* — Super dejecta, & putrida Ligna. Octobri

## Clathrus.

- Cl. Cancellatus. 1. *Clathrus ruber.* — Fungus Salvaticus rosso. (vid. Batarr. & Gen. Bull.) T. 93.  
 2. *Clathrus albus.* — Fungus pro capitulo laminarum longam, laram  
 multipliciter laciniatam, & concoloratam, albam intus, punctis nigris creberrimis  
 pictam, emittens, calyce squamoso exceptam Rati. Hist. Tom. 2. 28.  
 3. *Clathrus flavescens.* — Fungus Corall. &c. Barr. ic. 1265.

*Clathrinomena in his plantis indidimus, quod ead clathrata, ac cancellata, retis  
 aut ferrate fenestrae instar appareant.*

## Clathroides.

- Cl. Denudatus L. 1. *Clathroides purpureum, pediculo donatum.* — Tab. 94. f. 1.  
 2. *Clathroides purpureum, pediculo carent.* — In emorruis lignis. — Tab. 94. f. 2.  
 3. *Clathroides flavescens, pediculo carent.* — Rust. Lign. post pluvias.  
*Clathroides dicitur, quasi planta ad clathrum accedens.*



## Clathroidastrum.

Dicitur quasi planta ad clathroides accedens.

Clathrus  
nudus.

- { 1. Clathroidastrum obscurum majus — In ligni putridi caecornulis. Tab. 94. f. 1.  
2. Clathroidastrum obscurum minus. — Ad palos, & columnas. — T. 94. f. 2.

## Mucor

Ab Etruscis dicitur Muffa, cujus vernacula vocis etymon, forte a Græca voce Mepliti ortum ducit, quæ foetorem donat; nam planta hæc, dum in locis provenit clausis, ad quæ Solares radii non pertingant, ut in cellis vinariis aut dolis, male olentem spirat odorem, quem iidem Etrusci peculiariter nomine Tarrfo ἀποτὸς τάρφου, idest Sepulchro, cui simile quid olet.

M. Mucedo. L.

1. Mucor vulgaris, capitula laevis & maturitate nigro, pediculis griseis T. 95. f. 1.  
2. Mucor albus, minimus — In fimi Equini tumulis, super culmi tritici frag- T. 95. f. 2.  
mentis.  
3. Mucor globosus, lactis coagulati candorem, & substantiam emulans T. 95. f. 3.  
Super detrimatis, & semiputridis Abietum Caudices.  
4. Mucor minimus, cespitosus, candidus. — Super semiputr. culm. Trit. tumulis T. 95. f. 4.

# 216.

## Lycogala.

Dicitur a Vocibus Græcis λύκος, Lupus, & γάλα, Lac, quasi diceretur Lac Lupinum.

1. Lycogala griseum, majus. — Vescia luttajola grigiadi Quercia — In Tab. 95. f. 1.  
queruum Caudicibus. (capitula crystallina, gelatinosa, subpellucida).  
2. Lycogala globosum, rubrum granis magnitudine, & ris reocti T. 95. f. 2.  
colore — Ad Ligna uida, atque semiputrida. — Vescia luttajola rossa di albero.  
3. Lycogala globosum, rubrum, granis parvis magnitudine, & forma — Ad T. 95. f. 3.  
Subera.  
4. Lycogala luteum, omnium minimum, reniforme — Ad seipsum T. 95. f. 4.  
Arborum truncos semiputridos.  
5. Lycogala terrestre, cespitosum, & ris reocti colore — Vescia luttajola T. 95. f. 5.  
rossa terrestre — In tumulis terre ad montanos agros fecundandos spar-  
sim agrestis, atque excoctis igne vepribus, ac genistis immixto, ad triticum,  
vel Secalem Serendam; rustici nostrates Fornelli vocant.



## Mucilago.

Dicitur a Planta ad Mucum accedens.

1. Mucilago aestiva rufescens, hemisphaerica, caudicibus arbo. T. 96. f. 1.  
num innascens - Aestivo tempore
2. Mucilago crustacea alba. - Mucicaglia - In pratis & nemor. T. 96. f. 2.  
bus, variis quicquiliis innascens - Aestivali tempore - - -
3. Mucilago alba, ramosa, radices arborum fibrosas simulans - In T. 96. f. 3.  
arborum castris - Autumno.
4. Mucilago minima clavae effigie, lacteum candorem simulans, T. 96. f. 4.  
pediculo donata. - April. in viridariis - - -
5. Mucilago minima fungelli effigie, primum rufa, postea cinerea. T. 96. f. 5.  
In agris in fini Equini aggestis - Autumno.
6. Mucilago minima non crustacea, alba, grani panici magni - T. 96. f. 7.  
tudine, & forma - In foliis semiputridis & strigibus.
7. Mucilago minima crustacea alba, capsulis grani panici magnitud. T. 96. f. 6.  
dine & forma, dense positis. - Super semiputrida arborum folia. Br. 7.
8. Mucilago alba, crustacea, capsulis inter se longe distantibus - Cre. T. 96. f. 8.  
- sic eodem loco, & tempore. i. e. Aestivali.
9. Mucilago Crustacea, colore plumbeo, elegantissimo, capsulis T. 96. f. 9.  
minimis, densissimis. - Ubi tres antecedentes.

## Lycoperdon.

Appellatur a vocibus Graecis λυκος, Lupus, & πῆδος, Pedo; crepitum ventris  
edo, quasi diceret, Lupi Crepitum.

## Pediculati.

1. Lycoperdon album, totum aculeatum, altiori base donatum. - In sylvis T. 97. f. 1.
2. Lycoperdon album, aculeatum, basi altiori, crispum, & nonnihil as-  
pera - In Ericetis & Castanetis.
3. Lycoperdon griseum, hirsute asperum, breviori base. In Castanetis
4. Lycoperdon album, lanuginosum, corticem primarium manifeste T. 97. f. 2.  
exuens. - Vesica bianca, buona, che butta manifestamente la scorza.
5. Lycoperdon album, coniforme, altiori base insidens, totum asperum  
Vere, & Autumno in sylvis, & dumetis, nec non in pascuis abunde oritur.



p. 217

6. *Lycoperdon album, asperum, leviter fastigiatum, basi altiori, & crispa donatum.*

7. *Lycoperdon album, cordis effigie, transverse positum, pediculo brevi donatum.*

8. *Lycoperdon parvum, album, clavatum, aculeis quadrilateris, & quadripartitis asperum.*

*Lyc. pedunculatum.* 10. *Lycoperdon (album, mammosum) Parisiense, minimum, pediculo donatum. Just. R. herb. 563. Tab. 331. 2. f. — 8 Jan. et febr. in sylvis, necnon ad sepes, vepres, & agrorum limites, & in muscosis locis.*

p. 218

11. *Lycoperdon album, mammosum, pediculo longo, & veluti squa-*  
-moso, ac fistuloso donatum. T. 97. f. 7.

12. *Lycoperdon omnium minimum, album, unguibus Equinis p-*  
-trescentibus innasens. T. 97. f. 8.

### Absque Pediculo.

*Lycoperdon esculentum, majus, subobscurum, & subasperum.*  
Vescia maggiore, bigia, buona da friggere. — Vere & autumno

2. *Lycoperdon nivium, sphaerium, superficie in areolas adhaerens*  
instar dissecta, ac distributa. J. R. H. 564. Vescia maggiore, bianca, da friggere.  
Fungus carnosus, niveus, globosus, adhaerens, in montibus Feltri-  
-nis. Soc. Mus. part. 1. Tab. 306.

3. *Lycoperdon esculentum, obscurum, echinis quadrangularibus, & quadri-*  
-partitis insignitum. T. 97. f. 5.

4. *Lycoperdon esculentum, nitidum, molle, albo-carrinum, radicibus*  
crassioribus praeditum.

5. *Lycoperdon turbinatum, leucophaeum, aculeis simplicibus, & nig-*  
-diusculis exasperatum.

6. *Lycoperdon album, globosum, nitidum, esculentum.*

7. *Lycoperdon globosum, candidum, nitidum, & esculentum.*

8. *Lycoperdon globosum, luteum, glabrum, & nitidum.*

9. *Lycoperdon sphaerium, esculentum, cortice nitido, & nigro, pulpa*  
alba. — In arvis Carbonariis.

10. *Lycoperdon globosum, album, cortice primario in stellulas ele-*  
-gantissimas dissecto, ac distributo. T. 97. f. 3.



11. *Lycopodon sphaericum*, album, ~~parvum~~, cortice primario in 897. f. 6.  
furfuraceas portuunculas abeunte.
12. *Lycopodon esculentum*, album, parvum, cortice primario in  
adamantinas cuspides veluti pentagonas, & quadrupartitas secto.
13. *Lycopodon esculentum*, hemisphaericum, griseum, villis, seu 897. f. 4.  
aculeis tenuissimis, non exstantibus, obductum.
14. *Lycopodon esculentum*, obscurum, castaneae formam si-  
mulans.
15. *Lycopodon esculentum*, album, globosum, aculeis crassi-  
oribus quadrilateris, & quadrupartitis munitum.
16. *Lycopodon esculentum*, album, hemisphaericum, cortice pri-  
maro in adamantinas cuspides fere pentagonas soluto.
17. *Lycopodon sphaericum*, luteum, parvum, non asperum,  
In truncis, vel asperibus piceis semiputridis.

## *Lycoperoiides.*

Distinguitur a *Lycopero*, quod unius cortice, atque uniformi Substantia  
instructum sit. &c.

1. *Lycoperoiides* album, tinctorium, radice amplissima. T. 98. f. 1.  
Autumno, in vestilibus, & sterilibus agris, &c.
2. *Lycoperoiides* tuberosum, ferrugineum, arrhizon, pulpa nigra T. 98. f. 2.
3. *Lycoperoiides* tuberosum, flavescens, multiplex. T. 98. f. 3.

## *Lycoperastrum.*

*Lycopodon*  
verruosum  
Bull.

1. *Lycoperastrum* rotundum, majus, leucophorum, pulpa sordide T. 99. f. 1.  
Cerulea — Vesica tartar. — In incoltris & quiescentibus agris. Autumno
2. *Lycoperastrum* leucophorum, cortice verruoso, pulpa sordide  
Cerulea.
3. *Lycoperastrum* obscurum, alius radiculatum, pulpa atro-pur-  
purea, cute lacera, & in furfurum veluti soluta.
4. *Lycoperastrum* obscurum, alius radiculatum, pulpa atro-pur- T. 99. f. 3.  
purea, cute lacera, veluti punctata.

In Originali desunt n. 4. & 5., forte ob errorem impressoris.



7. *Lycopodastrum obscurum*, aliis *radicatum*

7. *Lycopodastrum* quod *Lycopodon* e flavo-virescens, squamatum  
Bot. Paris. 172. n. 4. *Lycop. verrucosum*, sphaerium, pediculo donatum  
e flavo-virescens punctulis fuscis aspersum. Ejusd. Tab. XVI. n. 7.

8. *Lycopodastrum*, quod *Lycopodon* cepae facie. Bot. Par. 173. n. 13.  
Tab. XVI. f. v. vi.

*Lycopod. aurantium*  
Bulliard.

9. *Lycopodastrum* autumnale, flavescens, cortice tenuiori, lavi, T. 99. f. 2.  
pulpa sordide purpurea.

*Lycopodon Cerinum*  
Linn.

10. *Lycopodastrum* tuberosum, arthizon, fulvum, cortice duriore  
crasso, & granulato, medulla ex albo-purpurascens, semine nigro,  
crassiore. T. 99. f. 4.

Ad hoc quoque genus spectare videtur. Fungus subcaerulea pulpa, arthi-  
lis flavis. Booc. Rarior. Plant. 23.

*Lycopodastrum* dicitur quasi planta ad *Lycopodon*, & *Lycopo-*  
-dioides accedens.

## Geaster.

Dicitur a Graecis vocibus γῆ Terra, & ἀστὴρ Stella, ac si Terrestrem  
Stellam diceret.

*Lycop. Stellatum* L.

1. *Geaster* major, umbilico fimbriato. T. 100. f. 1.
2. *Geaster* medius, umbilico fimbriato. T. 100. f. 2.
3. *Geaster* asper, parvus, umbilico coronato, pediculo perbrevis donatus. T. 100. f. 3.
4. *Geaster* major, umbilico, seu osculo stellato - fig. 6. eadem plan- T. 100. f. 4.  
ta jam effacta exprimitur.
5. *Geaster* medius, radiis plerumque multifidis, umbilico, seu osculo T. 100. f. 5.  
stellato

## Carpobolus.

A vocibus Graecis καρπὸς fructus, & βάλλω jacio, ac si plantam fructum  
ejaculantem diceret.

*Lycop. Carpobolus* L.

1. *Carpobolus* . . . . . T. 101. f. 1.  
Super ligna semiputrida, & fructus Cyprapus &c. Autumno post pluvias.
2. *Carpobolus* aureus, volva alba, fructu obscuro, seminibus subrotun- T. 101. f. 2.  
dis, albicantibus. In sylvis ad arborum vetustarum radices, super cariei, &  
tronco decidentis aggestos tumulos constanter provenit. Autumno. Breui Temp.



## Tuber.

1. Lycopodium  
Tuber. L.

1. Tuber Brunnale, pulpa obscura, odora.
2. Tuber Estivum, pulpa subobscura, minus sapida, ac odora.  
Tuber albidum. Casalp. 613. Tastero nostrale.

Tab. 102.

Dicta autem sunt tubera, quasi tumores terræ, a similitudine tumorum, qui animalium corporibus aliquando spectantur. Sunt enim prominentiæ quædam supra reliquam superficiem exstantes, Græcis οἰσμήματα, idest tumores, & inflationes.

## Cyathoides.

Dicitur a forma Cyathi quam refert.

Per. lentifera L.

1. Cyathoides Cyathiforme, cinereum, & veluti sericeum. Tab. 102. f. 1.  
In sylvis ad ligna putrescentia, nec non in agris, & circa palearia,  
super cortices calvos tabefactos. Vere, autumnali, ac hyemali Temp.

Per. hirsuta.

2. Cyathoides Cyathiforme, obscurum, externe hirsutum, interne plumbeum, glabrum, & striatum. Tab. 102. f. 2.  
In sylvis supra ligna putrescentia & in terra.

3. Cyathoides luteum ~~Cyathiforme~~ Crucibuliforme. Tab. 102. f. 3.

4. Cyathoides Scutellatum, ore crispo, fructibus nigris, majoribus. Tab. 102. f. 4.

5. Cyathoides, quod fungus seminifer, minor, fere hemisphaericus  
Raii. Ed. 2. App. 333. & Ed. 3. 20. 11. 21. Tab. 1.



# Sequuntur Lichenes a Michelio Descripti.

## Ordo. I.

- I. Lichenes non crustacei, erecti, vel penduli.
- II. Flores in receptaculis planis, cavis, convexis, & sphaericis.
- III. Receptacula florum in una, vel in utraque parte, vel ad extremitatem plantarum posita.
- IV. Semina subhirsuta, vel in peculiaribus scrobiculis, vel in tuberculis, vel sub omnium foliorum cute enascentia.

*L. Fraxineus* Lin. Lichen pulmonarius, rufescens, durior, in amplas lacinias divisus. — T. 36. f. 1. — *L. arbores, cinereus* Βλατυκκινος, cornuoides. Ppted. Comp. Tab. 21. — *On arbor. Strigibus.*

2. Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias divisus. — J.R.H. Tab. 525. A.

*L. Calicaris* Lin. <sup>pag. 79.</sup> 3. Lichen cinereus, latifolius, ramosus. — J. R. H.

*L. Farinaceus* L. 4. Lichen cinereus, angustior, scutis (scrobiculis seminaalibus potius) in marginibus segmentorum. — Bot. Paris.

*Lichenoides arborum*, ramosum, cinereo-virescens, segmentis angustioribus, circa margines crispis. Ray. Synops. ed. 3. 76. n. 84.

5. Lichen pulmonarius Alpinus, cinereus, durus, creberrime divarigatus, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 36. f. 2. — *In abietum, & Jagorum ramis.*

6. Lichen Pulmonarius Alpinus, cinereus, durior, segmentis crebris ad extremitatem tenuissima divisis.

7. Lichen Pulmonarius mollior, cinereo-rufescens, segmentis lationibus, receptaculis florum peramplis. — *Super neglectas arbores.*

8. Lichen Pulmonarius cinereus, mollior, segmentis lationibus, varie divisis, receptaculis florum rufescentibus. — *Ad arbores.*

9. Lichen Pulmonarius mollior, dichotomos, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum interna parte ferrugineis Tab. 36. f. 3. *Arboreus.*

10. Lichen Cinereus, ramosus, verrucosus. — Bot. Paris. Tab. XX. f. 13. *Ad abietes in alpiibus.*



11. Lichen Pulmonarius, saxatilis, cinereus, crispus, varie divisus.  
 12. Lichen Pulmonarius minimus, subluteus, receptaculis florum coronatis, Mali aurantii coloris. Tab. 36. f. 11. — Ad Pynos, & Abietes.

## Ordo II.

- III. Receptacula florum ad foliorum extremitatem locata.  
 IV. Semina in filamenta, plerumque multifida disposita, & ad margines, vel a summa plantae superficie erumpentia.

Lichen Alpinus, membranaceus, elegans, in amplas lacinias divisus, inferne albus, superne & glauco-sabovirescens, receptaculis florum amplioribus, interna parte fuscis. Tab. 37. — Ad fagos, & Abietes.

pag. 76.

## Ordo III.

- III. Receptacula florum in utraque parte plantae sita.  
 IV. Semina . . . . .

Tremella

Lichenoides L.

Lichen Terrestris membranaceus, mollior, fuscus, receptaculis florum sordide rubris, perexiguis. Tab. 38. — Inter Muscos & graminia crep.

## Ordo IV.

- III. Receptacula florum in una tantum foliorum parte locata.  
 IV. Semina in filamenta simplicia disposita quae per totam foliorum superficiem crebra nascuntur.

L. Prunastri.  
 Cuneus adula.

Lichen Alpinus, cornua Cervi referens, subrus anthracinus, desuper cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus fuscis. Tab. 38. f. 1. — In Abietibus, & fagis, sed rarus.

2. Lichen maritimus, albus, subhirsutus, cornua Damci referens, receptaculis florum interna parte flavescens. Tab. 38. f. 2. — In sylvestrium prunorum ramis, & caudicibus.

3. Lichen maritimus, albidus, angustior, receptaculis florum nigricantibus. Tab. 38. f. 3.



## Ordo V.

I. Lichenes ut plurimum teretes, non tubulati, erecti, vel penduli.

III. Receptacula florum secundum cauliculorum longitudinem, vel in eorum extremitate locata.

IV. Semina vel subhirsuta & interse connexa, in peculiaribus locis, vel lœvia, & in filamenta simplicia, aut multifida, per totam plantarum superficiem dispersa.

L. Articulatus. L. 1. Lichen nodosus, cinereus, longissimus, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 39. f. 1. — In Abietibus

L. Plicatus. Lin. 2. Lichen longissimus, ex cinereo-candicans, rugosus, & mollior, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 39. f. 2. — Ex Fago, & Abiete pendens.

[Divaricatis Proxim. 3. Lichen longissimus, ex cinereo-candicans, rugosus, & mollior, aliter. — Ad arbores.

4. Lichen ex cinereo candicans, longissimus, surculis rigidioribus, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 39. f. 4. — ubi n. 2. rep.

5. Lichen luteus, rugosus, tinctorius, surculis brevioribus — simul cum n. 3.

6. Lichen cinereus, longissimus, rugosus, junceus, & subasper. Tab. 39. f. 3. — in Abietibus.

7. Lichen capillaceus, longissimus, sive muscus arboreus nigricans. — In Abietibus, & ad Castaneas.

8. Lichen capillaceus longissimus, ex Fago, & Abiete pendens.

9. Lichen cinereus, longissimus, barbatus, receptaculis florum rufescentibus, coronatis — In Fagis, & Abietibus.

10. Lichen purpurascens Lusitanicus, capillaceo folio major. J. R. H. 1750.

11. Lichen capillaceus, ex cinereo-rutilans, receptaculis florum subcinereis, & barbatis. Tab. 39. f. 5. — In glandiferarum arborum caudicibus.

12. Lichen capillaceus ex cinereo rutilans, tuberculis rufescentibus undique obsitus. — In Sepiariis plantis.

13. Lichen cinereus, capillaceo folio, minor. J. R. H. 1750.

Muscus Quernus, fruticosus, Trichophyllum, Col. parv. 1. 331.

14. Lichen Polygoides tinctorius, saxatilis, Coroll. 40. — Lichenoides non tubulorum Platydasiphyllum, tuberculis pulverulentis donatum Rasi.



15. Lichen saxatilis, Italicus, Polygoides, cinereo-fuscus, crispus.
16. Lichen terrestris, fuscus, hirsutis asperus, receptaculis florum atro-nigris, coronatis. Tab. 39. f. 7. — In Ericetis.
17. Lichen terrestris, angustior, ramosissimus, fuscus. Bot. paris. 115.
18. Lichen terrestris atro-fuscus, minor, ramosior, ac rigidior, & veluti amuleatus.
19. Lichen alpinus, coralloides, cinereus, dichotomos, dense ramificatus, apicibus vix bifidis.
20. Lichen cinereus fruticosus, saxatilis, racemulis seminum undique obductus, receptaculis florum nigricantibus. Tab. 53. f. 8.
21. Lichen saxatilis, cinereus, fruticosus, ramulis habitioribus, minus ramosis, racemulis seminum undique, & dense refertis, receptaculis florum nigricantibus. Tab. 53. f. 6. — Sup. ingentia & deusta saxa.
22. Lichen alpinus, glaucus, ramosus, bostryoides (Tab. 53. f. 7.) Scheuchz.
- L. quiscquilianis 23. Lichen terrestris fruticosus, cinereus, minimus. Tab. 53. f. 8.  
Leers (Gmel. p. 1377) In antiquis murorum spuriis, necnon in saxorum cavernis.
- p. 79. 24. Lichen saxatilis, minimus, nigerrimus, capillaceus.
25. Lichen arborum nigerrimus, vix conspicuus. — In nimis arborum corticem, & prodeique Populi nigri.

## Ordo VI.

- I. Lichenes frutiosi, teretes, tubulati, Corallio edmuli.
- III. Receptacula florum in ramulorum apicibus.
- IV. Semina subhirsuta, plerumque simul juncta ob totam plantarum cutis solutionem provenientia.

L. Alpestris  
Lin.

- Lichen coralloides, tubulosus major, candidus, ramosissimus, receptaculis florum rufescentibus, perexiguus. Tab. 40. f. 1. — In Ericetis.
2. Lichen coralloides, tubulosus, medius, cinereus, caulibus crassioribus, dense ramificatis, receptaculis florum rufescentibus. cū. sup.
3. Lichen coralloides, tubulosus, alpinus, medius, cinereus, caulibus crassioribus plerumque foliosis, brevissime ramificatis, receptaculis florum rufescentibus, perexiguus, ramulorum apicibus, & caulium dorso, atque foliorum superficie nascentibus.



p. 79.

4. Lichen coralloides, tubulosus, medius, cinereus, caulibus tenuioribus, crebris, ramosissimis, ramulis expansis, receptaculis florum rufescentibus. In Ericetis &c.

5. Lichen coralloides, tubulosus, medius, cinereo-candidans, caulibus crebris, tenuioribus, minus ramosis, receptaculis florum rufescentibus.

6. Lichen coralloides tubulosus, albidus, major, & mollior, caulibus crassioribus, minus ramosis, receptaculis florum perexiguis, rufescentibus. Tab. 40. f. 2.

7. Lichen coralloides, tubulosus, albidus, major, & mollior, caulibus crassioribus, minus ramosis, receptaculis florum perexiguis rufescentibus.

8. Lichen coralloides, tubulosus, major, ex cinereo-fusco-virescens, caulibus crassioribus, & durioribus, minus ramosis, extremitatibus palmatis, receptaculis florum exiguis, rufescentibus. Tab. 40. f. 3.

p. 80

9. Lichen coralloides, tubulosus, alpinus major, & durior, ex cinereo-virescens, caulibus primariis nonnihil compressis, cubino ad summum in ramulorum apicibus receptaculis florum perexiguis, ac rufescentibus ornatis. — In alpinis.

10. Lichen coralloides tubulosus, major, montanus, ex cinereo-viridi-rufescens, caulibus recurvis, nonnihil foliosis, inordinate dispositis, receptaculis florum crassioribus rufescentibus. Tab. 40. f. 4.

11. Lichen coralloides, tubulosus, medius, ex cinereo-viridans, ramulis eduncis, plerumque foliosis, extremitatibus palmatis, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 40. f. 5.

12. Lichen coralloides, tubulosus, medius, ex cinereo-viridans, ramulis erectis, nonnihil foliosis, extremitatibus apertis & palmatis, receptaculis florum rufescentibus, exiguis. Tab. 40. f. 6.

13. Lichen coralloides, tubulosus, medius, ex cinereo-viridans, caulibus tenuioribus, acutis, minus ramosis, receptaculis florum rufescentibus.

Coralloides Cornu Corni referens, glabra, corniculis tenuioribus, bifurcatis. Hist. Pl. Paris. 423. & Bot. Paris. 42. — In Ericetis.



13. Lichen coralloides, tubulosus, cinereus, minor, parum ramosus, receptaculis florum Cocineis.

14. Lichen Coralloides tubulosus, minor, & gracillimus, subvividus, ramulis erectis, nonnihil foliosis, receptaculis florum rufescentibus.

## Ordo VII.

I. Lichenes Cauliferi a crassa foliacea peraequua evascentes, caulibus tubularis, plerumque ramosis, vel in cornicula, vel in proboscideam vel in pyxidulas minus quam in sequenti ordine speciosas, atque patentes, & in ore clausas desinentibus.

III. Receptacula florum & pyxidularum marginibus erumpentia.

IV. Semina subhirsuta, ut plurimum simul juncta & a solutione cutis cauliculorum, & inferna foliorum parte nascentia.

2. L. Deformis. Lichen pyxidatus, & corniculatus, proli fer (e viridi obsolete lutescens) Scheuchz. In albis.

1. Lichen pyxidatus, teres, acetabulis minoribus repandis (Tab. 41. f. 1.) F.R.H. 549.

3. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis (Tab. 41. f. 2.) H.F.R. 549.

p. 81. 4. Lichen pyxidatus, & corniculatus, cinereus, pulverulentus, major, & coarctior, plerumque multiridus.

5. Lichen pyxidatus, & corniculatus, cinereus, pulverulentus, corniculis brevioribus.

6. Lichen pyxidatus, & corniculatus, cinereus, angustior, & elatior, corniculis longioribus. — Tab. 41. f. 3.

7. Lichen pyxidatus, & corniculatus, albidus, <sup>minor</sup> major & gracilior.

8. Lichen pyxidatus & corniculatus, leprosus, corniculis tenuioribus, bifurcatis. Tab. 41. f. 4.

L. Gracilis. 9. Lichen pyxidatus, & corniculatus, ramosus, Alpinus, & fusco-cinereus, pyxidulis crenatis — Tab. 41. f. 5.

10. Lichen pyxidatus, ramosus, acetabulis fimbriatis. F.R.H. 549.



p. 81.

11. Lichen cinereus, crassus, ramosus, & non ramosus.  
Lichenoides tubulosus, minus ramosus, cauliculis crassioribus, diffor-  
-mibus. Rayi. Synops. ed. 3. 68. n. 22.
12. Lichen cinereus, proboscideus, & corniculatus, ut plurimum non ra-  
-mosus.
13. Lichen albus, proboscideus, & corniculatus, plerumque non ramo-  
-sus, Proboscideum oris coccineis. — In Castaneis & Quercetis.
14. Lichen ex alba subcinereus, proboscideus, & corniculatus, minor, ut  
plurimum non ramosus.
15. Lichen tubulosus, nivei fere candoris, ramosus, & non ramosus, ap-  
-pibus recurvis, acutis. Scheuchz. Obs. Bot. Itiner. Alp. 2. ed. Lond. p. 63.
16. Lichen tubulosus, verrucosus, ex obscuro virore flavescent. Eiusd.
17. Lichen pixidatus albus, grautilimus, pixidulis multifidis, & ab-  
-ra alteri innata. — In Quercetis & Sylvis caducis.

pag. 82.

## Ordo VIII.

I. Lichenes communiter dicti pixidati, aut bifformes, constantes e crustu-  
-la foliacea, & pixidiculis speciosis, atque majusculis, & in ore clausis,  
vel simplicibus, vel ramosis, vel e margine, vel e medio altera ex  
altera innascente.

L. Pixidatus Linn. Lichen pixidatus major — Tab. 41. f. 1. K. L. In omnib. sylv.

L. Pixid. var B. 2. Lichen pixidatus major, Alpinus, receptaculis florum copioso-  
-ribus, & rufescentibus. — Tab. 41. f. 2.

L. Cocciferus Linn. 3. Lichen pixidatus (rugosus, proliifer, & non proliifer) acetabulorum  
oris coccineis, & tumentibus. — Tab. 41. f. 3.

4. Lichen pixidatus proliifer, acetabulis rudibus, & minus cavis,  
receptaculis florum coccineis. — Inter fagos, & Abies.

5. Lichen pixidatus, acetabulorum oris proliiferis, receptaculis  
florum rufescentibus — Tab. 41. f. 7.

6. Lichen pixidatus, acetabulorum oris fuscis, & tumentibus. J. R. H. 59.

7. Lichen pixidatus ramosus, & proliifer, major, receptaculis florum rufescentibus.  
Tab. 41. f. 8. — In Sylvis.



8. Lichen pyxidatus ramosus, & prolifer medius D. Scheuchzerii.
9. Lichen pyxidatus, Endiviae crispae folio, prolifer, (superne flavescent, inferne albidus) acetabulorum oris crispis. — Tab. 42. f. 7. — Dill. H. 549.  
Marg. ic. 1278. n. 11.
10. Lichen pyxidatus, Endiviae crispae folio, superne cinereus, inferne ex albo rufescens, acetabulis alter alteri usque ad quartum & quintum gradum innascentibus. — Tab. 42. f. 2.
11. Lichen pyxidatus, terrastris, Endiviae crispae folio, superne ex flavo, & glauco subvirescent, inferne albidus, pyxidulis plerumque simplicibus, receptaculis florum rufescentibus. — Tab. 42. f. 3.
12. Lichen pyxidatus minor (Tab. 41. f. 4.) in D. R. H. 549.  
L. fimbriatus f.
13. Lichenoides pyxidatum, tubulosum, marginibus serratis. Dill. Cat. 916.  
Lichen non ramosus, acetabulis fimbriatis. — Michel. Tab. 41. f. 5.
14. Lichen pyxidatus, minimus, foliis tenuiter & eleganter incis, receptaculis florum rufescentibus. — Tab. 41. f. 6.

## Ordo IX.

- I. Lichenes pyxidatis affines, constantes e crustula foliacea, & caulis plerumque ramosis, ad extremitatem, & divaricationem hians, & fere pyxidatis.  
Lichen tubulatus, ramosus, albus, scaber, & elatior, receptaculis florum rufescentibus. — Tab. 42. — Ad putrida Castan. ligna.
2. Lichen ~~pyxidatus~~ tubulatus, minor, albus, ramosus, & scaber, receptaculis florum rufescentibus.
3. Lichen qui lichenoides tubulosum, cinereum, valde crustaceum, ramulis brevibus, & crebris ex acetabulis emascentibus. Dill. Cat. 203.
4. Lichen tubulatus, albus, ut plurimum non ramosus, scaber, receptaculis florum eleganter rufis, crispis, & confertis. In Ericet.
5. Lichen tubulatus, minor, vix semivivum altus, scaber, & albus, extremitatibus couineis. — In Sylvis caduis ad dejectarum Castanearum putrescentia ligna.



## Ordo x.

I. Lichenes pyxidatis affines, & crustula foliacea, & caulibus simplicibus, strigosis, minima, vel vix cavis constantes.

III. Receptacula florum, vel simplicia, vel multifida in Cauliculorum summitate posita.

Lichen minimus, lignis adnascens, foliis crispis, tenuissime divisis, inferne albis, superne & flavo-virescentibus, receptaculis florum rufis. — ubi seq.

2. Lichen minimus, lignis adnascens, foliis eleganter & tenuiter incis, inferne albis, superne & flavo-virescentibus, receptaculis florum cinereis. — Ad Emortua, & Semiputrida Castanearum ligna.

3. Lichen minimus, lignis adnascens, foliis latiusculis, eleganter, tenuiter incis, inferne candidis, superne cinereis, receptaculis florum rufescentibus.

4. Lichen minimus terrestris, foliis perexiguis, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 42. f. 1.

5. Lichen minimus, terrestris, foliis perexiguis, receptaculis florum fufis T. 42. f. 2.

## Ordo XI.

I. Lichenes crustacei, Pulmonarii, coriacei.

III. Receptacula florum (si in hac planta ea vocari licet) in adversa planae parte undique sparsa.

IV. Semina disposita in filamenta multifida, tum in foliorum marginibus, tum per totam supernam eorum superficiem.

Lichen Pulmonarius, Saxatilis, fusco-rufus, receptaculis florum albidis. Tab. 43.

## Ordo XII.

III. Receptacula florum in superna plantarum parte, tum ad latera, tum ad extremitates posita.

IV. Semina ut in ordine antecedenti, sed in peripheria plerumque erumpentia.

Lichen Pulmonarius maximus, & cinereo-rufescens superne, inferne subrufus, margine crispo, & veluti fimbriato, receptaculis florum rubris, vel ferrugineis plano-orbiculatis.

2. Lichen Pulmonarius maximus, & cinereo-rufescens, inferne subrufus, receptaculis florum rubris, plano-orbiculatis.



3. Lichen pulmonarius, maximus, verisimilis, superne e cinereo-virescens, inferne obscurus, receptaculis florum rubris, circinnatis.

4. Lichen pulmonarius major, inferne obscurus, desuper e cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus, primum circinnatis, deinde teretibus. Tab. 44. f. 2.

5. Lichen pulmonarius minor, inferne subobscurus, superne cinereus, receptaculis florum rubris circinnatis.

L. horizontalis. 6. Lichen pulmonarius, minor, inferne obscurus, desuper cinereus, receptaculis florum nigricantibus, circinnatis. — Tab. 44. f. 6. — In querc. laudibus.

7. Lichen (Islandicus) pulmonarius, minor, angustifolius, spinis tenuissimis ad margines ornatus, receptaculis florum transverse oblongis, rubris, vel ex rubro-ferrugineis. — Tab. 44. f. 4. — In alpinis.

8. Lichen pulmonarius, maximus, superne e cinereo-rufescens, inferne subrufus, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. Tab. 44. f. 1.

9. Lichen pulmonarius maximus, cinereus, inferne albus, & niger, reticulatus, receptaculis florum rubris, transverse oblongis.

10. Lichen pulmonarius, maximus, inferne nigricans, superne cinereus, & splendescens, receptaculis florum rubris, transverse oblongis.

11. Lichen pulmonarius major, inferne albidus, desuper cinereus, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis.

12. Lichen pulmonarius, minor minimus, inferne albus, & niger, reticulatus, superne e cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 3.

p. 86. 13. Lichen pulmonarius, minimus, inferne albus & niger, reticulatus, desuper e cinereo-virescens, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 3.

### Ordo XIII.

I. Receptacula florum in inferiorum plantarum parte adita, sed ita sursum reflexa, ut desuper locata esse videantur.

Lichen pulmonarius, major, ex obscuro cinereus, inferne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris, amplioribus, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 1. ad laud. Castan.

2. Lichen pulmonarius, minor, ex obscuro cinereus, inferne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 2. ad querc.



## Ordo XIV.

III. Receptacula florum ad margines plerumque superne plantarum partis.

IV. Semina in parvis globulis digesta, tum per totum marginem, tum undique in eorum superficie secundum lacunarium os nascentia, quemadmodum in portione magis exacta melius apparet.

Lichen arbores, sive Pulmonaria arbores. — In montanis sylv. ad arbores.

2. Lichen arbores, sive Pulmonaria arbores minor & angustifolia. — Tab. 48.  
Ad Fagos, & Abietes familiaris.

## Ordo XV.

III. Receptacula florum in medio superne plantarum partis nascentia.

IV. Semina in filamenta ramosa, aut multifida disposita, quæ filamenta singillatim erumpunt per totam foliorum superficiem, in plantis plerumque feminis, seu non floriferis.

Lich. lobatus

Gmel. Pars. II. p. 1372.

Lichen Pulmonarius Quercu folio, inferne nigricans, superne cinereus, receptaculis florum sordide virescentibus — Tab. 48. — In Caud. & Mal. Bjr. abies.

2. Lichen Pulmonarius Alpinus, inferne nigerrimus, superne pulchre cinereus, receptaculis florum obsolete gilvis. — Ad Cassan. radices.

3. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, tinctorius, tenuiter divisus, inferne nigricans, desuper e sulphureo-cinereus, receptaculis florum amplioribus, fuscis. — Ad Saxa.

p. 87.

4. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, in segmenta latiora divisus, subtus niger, desuper ex obscuro-virescens, receptaculis florum concoloribus. — In Fraxinorum Corticibus.

5. Lichen Pulmonarius Saxi & arboribus adnascens, inferne nigricans, superne obscurus, receptaculis florum concoloribus. — Ad saxa quoque.

6. Lichen Pulmonarius Crustæ modo Saxi adnascens, pullus.

7. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, tenuiter divisus, inferne nigricans, superne obscurus, & verrucis perexiguis undique exasperatus, receptaculis florum concoloribus. — In Sylvestr. Purnor. Caudicibus.

8. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, tenuiter, & eleganter divisus, inferne cirrosus, & anthracinus, desuper obscuro-fuscus, & veluti rugosus, receptaculis florum fuscis. — In Saxorum Supericulis.



# Ordo XVI.

1. Lichenes crustacei, Pulmonarii, Substantia gelatinosa.

Lichen Pulmonarius, membranaceus, gelatinosus, pullus, in segmenta latiora divisus, receptaculis florum exiguis, obscure rubeis, numerosissimis. Ad arbores, & ad Saxa.

2. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassus, atro-virens, receptaculis florum concoloribus, per siccitatem vero fusco-ferrugineis. - Ad Saxa.

3. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassus, ex obscuro-viridians, receptaculis florum concoloribus, per siccitatem vero fusco-ferrugineis, ubique in Saxosis locis.

4. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, crassus, minor, foliis latiusculis digitatis ex obscuro gilvis, receptaculis florum concoloribus, per siccitatem autem fusco-ferrugineis.

5. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassus, minor, foliis latiusculis, digitatis, e griseo-subobscurus, per vetustatem fuscus, & in uiam se colligens, receptaculis florum concoloribus, postea fusco-rubris. - In ambulacris hortorum.

6. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, terrestris, atro-virens, foliis crassius, brevibus, congestis, & nudis, receptaculis florum fulvo-fuscis. ubi p. 88.

7. Lichen Pulmonarius gelatinosus, fuscus, arboribus adnascens, parvus, crassus, & crispus, receptaculis florum. . . . . In Fraxin. Caudicibus.

8. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassus, e griseo-subfuscus, in segmenta latiora divisus, globulis minutissimis plerumque, & undique aspersus, receptaculis florum concoloribus, per vetustatem fusco-rubris. - Cura reliquis.

9. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassior, & mollior, crispus, rugosissimus, e griseo-subfuscus, receptaculis florum. . . . . In Arborum Caudicibus, interdum ad Saxa.

10. Lichen, qui Lichenoides Terrestris, membranaceum, gelatinosum, & fusco-virescens, crispum, & rugosum. Dillen. Cat. Gips. 209.

11. Lichen Pulmonarius gelatinosus, parvus, foliis crassis, cristatis, & pilis sordide virescentibus, receptaculis florum concoloribus. In Parietibus.

12. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, terrestris, membranaceus, atro-virens foliis latiusculis Jacobae Marit. in modum divisus, receptaculis florum fusco-rubris. In Viridariis tum per ambulacra, tum secus aqueductus.



13. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, terrestris, mediae crassitie, atro-virens, foliis carinatis angustioribus & Jacobae Marine in modum divisis, receptaculis florum fusco-rubeis. — ubi antea dictus.

14. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, mediae crassitie, atro-virens, foliis carinatis angustioribus & Jacobae Marine in modum divisis, receptaculis florum fusco-rubeis. — Ad Saxa. flaminae tenues, multifidae, atro-vivantes, scutellis copiosis, ruforubeis.

15. Lichen Pulmonarius gelatinosus, Opuntioides, exiguus, fontanus, griseo-fuscus, segmentis brevioribus, teretiusculis, receptaculis florum...  
..... In crateribus fontium & vinctaria.

16. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, Opuntioides, griseus, parvus, aequatus, segmentis teretibus, acutis. — In Scillieris.

## Ordo XVII.

I. Lichenes Crustacei, Pulmonarii, Coniacei.

IV. Semina in femineis, seu non floriferis plantis ad laciniarum exortum cumulatim aggesta.

Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, maximus, inferne obscurus, de super e glauco-cinereus, receptaculis florum rubris, seminibus nigricantibus. Tab. 46. — Castan. fagorumque Caudicibus adheret, atque latius se diffundit.

Obs. Folium latum, cinereum, laciniatum, laciniis lobatis, subtus pallide fusco-cum.

Pag. 89.

## Ordo XVIII.

IV. Semina in comosa arbuscula disposita, & per totam Plantae superficiem sparsa.

Lich. Pustulatus. Lichen Pulmonarius, saxatilis, inferne reticulatus, & lacunatus, superne cinereus, ac verrucosus, receptaculis florum, & seminibus nigricantibus, & veluti densus. Tab. 47.

## Ordo XIX.

IV. Semina circa foliorum margines crebro nascentia, collecta veluti in corimbos, basi tubulara insidentes.

Lichen Pulmonarius, saxatilis, subtus nigricans, de super olivae conditae colore, receptaculis florum concoloribus. — Tab. 51.



pag. 87. M.

2. Lichen Pulmonarius, subtus nigricans, desuper ex obscuro-fuscus, receptaculis florum concoloribus.

3. Lichen Dioscoridis, & Plinii Secundus, colore flavescente. Col.

Musci Crustæ modo arboribus adnascens, colore flavescente C.B.P. 361.

In arboribus, testis, muris, aliisque consimilibus locis.

## Ordo XX.

IV. Semina subhirsuta in glomerulos veluti distincta atque non modo per totum foliorum spatium, verum etiam in dorso receptaculorum, dissimulata, crebro nascentia.

L. Caperatus. 1. Lichen Pulmonarius, saxis, & arboribus adnascens, major, inferne nigricans, superne sulphureo-cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus sordide, & obsolete viridibus. — Tab. 48. f. 1. — In Petris, & arborum stipitibus.

2. Lichen Pulmonarius, saxis, & arboribus adnascens, medius, inferne nigricans, superne sulphureo-cinereus, receptaculis florum . . . . .

3. Lichen Pulmonarius, medius, arboribus adnascens, inferne ex albo-nufescens, superne cinereus & lacunatus, receptaculis florum fulvo-spadiis. — Frequens potius in arboribus quam in saxis. L. Saxatilis

pag. 90. 4. Lichen Pulmonarius, inferne obscurus, desuper ex glauco-subvirescens, receptaculis florum amplioribus, ac densioribus, atro-fuscis. — Tab. 48. f. 2. In Abietibus.

## Ordo XXI.

Semina subhirsuta, tum per totum plantarum marginem sine ulla intervallo, tum in eorum plano dissimulata, in distinctos veluti glomos aggregeria.

L. Caperatus. 1. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, inferne obscurus, desuper lacunatus, ex glauco, & cinereo-flavescens, receptaculis florum rubris. — Tab. 49. f. 1.

## Ordo XXII.

IV. Semina subhirsuta, tum per totam plantarum peripheriam, tum in earum superficie per reticulatas rimas emergentia.

Lich. Saxatilis. Lichen Pulmonarius, foliis eleganter divisis, inferne nigerrimis, & cirrosis, superne lacunatis, & glauco-cinereis, receptaculis florum fusco-virescentibus. Tab. 49. f. 1.

L. Omphalodes. 2. Lichen Pulmonarius, tinctorius, foliis eleganter, & tenuiter divisis, inferne nigricantibus, & cirrosis, superne purpureis, & lacunatis, receptaculis fl. concoloribus. Tab. 49. f. 2.



## Ordo XXIII.

IV. *Semina subhirsuta circa foliorum margines erumpentia.*

*Lichen Pulmonarius*, crassus, superne & cinereo plumbeus, torosus, ac filamentosus, inferne albus, & villosus, receptaculis florum ex rubro-ferrugineis. — Tab. 43. f. 1.

In *Fagorum*, *abietum*, *Castanearumque* radicibus.

2. *Lichen Pulmonarius minor*, superne cinereus, inferne nigricans, receptaculis florum atro-rubeis, externa parte verrucosis — Tab. 43. f. 3.

Ad *quercus*, *cerros*, *Castaneas*, aliasque similes arbores provenit.

L. *Stellaris* L. 3. *Lichen Pulmonarius*, vulgarissimus, superne albo-cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis, & eleganter divisis, receptaculis florum nigricantibus. — Tab. 43. f. 2. — Ad arbores ubique oritur.

4. *Lichen Pulmonarius*, *Alpinus*, foliis angustissimis, eleganter divisis, superne & cinereo-virescentibus, inferne nigricantibus, & verrucosis, receptaculis florum fuscis, coronatis, seu foliosis — Tab. 43. f. 4. ad *fagos*.

6. *Lichen Pulmonarius*, aureus, vix conspicuus, tenuissime divisis, receptaculis florum concoloribus. — Tab. 43. f. 5. — In *Arborum*, & *Fructuum* stipitibus ubique frequens.

## Ordo XXIV.

III. *Receptacula florum Pedunculo veluti insidentia.*

IV. *Semina subhirsuta, circa margines supremæ foliorum partis, & in dorso receptaculorum florum & cutis laceratione veluti nascentia.*

*Lichen Pulmonarius*, crispus, inferne nigerrimus, & glaber, superne cinereus, receptaculis florum subobscuris. — Tab. 50. f. 1. — In *arb. laud.*

2. *Lichen Pulmonarius latifolius*, inferne albidus, superne cinereus, receptaculis florum concoloribus. — Tab. 50. f. 2. — *Arboreus*.

p. 92. 3. *Lichen Pulmonarius minor*, cinereus, flabelliformis, limbo superna parte repando. — In *abietum* dorso.

## Ordo XXV.

I. *Lichenes Crustacei, Pulmonarii, coriacei, tubulati, ramulorum apicibus in prima specie Clausis, in secunda vero laxis.*

IV. *Semina subhirsuta nascentia & solutione cutis, vel ab externis, vel internis ramulorum extremitatibus.*



L. Phipsoies L. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, desuper cinereus, subtus anthracinus, segmentis teretibus, tubulosis, corniculatis, ad extremitatem clausis, receptaculis florum subrubentibus. — Tab. 50. f. 1. — In Abietibus.

2. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, desuper cinereus, subtus anthracinus, segmentis teretibus, tubulosis, corniculatis, crebre divisis, ad extremitates hiantibus, & veluti cristatis, receptaculis florum rubris. — Tab. 50. f. 2.

## Ordo XXVI.

I. Lichenes Crustacei, Pulmonarii, coriacei, non tubulati.

IV. Semina subhirsuta, circa margines inferioris foliorum partis, & solutione cutis veluti enascentia.

Lichen Pulmonarius, cristatus, arboribus adnascens, exiguus, inferne albus, desuper cinereus, receptaculis florum subobscuris. Tab. 50. f. 1. In Castan. Cort.

2. Lichen Pulmonarius, cristatus, arboribus adnascens, exiguus, angustioribus segmentis, receptaculis florum obscurioribus. — Tab. 50. f. 2.

3. Lichen Pulmonarius, saxis, & arboribus adnascens, exiguus inferne albus, superne cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus.

## p. 93. Mich. Ordo XXVII.

I. Lichenes Crustacei, Pulmonarii, coriacei, ad margines radicati, seu barbati.

IV. Semina subhirsuta posita in scrobiculis a disjuncto, & laxo foliorum apice, & margine efformatis, quemadmodum in porri one hujus planta per lentem visa, & radicibus destituta melius apparet.

Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, exiguus, angustifolius, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum obscuris. Tab. 50. In Abietum Corticibus.

## Ordo XXVIII.

IV. Semina subhirsuta, recondita, in tumidis receptaculis, vel ab inferna, vel a superna foliorum parte efformatis.

L. Ciliaris L. Lichen Pulmonarius exiguus, saxis, & arboribus innascens, ad margines radicatus, inferne albus, desuper subcinereus, receptaculis florum nigricantibus. — Tab. 50.

2. Lichen cinereus, arboreus, marginibus pilosis, major. Bot. Par. 115. n. 5. Ad arbores copiosus.



p. 93. Mich.

13. Lichen Pulmonarius, minor, ad margines radicans, inferne albus, superne cinereus, receptaculis florum nigricantibus. — In fruticibus ubiq.

## Ordo XXIX.

IV. Semina subhirsuta, adita in scrobiculis per margines, & superficiem foliorum.

Lichen Pulmonarius minimus, arboribus innascens, ad margines radicans, superne cinereo-fuscus, inferne anthracinus, receptaculis florum fuscis. Tab. 51. — Ad Populos, ad Ulmos, &c.

2. Lichen Pulmonarius, minimus, arboribus innascens, ad margines radicans, desuper cinereus, subtus albus, receptaculis florum fuscis. C. prima species.

pag. 94.

## Ordo XXX.

I. Lichenes crustacei, pulmonarii, arctissime adnascens, persiccitate rimosi, ex substantia plerumque farinacea, & ex loco, in quo proveniunt, nisi in fragmenta separabiles.

IV. Semina subhirsuta, vel per totam superficiem, vel in peculiaribus locis in plantis, ut plurimum non floriferis, reperiuntur.

L. fragilis L.

Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, major, foliis crassis, subrotundis, & cinereo-virescentibus, inferne albis, receptaculis florum subrufis. Tab. 51. f. 1.

2. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis brevibus, inferne albis, desuper & cinereo-virescentibus, receptaculis florum rufis. — Tab. 51. f. 2.

3. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis brevibus, sordide virescentibus, ad fulvum colorem tendentibus, receptaculis florum nigricantibus.

4. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis exiguis, multum lacinatis, viridantibus, receptaculis florum nigris.

5. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis exiguis, inferne albis, superne aurantiacis, receptaculis florum nigris.

6. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, glauco-virescens, angustioribus segmentis, receptaculis florum griseis. — Tab. 51. f. 4.

Tectis, Parietibus, & saxis frequens



7. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, ex albo-subcinereus, foliis pul-  
-posis, pulverulentis, receptaculis florum griseo-rufis. — Tab. 51. f. 5. — In  
Saxis, & muris obvius.
8. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, foliis pulposis, pulverulentis,  
Sulphureo-virescentibus, receptaculis florum griseo-rufis. — Var. præcedens.
9. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, albus, foliis pulposis, ad  
extremitatem magis complanatis, receptaculis florum cinereis. T. 51. f. 3.
10. Lichen Pulmonarius, ~~Saxatilis~~ arboribus adnascens, farinaceus,  
desuper e cinereo-albicans, inferne ex albo-rufescens, foliis pulposis,  
receptaculis florum nigris.
11. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, cinereus, crispus, recep-  
-taculis florum . . . . . In Maris, & tectis admodum familiaris.
12. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, cinereo-fuscus, foliis  
pulposis, angustioribus, receptaculis florum fuscis.
13. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, tenuiter divisus, su-  
-perne sulphureus, inferne nigricans, per siccitatem in porriunculas  
perexiguas magis se dividens, receptaculis florum griseo-rufis.
- p. 95. 14. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, coloris aurantiaci, fo-  
-liis magis appressis, receptaculis florum concoloribus.
15. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, luteus, vulgatissimus,  
foliis pulposis, receptaculis florum concoloribus. — In muris & tectis obvius.
16. Lichen Pulmonarius Saxatilis, farinaceus, sulphureus, & mollior,  
receptaculis florum ex rubro aureis.
17. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, ex fusco-nigricans,  
foliis angustissimis, & creberrimis, receptaculis florum ferè nigris. T. 51. f. 6.

## Ordo XXXI.

I. Lichenes crustacei, Pulmonarii, coriacei.

III. Receptacula florum in substantia plantæ affixa, atque recondita, &  
minime apparentia, nisi laceratione cutis, quemadmodum in folio per  
microscopium valde aucto loculenter apparet. — IV. Semina . . . . .

L. Saxatilis  
Lin.

Lichen Pulmonarius, Alpinus, terrestris, glauco-virescens, receptaculis  
florum fuscis. — Tab. 52.



## Ordo XXXII.

- I. Lichenes Crustacei, non Pulmonarii, seu non foliosi, nec in laciniis secti, Substantia ut plurimum farinacea.  
 III. Receptacula florum in interna verrucarum parte adscita, & solum per rimam apparentia, rarissima extra eadem verrucas prorsus exeuntia.

IV. Semina . . . . .

L. Sinuatus. L. Lichen Crustaceus, verrucosus, Alpinus, arboribus adnascens, cinereus, receptaculis florum rufescentibus. — Tab. 52. — Ad fagos, & abietes.

## Ordo XXXIII.

- I. Lichenes Crustacei, non Pulmonarii, nonnihil sinuati, Substantia farinacea.  
 III. Receptacula florum in superficie plantae locata.  
 IV. Semina . . . . .

Lichen Crustaceus, Sinuatus, farinaceus, verrucosus, cinereus, Musco innascens, receptaculis florum virgicantibus. — T. 52.

p. 96.

## Ordo XXXIV.

- I. Lichenes Crustacei, non pulmonarii, indivisi scilicet, neque laciniati, neque sinuati, Substantia farinacea, vel ex tartaro.  
 IV. Semina subhirsuta in plantis ut plurimum non floriferis, seu femineis, vel per totam earum superficiem, vel in peculiaribus scrobiculis enascentia.

- L. Tartareus. L. Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, candidus, omnium crassissimus, receptaculis florum virgicantibus. — Tab. 52.  
 2. Lichen Crustaceus, farinaceus arboribus adnascens, verrucosus, candidus, receptaculis florum rufescentibus. — Ad Cerasa.  
 3. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, candidus, receptaculis florum concoloribus. — (Lich. Fagineus)  
 4. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, sulphureus, receptaculis florum fuscis. — In Quercuum Caudicibus.  
 5. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, ex albo subvirescens, receptaculis florum eleganter rufis, extrinsecus veluti striatis. — In Abietum Stipitibus.  
 6. Lichen Crustaceus, saxatilis, verrucosus, albus, receptaculis florum concoloribus, & copiosisioribus.



7. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, cinereus, receptaculis florum nigris, crispis, & copiosioribus.
8. Lichen crustaceus, Saxatilis, & arboraeus, verrucosus, cinereus, receptaculis florum nigricantibus.
9. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, obscurus, receptaculis florum nigris, non tumentibus.
10. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, saturo-cinereus, receptaculis florum amplioribus, nigris, non tumentibus.
11. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, subobscurus, receptaculis florum nigris, amplioribus, & tumentibus.
12. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, subobscurus, receptaculis florum nigris, minoribus, & tumentibus.
13. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, sulphureo-cinereus, receptaculis florum nonnihil tumentibus, primum nigris, deinde rufescentibus.
14. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, cinereus, receptaculis florum nigris, & nonnihil tumentibus. — Var. praecedentis.
- p. 97. 15. Lichen crustaceus, Saxatilis, viridis, non verrucosus, receptaculis florum ferrugineis. — In muris & ad Saxa humida.
16. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, sulphureus, receptaculis florum nigricantibus, per oras tenuissime striatis.
17. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, albus, receptaculis florum nigricantibus, per oras tenuissime striatis. In aquaductis.
18. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, alpinus, albus, mollissimus, receptaculis florum nigricantibus, majoribus, per oras tenuissime striatis. In rupibus.
19. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, luteus, receptaculis florum nigris. — In collibus ad Saxa copiosus.
20. Lichen crustaceus, Saxatilis, recens luteus, per siccitatem farcus, receptaculis florum semper nigris. — In Saxis subhumidis.
21. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, ex albo subcinereus, receptaculis florum exguis, concavis, & nigricantibus, ac in substantia planta veluti infixis. — In tectorum tegulis, & ad Saxa ubique.



22. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, cinereus, receptaculis florum exiguis, concavis, & nigricantibus, ac in substantia plantae veluti infixis. — *Proced. Variet.*

23. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, non verrucosus, albus, receptaculis florum exiguis, nigricantibus, concavis, & crispis, ac in substantia plantae veluti infixis.

24. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, non verrucosus, ex albo-subcinereus, receptaculis florum atro-rufis, ad ferrugineum tendentibus.

25. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, crusta cinerea, tenui, ex albo subcinerea, receptaculis florum atro-rufis, ad ferrugineum tendentibus. *Ad ficus.*

26. Lichen crustaceus, saxatilis, glaucus, tenuissimus, receptaculis florum exiguis, carneis.

27. Lichen crustaceus *Alpinus*, arboribus adnascens, luteus, receptaculis florum aureis. — *On Cassan. cortic. necnon in Abietibus.*

28. Lichen crustaceus, saxatilis, crusta tenuiori, lutea, receptaculis florum saturato-aureis.

Lichen subfuscus  
Linn.

29. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex cinereo-albicans, receptaculis florum crebris, subfuscis, limbo albo, crenato, cinetis.

30. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex albo-subcinereus, verrucosus, receptaculis florum crebris, subfuscis, limbo albo, non crenato, cinetis.

31. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex albo-subcinereus, receptaculis florum subfuscis, minus crebris.

p. 98.

32. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, griseus, in transversalem lineam longe se diffundens, receptaculis florum copiosioribus, ac concoloribus. *Ad fagos.*

33. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex albo subcinereus, receptaculis florum aureis, nudis. — *Ad Fraxinos.*

34. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, griseus in longam & transversalem lineam, veluti excurrans, receptaculis florum tuberculosis, nigris & tumulentis. — *Ad fagos, & Abietes.*

35. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, crusta tenuiori, cinereo-virescens, receptaculis florum nigris, & tumulentis.

36. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, pulverulentus, luteus, receptaculis florum rufis, & tumulentis.

37. Lichen crustaceus, lignis adnascens, pulverulentus, sulphureus, receptaculis florum nigris, tumidis. — *Ad columnas ligneas.*



*L. Elveloides* Web. 38. Lichen crustaceus, Alpinus, lignis putridis adnascens, glaucus, receptaculis florum carneis, & tumulentibus. — In dejectis, atque decorticatis Abietum truncis.

39. Lichen crustaceus, Saxatilis cinereus, crusta tenuissima, receptaculis florum luteis, exiguis.

40. Lichen crustaceus, Polline tenuissimo eleganter virenti veluti conflatus, receptaculis florum aureis.

*L. Muscorum* Web. 41. Lichen crustaceus, Musco plerumque innascens, polline cinereo veluti conflatus, receptaculis florum nigris.

42. Lichen crustaceus, Saxis humo adnascens, polline cinereo veluti conflatus, receptaculis florum ex rufo-fulvis.

43. Lichen crustaceus, Saxis, & arboribus adnascens, gelatinosus, & verrucosus, niger, receptaculis florum concoloribus. — In antiquis parietibus — aliquando ad fagos.

44. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, rugosus, ex cinereo-virescens, receptaculis florum nigris, exiguis, tumidis. — Ad Pinos.

45. Lichen crustaceus, tuberculatus, arboribus adnascens, tenuissimus, ex cinereo-virescens, semina copiosissima lutea fundens, receptaculis florum concoloribus.

46. Lichen crustaceus, tuberculatus, arboribus adnascens, ex cinereo-virescens, semina lutea copiosissima fundens, receptaculis florum ex rufo-fulvis.

47. Lichen crustaceus, Saxatilis, Saturo-virens, receptaculis florum rufis. — In Edificiis antiquis.

48. Lichen crustaceus, Saxatilis, lacte virens, receptaculis florum fusco-cinereis.

49. Lichen crustaceus, Saxatilis, ex verrucis minutissimis, multifidis, atque viridibus veluti conflatus, seminibus luteis, receptaculis florum concoloribus. — ad vetustos muros.

p. 99.

50. Lichen crustaceus, Saxatilis, verrucosus, & cinereo-virescens, verrucis perexiguis, semina lutea ad latera fundentibus, receptaculis florum concoloribus. — In Muris Aqueductuum.

51. Lichen crustaceus, Saxatilis, tuberculatus, tuberculis minoribus, non cavis, viridibus, sed cum arrescunt farina veluti aspersis, receptaculis florum nigris. — In Antig. Murorum Cavernis & commissis cum sequenti oritur.



§2. Lichen Crustaceus, saxatilis, tuberculatus, tuberculis minoribus non  
cavis, viridibus, majoribus, cavis, vesicam representantibus, viridibus, sed cum  
arescunt, farina veluti asperis, receptaculis florum nigris.

§3. Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, ex albo subcinereus, recep-  
taculis florum nigris, exiguis.

Lich. fagineus. L.

§4. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, albus, superficie  
in acetabulis pulverulentis veluti efflorescente. — Tab. 83. f. 1.

Lichen Byssinus

Scopoli

usque ad n<sup>o</sup> 73.

§5. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, subcinereus, su-  
perficie in acetabulis minoribus, pulverulentis veluti efflorescente. — Tab. 83. f. 1.

§6. Lichen Crustaceus saxatilis, farinaceus, albus, globulis minutissimis  
undique refertus.

§7. Lichen Crustaceus saxatilis, farinaceus, verrucosus, cinereus.  
In muris.

§8. Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, rimosus, tenui sub-  
stantia, ex albo-rufescens.

§9. Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, tenui substantia,  
dilute luteus, & velut sulphureus.

§10. Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, & granulatus,  
luteus. — Tab. 83. f. 3.

§11. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, &  
non rimosus, luteus. — In Castanearum & Abietum corticibus.

§12. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, neque rimosus, neque verru-  
cosus, candidus, pulvisculo concolore undique conspersus. — Tab. 83. f. 4.

§13. Lichen Crustaceus, saxatilis, neque rimosus, neque verrucosus, &  
sulphureo virascente, pulvisculo minutissimo concolore undique consper-  
sus. —

p. 100

§14. Lichen Crustaceus, saxatilis, tenuiori substantia, neque rimosus,  
neque verrucosus, pulverulentus, cinerini coloris.

§15. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, neque rimosus, neque  
verrucosus, totus pulverulentus, griseus — In Castanearum corticibus.

§16. Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, ex albo subcinereus,  
seminibus Cereini coloris undique refertus.



67. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, mollissimus, cinereo-faucus, seminibus concoloribus repletus.

68. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, nonnihil sinuatus, ex albo-subcinereus, pulverulentus.

69. Lichen crustaceus arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, aureus, colore elegantissimo, & immutabili. Ad Pinos. Abies, & columnas ligneas.

70. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, pallide luteus, seu ochroleucus. — Ad fraxinos, castaneasque.

71. Lichen crustaceus, arboribus, & lignis adnascens, tenuissimus, pulverulentus, spadiceus. — Super vas. arbor, caudic. & ligna.

72. Lichen crustaceus arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, griseus. — ubi n. 17.

73. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, ruber. — Ad Populos.

### Ordo XXXV.

III. Receptacula florum rotunda, interna parte cava, & basi superposita.

IV. Semina

Lich. Ericetorum

Lichen crustaceus, terrestris, crusta granulosa, ex albo-subcinerea receptaculis florum rotundis, carneis, pediculo insidentibus. — Tab. 89.

2. Lichen crustaceus, terrestris, crusta granulosa, ex albo-subcinerea receptaculis florum rotundis, fuscis, pediculo insidentibus. (fungilli fuscii, stipitibus albis).

Pag. 201.

### Ordo XXXVI.

I. Lichenes crustacei, pulmonarii, substantia coriacea.

II. Flores commisti cum gelatinosa massa, comprehensa in cavitare receptaculi sphaerici.

III. Receptacula florum in substantia foliorum sunt inserta, & in eorum superficie vix apparent.

IV. Semina quae in illis plantis observari nobis contigit, ad fol. marg. occurrunt.

L. Deustus L. Lichen pulmonarius, saxatilis, & cinereo fuscus, minimus. — T. 54. f. 1.

2. Lichen pulmonarius saxatilis, minimus fulvus, foliis pulposis.

3. Lichen pulmonarius, saxatilis, sordide virescens, foliis minimis. T. 54. f. 2.  
In arboribus, & vetustis muris.



4. Lichen Pulmonarius terrestris elyptatus, minimus, & indivisus, virescens.  
Tab. 54. f. 3.

5. Lichen Pulmonarius Saxatilis, viridis, foliis vix conspicuis, squamatis  
sibi incumbantibus, receptaculis florum nigris. — Tab. 54. f. 4. — In Panier. ver.

## Ordo XXXVII.

I. Lichenes crustacei, non Pulmonarii, seu indivisi, farinacea substantia, & ex tartaro.

II. Flores commixti ut plurimum cum massa gelatinosa, comprehensa in cavitate receptaculi sphaerici, pyriformis, transverse oblongi simplices, vel transverse oblongi multifidi.

III. Receptacula vel in plantarum superficie, vel in eorum substantia.

IV. Semina . . . . .

2. Lichen crustaceus, tartarius, lignis adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum pyramidalis, & verrucosis.

1. Lichen crustaceus, tartarius, niger, & veluti deustus, receptaculis florum crebris, rotundis. — In exiccatis, & semiputr. radic. abietum.

pp. 102. 3. Lichen crustaceus, tartarius, in arborum cavernulis proveniens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum pyriformibus, non verrucosis. — T. 54. f. 1.

4. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum exiguis, inaequaliformibus. — Tab. 54. f. 4. — In ulm. caesus.

5. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum rotundis, per siccitatem nonnihil appressis, & umbilicatis. — In arb. caesus.

6. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum transverse oblongis, & intortis. — In limbo arb. caesus.

7. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum transverse oblongis, & quasi reniformibus, non intortis, brevibus. — Tab. 54. f. 2. — In Nivum cavernulis late se diffundens.

8. Lichen crustaceus, tartarius, corticibus arborum adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum transverse oblongis, compressis.

9. Lichen crustaceus, tartarius, corticibus arborum adnascens, cinereus, receptaculis florum sub cute erumpentibus, nigricantibus, transverse oblongis, varie divaricatis, & compressis.

10. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, ex spadicibus fulvus, receptaculis florum sub cute erumpentibus, nigricantibus, transverse oblongis, varie divaricatis & compressis. — In cort. arb. & praecipue ad Coryloz. seq.

11. Lich. crustac. tartarius, arb. adnasc. ex spad. fulvus, receptaculis fl. in superficie nascentibus, nigris, transverse oblongis, ac varie divaricatis & compressis. T. 56. f. 3.

Lich. scriptus 2.



12. Lichen crustaceus, farinaceus, saxatilis, ex albo-roseus, receptaculis florum nigris, transverse oblongis, ramosis, & non ramosis.
13. Lichen crustaceus, tartareus, arboribus innascens, sordide cinereus, receptaculis florum nigris, & rotundis. — In Aceribus & fagorum stipitibus.
14. Lichen crustaceus, tartareus, arboribus adnascens, olivaceus, receptaculis florum nigris, perexiguus. — Tab. 24. f. 9. — Ad Corylos.
15. Lichen crustaceus, farinaceus, arboribus adnascens, ex albo-nufescens, receptaculis florum nigris, perexiguus. — Tab. 24. f. 6.
16. Lichen crustaceus, farinaceus, arboribus adnascens, albus, receptaculis florum rotundis, nigris, & inter se longe distantibus. — Tab. 24. f. 3.
17. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, Alpinus, aureus, & crispus, receptaculis florum rotundis, nigris.
18. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, Alpinus, ex cinereo albus, & crispus, receptaculis florum rotundis, nigris.
19. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, cinereus, receptaculis florum nigris, perexiguus.
20. Lichen crustaceus, saxatilis, minimus, valde rimosus, rimis, & veluti tessellatus, ex cinereo albicans, vulgatissimus, receptaculis florum nigris. T. 24. f. 7. — In Umbriticibus, & tectorum tegulis, necnon ad saxa ubique.
21. Lichen crustaceus, saxatilis, minimus, valde rimosus, rimis, & inferiori parte pallus, densus dum recens est, lutes-viridis, per siccitatem fuscus, receptaculis florum nigris. — Tab. 24. f. 8. — In vetustis parietibus.
22. Lichen crustaceus, verrucosus, albus, in arborum corticibus in transversalem lineam veluti excurrent, receptaculis florum in singulis verrucis pluribus.
23. Lichen crustaceus, saxatilis, verrucosus, pallidus, receptaculis florum concoloribus, & basi quadam superpositis, priusquam perbelle representantibus.

## Ordo XXXVIII.

- I. Lichenes fruticosi non tubulati.
  - III. Receptacula florum ut in ordine antecedente, sed in cauliculorum summitate locata.
  - IV. Semina . . . . .
- Lichen fruticosus, coralloides, non tubulosus, cinereus, ramosissimus, receptaculis florum sphaericis, concoloribus. — Tab. 39. f. 6. — Apud fagos.
2. Lichen saxatilis Maritimus, Muscosus, minimus, nigerrimus.

Lichen dicitur asanandis Lichenibus, seu Impetiginibus, sive quod eas  
ut plurimum referat.



*Musci et Michelio descripti,  
qui in Flora Pedemontana memorati non sunt.*

#109.  
Michel.

1. *Muscus medius, foliis juniperinis, acutissimis, non serratis, capitulo tetragono, calyptra tomentosa, rufa.*
2. *Muscus medius foliis juniperinis, glaucis non serratis, in longum & canescentem pilum desinentibus, capitulo tetragono, calyptra tomentosa, rubra.*
3. *Muscus Major, Alpinus, foliis juniperinis tenuissime serratis, capitulo longiori, tereti, calyptra tomentosa.*
4. *Muscus Major, Alpinus, foliis juniperinis <sup>tenuissime serratis</sup>, capitulo longiori, tereti, calyptra tomentosa brevissima.*
5. *Muscus medius, Alpinus, ramosus, foliis juniperinis tenuissime denticulatis, expansis, & retro-reflexis, capitulo longo tereti, calyptra tomentosa, flavascente, longa.*
6. *Muscus medius, ramosus, foliis juniperinis, tenuissime serratis, expansis, & retro reflexis, capitulo tereti, brevissimo, calyptra tomentosa, candidante longa.*
7. *Muscus medius, foliis juniperinis, minoribus, subrectis, brevibus, tenuissime serratis, capitulo longiori, tereti, pediculo brevi, calyptra tomentosa, longa, candidante.*
8. *Muscus medius, foliis juniperinis, minoribus, subrectis, tenuissime serratis, capitulo tereti, in procallo pediculo, calyptra brevi, tomentosa, candidante.*
9. *Muscus minor, foliis juniperinis, minoribus, subrectis, minus acutis, tenuissime denticulatis, capitulo tereti, pediculo brevi, calyptra tomentosa, candidante.*
10. *Muscus minimus, foliis juniperinis, tenuissime serratis, minus acutis, capitulo exiguo, turbinato, calyptra villosa, albicante.*
11. *Muscus minor, foliis juniperinis, minus acutis, non serratis, capitulo rotundo, calyptra tomentosa, albicante.*
12. *Muscus minimus, foliis juniperinis, minus acutis, non serratis, capitulo rotundo, calyptra tomentosa, alba.*
13. *Muscus nanus, tuberosa radice, foliis juniperinis tenuissime serratis, capitulo magno, ovato, ventricoso, calyptra tomentosa. D. Montius.*



14. *Muscus minor, & minus ramosus, foliis acutis, capitulis brevibus, nutantibus, pediculis longiusculis insidentibus, Calyptra striata subhirsuta, conoidea, fusca.*

15. *Muscus minor, ramosus, foliis acutioribus, magis expansis, capitulis pluribus caulibus adherentibus, quasi sine pediculis, Calyptra conoidea, striata, subhirsuta.*

16. *Muscus Stellatus, Alpinus, minimus, foliis Serpilli non serratis, Capitulo tenuiori, corniculato, corona non dehiscente, quatuor tantum radiis composita, operculo brevi, pyramidato, calyptra conoidea, striata, infra aperta, atque fimbriata, vel lacera. Huic propter radiorum corollae quaternum numerum in tota Muscorum classe nullus datur Supper, ideoque ab omnibus facile distinguitur.*

p. 110  
17. *Muscus minor, foliis latiusculis, acutioribus, capitulis oblongis, rectis, tenuioribus, calyptra longa, conoidea, nitida, infra aperta, & coronata.*

18. *Muscus Stellatus, Serpilli folio, minor, foliis ex medio ad summum tenuissime denticulatis, capitulo singulari, nutante.*

19. *Muscus Stellatus, Polycephalus, foliis subrotundis, tenuissime serratis, costa in aculeum veluti producta, capitulis subrotundis, nutantibus.*

20. *Muscus Stellatus, parvus, foliis Myrti, tenuissime serratis, capitulo crassiore, & rotundiore, cernuo, corolla elegantissima.*

21. *Muscus Stellatus, foliis subrotundis, in peripheria neque serratis, neque nervo rubro cinctis, Capitulis. . . .*

22. *Muscus Stellatus, parvus, foliis latis, subrotundis, & undulatis, Capitulo crassiori, brevi, nutante.*

23. *Muscus Alpinus, palustris, Surculis longioribus, simplicibus, habitioribus, foliis latis, acutis, non multum expansis, ex cochlearis instar excavatis, Capitulis cylindraceis, nutantibus, in proaltis pediculis.*

24. *Muscus foliis congestis, latiusculis, acutis, in pilum brevem desinentibus, Capitulis brevibus, Pyri inversiformibus, nutantibus.*

25. *Muscus Alpinus, minor, foliis angustis, acutis, longioribus, Capitulis cylindraceis, nutantibus.*

26. *Muscus palustris, foliis congestis, pyramidalis, acutis, in pilum non, vel vix desinentibus, Capitulo tenuiore, nutante, operculo mammoso.*



27. *Muscus alpinus*, minor, foliis angustis, acutis, capitulis cylindraceis, longioribus & tenuioribus, nutantibus.
28. *Muscus fontanus*, uncialis, foliis longis, angustis, juniperinis, cauliculo rubente, capitulo ovato, nutante.
29. *Muscus minor*, flavescens, in humidis proveniens, foliis capillatam tenuitatem praesefarentibus, per caulem brevibus, & alernis, in summo vero crebris, & strallatum dispositis, capitulis Pyri inversiformibus, nutantibus.
30. *Muscus saxatilis minimus*, caespitosus, non lanuginosus, foliis angustis sensim in acutum productis, & retro nihil reflexis, circa fastigium albis, & fave crystallinis, capitulis ovatis, nutantibus, pediculo bilineari insidentibus, operculo in angustum, rectumque, & brevem mucronem attenuato.
31. *Muscus saxatilis minimus*, caespitosus, foliis in pilum desinentibus, capitulis sphaericis, nutantibus, pediculo bilineari insidentibus, operculo in angustum, rectumque, & longum mucronem prolongato.
32. *Muscus caespitosus*, minor, foliis brevibus, cucullatis, congestis, in longum, & canescentem pilum desinentibus, capitulis ovatis, reflexis, operculo in angustum, longumque mucronem procurrente.
33. *Muscus minor*, foliis latiusculis, expansis, acutis, capitulis Pyri inversiformibus, rectis, brevioribus, tantisper incurvatis, operculo mammoso.
34. *Muscus minor*, foliis latiusculis, capitulis Pyri inversiformibus, longioribus, & tenuioribus, erectis, parum incurvis, operculo mammoso.
35. *Muscus minimus*, foliis latiusculis, capitulis Pyri inversiformibus, saturate rubris, operculo mammoso.
36. *Muscus minimus*, caespitosus, foliis latiusculis, acutis, capitulis erectis Pyri inversiformibus, inter arescendum secundum longitudinem striatis, operculo longo, obliquo.
37. *Muscus minimus*, in humidis, & aquosis arborum cavernis nascens, foliis latiusculis, acutis, atro-virentibus, costa purpurea, capitulis erectis, Pyri inversiformibus, inter arescendum secundum longitudinem striatis, operculo longo, obliquo.



38. *Muscus Stellatus, palustris, Alpinus, major, viticulis longioribus, & habitioribus, foliis acutissimis, hamatis, unam partem tantum spectantibus, capitulo subrotundo, crassiore, eadem parte respiciente, pro alto pediculo insidente.* — Tab. 59. f. 4.
39. *Muscus Stellatus, palustris, foliis acutis, subrectis, viticulis curtis, tenuioribus, capitulis subrotundis, brevibus, unam partem spectantibus, operculo inammoso.*
40. *Muscus Alpinus, major, ramosus, foliis longis, tenuissimis, & angustissime denticulatis, capitulis sphaericis, per caulem sparsis, & plerumque ab eodem exorta geminis, breviori pediculo fulcris.*
41. *Muscus Alpinus, medius, foliis tenuissimis, & angustissime denticulatis, capitulis subrotundis, unam partem spectantibus.*
42. *Muscus minimus, foliis latiusculis, acutis, in longiusculum & tenuissimum apicem, tanquam pilum attenuatis, capitulis sphaericis, crassioribus, pediculo orbatis.*
43. *Muscus Alpinus, acutis, foliis latiusculis, congestis, trifidis, in tex pilas (ex quibus medius longior) desinentibus, fructu magno, pyramidato, & non-nihil in nervo, corolla non fimbriata, operculo, & calyptra conoidea.*
44. *Muscus minor, foliis longioribus, crispis, tenuissime serratis, capitulo longo, falcato.*
45. *Muscus ramosus, elatior, foliis latiusculis, obtusis, expansis, & retro nonnihil reflexis, cum oris subtus repandis, costa rubente, atque in pilum album aristae more dentatam desinente, capitulis longioribus, corniculatis.*
46. *Muscus ramosus, minor foliis latiusculis, obtusis, expansis, & retro nonnihil reflexis, cum oris subtus repandis, costa rubente, atque in lineam pilum desinente, capitulis longioribus corniculatis.*
47. *Muscus ramosus, minor, foliis latiusculis, retusis, cum oris subtus repandis, costa in cuspidem vix visibilem desinentem, capitulis corniculatis.*
48. *Muscus ramosus, minor, foliis latiusculis, obtusis, expansis, & retro reflexis, cum oris subtus repandis, costa in cuspidem sextam lineam partem longam exsertita, capitulis corniculatis, operculo in mucronem longius producto, calyptra brevi, subfusca veluti producta, capitulis longioribus, corniculatis.*
49. *Muscus minor, foliis angustis, undulatis, & veluti crispis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, quorum costa in cuspidem sextam lineam partem longam exsertita, capitulis corniculatis, operculo in mucronem longius producto, calyptra brevi, subfusca.*



50. *Muscus minor, vernus, foliis longis, crispis, & pellucidis nonnihil intortis, ac retro reflexis, paullo ultra indurata sua, sensim in acutum productis, ac deinde in aculeum veluti prolongatis, capitulis corniculatis, operculo, & calyptra brevibus.*

51. *Muscus saxatilis, cespitosus, minor, glaucus, & veluti argenteus, foliis congestis, crassis, exiguis, obtuse mucronatis, superne planis, inferne hinc inde ad costam duntaxat aliquantisper sulcatis, in pilum duplo, vel triplo longiorem desinentibus, capitulis corniculatis, corolla brevi, operculo productiore.*

52. *Muscus minimus, quatuor lineas altus, foliis latiusculis, brevibus, ac retusis, in pilum perbreve desinentibus, capitulis corniculatis.*

53. *Muscus minor, foliis latiusculis, circa medium paululum dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in brevissimam cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis longioribus, corniculatis, per siccatem simul cum pediculis atris.*

54. *Muscus minor, foliis latiusculis, brevibus, subrotundis, capitulis corniculatis, operculo in longiusculum, & curvulum mucronem attenuato.*

55. *Muscus minor, foliis latiusculis, circa medium paululum dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, & in cuspidem vix perceptibilem, tanquam pilum terminatis, capitulis longioribus, corniculatis.*

p. 112.

56. *Muscus minor, foliis latiusculis, brevibus, circa medium dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in perbreve, & vix visibilem cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis corniculatis, per maturitatem simul cum pediculis aureis.*

57. *Muscus minimus, tertiam unciæ partem altus, foliis latiusculis, brevibus, circa medium dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in perbreve cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis ovatis, fuscis, corolla non expansa, pyramidata.*

58. *Muscus minimus, tertiam unciæ partem altus, foliis latiusculis, brevibus, circa medium dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in perbreve, & vix conspicuam cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis ovatis, operculo brevi, instructis.*

59. *Muscus minimus, semiuncialis, & forte annuus, foliis latiusculis circa medium, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, costa in brevissimum, tenuissimumque <sup>veluti</sup> pilum prolongata, capitulis ovatis operculo statim brevior, & curvulum mucronem coarctato.*



60. *Muscus minimus*, tres lineas altus, foliis latiusculis, non expansis, concavis, in cuspidem longiusculam, tamquam aristam prolongatis, Capitulo non coronato, brevi, fusco, operculo longiore, sensim in acutum fastigiato.

61. *Muscus minimus*, tres lineas altus, foliis latiusculis, brevissimis, concavis, ac congestis, in pilum longiusculum desinentibus, capitulo ovato non coronato, operculo statim in brevius atque incurvum corniculum coarctato.

62. *Muscus minimus*, tres lineas vix altus, & forte annuus, foliis latiusculis, acutis, in pilum perbreve desinentibus, capitulis ovatis, fuscis, operculo brevissimo, pyramidato.

63. *Muscus minimus* quatuor lineas altus, pallide vivens, foliis longis, angustis, sensim in acutum <sup>non</sup> productis, capitulis longiusculis, non coronatis, fuscis, operculo in longum, & angustum mucronem sursum exsertum coarctato.

64. *Muscus minimus* quatuor lineas altus, pallide vivens, foliis longis, angustis, sensim in acutum productis, quod per siccitatem crinidum retortorum instar crispantur, capitulis ovatis, non coronatis, fuscis, operculo in longiusculum corniculum attenuato.

65. *Muscus saxatilis*, minimus, tres lineas altus, foliis non multum expansis, pyramidatis, & fere triangularibus, cochlearis instar excavatis, atque in pilum longum acutis, nec non per siccitatem surculum teretem cupressi instar efficientibus, capitulis ovatis, calyptra brevissima parum, & varie dehiscente, operculo cum mucrone brevissimo.

66. *Muscus ramosus* ex viridi flavescens, vulgarissimus, foliis longis, angustis, crispis, sensim in acutum productis, magis expansis, & deorsum reflexis, quod per siccitatem crinidum retortorum instar crispantur, capitulis oblongis corniculatis.

67. *Muscus ramosus* ex viridi flavescens, minimus, foliis angustis, crispis, sensim in acutum productis, magis expansis, & retro reflexis, quod per siccitatem etiam crinidum retortorum instar crispantur, capitulis tenuioribus, corniculatis.

68. *Muscus Alpinus*, ramosus, ex viridi flavescens, foliis crispis, longis, & angustis, sensim in acutum productis, expansis, & retro reflexis, quod per siccitatem crinidum retortorum instar pulchre crispantur, capitulis longioribus, corniculatis.

69. *Muscus* pallide vivens, foliis longioribus, tenuissimis & acutissimis, eduntis, & unam partem spectantibus, capitulis brevibus, tenuioribus, erectis. In pediculis, aureis, & capillaceis pediculis, calyptra longissima operculo conoideo.



p. 112.

70. *Muscus Alpinus*, pallide virens, foliis tenuissimis, aduncis, & unam partem spectantibus, capitulis curvulis, & veluti pendulis, pediculis altioribus, insidentibus, breviter coronatis.

p. 113.

bis 70. *Muscus Alpinus*, minor, cujus portio caulis vestita, magis reclinata, foliis capillaceis, acutis, aduncis, & uno versu dispositis, capitulis erectis, tenuioribus, operculo longo sursum exserto.

71. *Muscus minimus*, sericeus, pallide virens, foliis crebris, capillaceis, longioribus, acutissimis, nonnihil aduncis, & uno latere spectantibus, capitulis curtis, gibbis, breviter coronatis, calyptra leucophylla, operculo curto & curvulo. corollis, corolla brevi, operculo . . . . .

72. *Muscus minimus*, semiuunciam circiter altus, foliis crebris, capillaceis, longioribus, acutissimis, aduncis, & uno latere spectantibus, capitulis curtis, gibbis, breviter coronatis, operculo curto & curvulo.

73. *Muscus minimus*, semiuunciam circiter altus, foliis capillaceis, variis dispositis, acutissimis, nonnihil aduncis, ex uno latere spectantibus, capitulis gibbis, breviter coronatis, operculo curto, curvulo.

74. *Muscus minor Aloë* facie, late virens, & quasi lucidus, foliis pyramidalis, floribus in superaa parte undique ornatis, quarum latera inchoa ita arcte, & valde desuper complicata, ut unum alteri coeant, capitulis corniculatis, calyptra brevi, subfusca. Tab. 89. f. 6.

75. *Muscus Alpinus*, Saxatilis, uncialis, & sexquuncialis, plerumque non ramosus, foliis expansis, angustis, undulatis, atque in obtusam cuspidem terminatis, capitulis exiguis, curvulis, curto pediculo natis, breviter coronatis, operculo in longum mucronem procurrente.

76. *Muscus minor*, ramosus, parvus, in humidis nascent, atro-viridis, foliis subrectis tenuissimis, & latiuscula basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis corniculatis, brevibus, erectis, operculo, mucrone longo, & angusto instructo.

77. *Muscus ramosus*, parvus, sordide luteus, ad fulvum colorem tendens, foliis angustissimis, & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis corniculatis brevibus, erectis, tenuioribus, operculo cum mucrone pyramidato adunco, calyptra brevi subfusca.

78. *Muscus ramosus*, parvus, foliis brevibus, expansis, & lata basi sensim in acutum apicem attenuatis, capitulis corniculatis, operculo in longum mucronem producto.



79. *Muscus parvus, ramosus, Alpinus, foliis angustissimis, magis expansis & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, nonnihil undulatis, per siccitatem etiam eleganter crispantibus, capitulis corniculatis, operculo in longum mucronem attenuato, calyptra brevi.*

80. *Muscus parvus, ramosus in humidis nascent, foliis expansis, crispis, brevibus, & lata basi sensim ad extremitatem in minus acutam cuspidem attenuatis, capitulis erectis, corniculatis, breviter coronatis, operculo simul cum subfusca calyptra brevibus.*

81. *Muscus minor, terrestris, semivivens, albus, foliis subrectis, non expansis, brevibus, & lata basi sensim ad extremitatem in minus acutam cuspidem attenuatis, capitulis corniculatis, operculo in longum mucronem exserto, calyptra brevi.*

82. *Muscus minor Terrestis, luteo-viridis, foliis oblongis, crispis, costa rubente, & lata basi sensim in minus acutum apicem attenuatis, capitulis longis, corniculatis, operculo, & calyptra longioribus.*

83. *Muscus Cespitosus minor, luteo-viridis, foliis brevibus, subrectis, & lata basi sensim in acutum minus, & sursum reflexum apicem attenuatis, capitulis erectis, curvis, corniculatis, corolla, operculo, & calyptra brevibus.*

84. *Muscus minor Cespitosus, densissimus, foliis exiguis, creberrime dispositis, & lata basi sensim in minus acutum apicem attenuatis, capitulis ovatis, operculo, & calyptra brevibus.*

85. *Muscus minimus, quatuor lineas altus, densissimus, tapeti instar per magnam tractum terram operiens, foliis creberrimis omnium brevissimis, & lata basi sensim in minus acutum apicem attenuatis, capitulis erectis, oblongis.*

p. 114.

86. *Muscus alpinus pennatus, vertebrae Piscium referens foliis capillarem tenuitatem aequantibus, capitulis corniculatis.*

87. *Muscus Pennatus Aquaticus, ramosissimus, Linariae folio, capitulis.....*

88. *Muscus Pennatus Aquaticus, ramosus, Strigosus, foliis brevibus, acutis, Capitulis.....*

89. *Muscus Pennatus, omnium minimus, capitulis in humilitate caulis erectis.*

90. *Muscus filicifolius, non ramosus, unicum longus, capitulis incurvis, circa mediam costam egredientibus.*



91. *Muscus pennatus, repens, foliis ellipticis, costa ferme carentibus, ex una parte caulis perinque tendentibus, ex altera quoque versum, Capitulis. . . .*
92. *Muscus apocarpus hirsutus, sociis adnascens, foliis acutissimis, non multum expansis.*
93. *Muscus Alpinus, viticulis longis, bifurcatis, foliis acutis, saepe reflexis, capitulis & surcalorum apicibus egredientibus*
94. *Muscus Alpinus, viticulis longis, bifurcis, procumbentibus, foliis acutis, hamatis, & unam partem spectantibus, ad ramulorum summitatem in apice flores proferentibus, Capitulis. . . . Tab. 89. f. 3.*
95. *Muscus aquaticus, ramosus, atro-virens, foliis oblongis, latiusculis, expansis, obtuse mucronatis, ac cum limbo subtus repando, capitulis cylindraceis, in foliorum alis sine pediculis, dupliciter, & pulchre coronatis.*
96. *Muscus squamosus, erectus, palustris, albicans, & sifigosus, capitulis subrotundis, absque pediculis.*
97. *Muscus squamosus, Aquaticus, Hollandicus, longissimus, & fluitans, foliis expansis, longioribus, subtilissimis, Capitulis. . . .*
98. *Muscus squamosus Filicinus, repens, atro-virens, crispus, ramulos Abietis maris, conis ornatos perbelle referens, foliis minimis subrotundis, creberrimis, ex una parte caulis appressis, altera expansis, Capitulis oblongis, erectis, pediculis quasi orbatis, calyptra subhirsuta.*
99. *Muscus squamosus, pennatus, aquaticus, ramulis confertis, foliis acutissimis, crebris, pulchre deorsum obvolutis, & unum latum spectantibus, capitulis incurvis, pediculis altioribus, insidentibus, operculo brevi.*
100. *Muscus squamosus, pennatus, Aquaticus, foliis longiusculis, acutis, unam partem spectantibus, capitulis incurvis & nonnihil aduncis, capitulis. . . .*
100. *Muscus squamosus, Pennatus, aquaticus, foliis acutissimis, crebris, pulchre deorsum obvolutis, & unam partem spectantibus, capitulis incurvis, longis pediculis insidentibus.*



102. *Muscus squamosus*, palustris, viticulis crassioribus, foliis angustis, acutissimis, aduncis, & unum latum spectantibus, capitulis brevibus, habitioribus, incurvis, operculo turbinato, brevissimo.
103. *Muscus squamosus*, minor, viticulis crassioribus, brevibus, foliis acutissimis, deorsum reflexis, & unum latum spectantibus, capitulis oblongis, curvulis, operculo acuto.
104. *Muscus squamosus* albicans, viticulis longis, compressis, tenuioribus, foliis acutissimis, aduncis, & unum latum spectantibus, capitulis brevioribus, habitioribus, nonnihil incurvis, alioribusque pediculis insidentibus, operculo brevi, firmo, acuto.
105. *Muscus squamosus*, viticulis non pennatis, tenuioribus, foliis acutissimis, unum latum spectantibus, & sursum reflexis, capitulis oblongis, parum incurvis, operculo brevi.
106. *Muscus squamosus*, Alpinus, foliis acutissimis, unum latum spectantibus, & deorsum reflexis, capitulis oblongis curvulis.
107. *Muscus squamosus*, aquaticus, longissimus, & ramosissimus, atro-virens, foliis longis, angustis, falcatis, & unum latum spectantibus, capitulis crassioribus, incurvis, brevibus pediculis insidentibus.
- p. 115. 108. *Muscus squamosus*, ramosus, palustris, minor, viticulis tenuioribus, foliis acutis, concavis, ex una parte caulis sursum, ex altera deorsum spectantibus, capitulis incurvis, operculo brevissimo.
109. *Muscus squamosus*, aquaticus, atro-virens, viticulis tenuioribus, foliis brevibus Mijrei, costa donatis, obtuse mucronatis, concavis, ex una parte cauli nonnihil appressis, altera magis expansis, & subrectis, capitulis . . . . .
110. *Muscus squamosus* Aquaticus, atro-virens, viticulis longis, tenuioribus, foliis hamatis, angustis, & unam partem spectantibus, capitulis incurvis.
111. *Muscus squamosus*, ramosus, elatior, sordide virescens, foliis Rusci, striatis, & expansis, capitulis incurvis, operculo brevissimo, mammoso.
112. *Muscus squamosus*, minor, viticulis crassioribus, foliis Rusci, capitulis incurvis, operculo cum mucrone longo & aduncis.
113. *Muscus squamosus*, terrestris, minimus, foliis expansis, capitulis incurvis, operculo brevi.



114. *Muscus Squamosus*, minor, sordide luteus, foliis Ruscii, brevibus, concavis, & striatis, non multum expansis, tenuissime denticulatis, capitulis incurvis, brevibus, operculo cum mucrone longo, & angusto.

115. *Muscus Squamosus*, minor repens, ramulis confertioribus, foliis Ruscii, costulatis, tenuissime denticulatis, & admodum expansis, capitulis incurvis, operculo cum mucrone longiore.

116. *Muscus Squamosus*, repens, minor, surculis confertioribus, aduncis, foliis Ruscii, striatis, capitulis incurvis, operculo in angustum & acutum mucronem productum.

117. *Muscus Squamosus*, minimus, surculis densioribus, pennatis, foliis Ruscii, striatis, ac tenuissime denticulatis, & admodum expansis, capitulis incurvis, operculo in longum mucronem productum.

118. *Muscus Squamosus*, repens, minimus, serici modo laevis, foliis oblongis, tenuissimis, & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, atque ex una parte caulis appressis, altera vero expansis, capitulis longioribus, operculo in longum mucronem procurrente.

119. *Muscus Squamosus* repens omnium minimus, atro-virens, non splendens, foliis oblongis, tenuissimis, & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, atque ex una parte caulis appressis, altera vero expansis, capitulis incurvis, operculo in longum mucronem productum.

120. *Muscus Squamosus*, aquaticus, parvus, viticulis crassioribus, brevibus, foliis concavis, latis, obtuse mucronatis, & quasi rotundatis, capitulis subrectis, operculo in longum mucronem productum.

121. *Muscus Squamosus*, minimus, viticulis brevioribus, teretibus, semi-unciam circiter longis, foliis Myrti, concavis, capitulis crassioribus, nonnihil incurvis, operculo in angustum mucronem longius productum.

122. *Muscus Squamosus*, Aquaticus, repens, surculis Cyperosini, foliis pyramidalis, acutis, capitulis parvis, curvulis, operculo brevi sensim in acutum productum.

123. *Muscus Filicifolius*, non ramosus, unciam longus, capitulis incurvis, mediam costam egredientibus

124. *Muscus Squamosus*, ramosus, repens, surculis, foliis, colore varians, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucronem attenuato.



125. *Muscus squamosus*, repens, ramulis confertioribus, Cupressinis, foliis triangularibus, brevibus, & concavis, capitulis incurvis, operculo mucrone longiusculo insignito.

126. *Muscus squamosus*, minimus, surculis brevibus, plerumque simplicibus, tenuioribus, foliis acutissimis, capitulis oblongis, subrectis, curvulis, operculo brevissimo.

p. 116.

127. *Muscus Alpinus*, squamosus, strigosus, erectus, luteo-viridis sericeus, foliis e lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, Capitulis . . . . .

128. *Muscus squamosus*, minimus, viticulis tenuissimis, brevibus, foliis e lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis incurvis, operculo brevissimo.

129. *Muscus squamosus*, minimus, viticulis capillaribus, parvis, & inordinate divisis, foliis e latiuscula basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis incurvis, operculo brevissimo.

130. *Muscus squamosus*, pennatus, surculis Cupressinis, parvis compressis, foliis pyramidalibus, concavis, obtuse mucronatis, in ramulorum extremitatibus ita invicem implexis, ut veluti rigidum, & obtusiusculum aculeum efficiant, Capitulis . . . . .

131. *Muscus squamosus*, fruticosus, aquaticus, atro-virens, valde compressus, foliis utrinque tendentibus, oblongis, obtuse mucronatis, & a medio ad summum tenuissima denticulatis, Capitulis . . . . .

132. *Muscus squamosus*, aquaticus, fluctans, viticulis longissimis, compressis, foliis Rusci, acutis, costa donatis, capitulis incurvis, operculo brevissimo, mammoso.

133. *Muscus squamosus*, repens, caulibus compressis, foliis Rusci minus acutis, capitulis incurvis, operculo in tuncem & longiusculum mucronem attenuato.

134. *Muscus squamosus*, repens, minor, caulibus compressis, foliis angustis, Capitulis incurvis, operculo in longum mucronem producto.

135. *Muscus squamosus*, minor, repens, viticulis compressis, foliis Rusci, concavis, in acutum apicem attenuatis, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucronem capessente et tuncem mucronem protolungato.



136. *Muscus squamosus, minimus, repens, viticulis compressis, foliis angustis, sensim in acutum productis, capitulis brevibus, incurvis, operculo in longiusculum mucroneum exprotracto.*

137. *Muscus squamosus, minimus, viticulis pennatis, foliis brevibus, pyramidatis, hinc indatendentibus capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucroneum prolongato.*

138. *Muscus squamosus, minimus, viticulis pennatis, foliis longiusculis utrinque tendentibus, pyramidatis, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucroneum attenuato.*

139. *Muscus squamosus, minimus, caulibus compressis, plerumque simplicibus, foliis angustis, acutissimis, capitulo incurvo, operculo in acutum & longiusculum mucroneum prolongato.*

140. *Muscus squamosus, ramosus, repens, ramulis Cypripiniis, aduncis, foliis oblongis, pyramidatis, concavis, capitulis brevissimis, rectis, longis pediculis insidentibus.*

141. *Muscus squamosus, repens, surculis densioribus aduncis, Myosuricoides, foliis acutissimis arctevestitis, capitulis oblongis, rectis.*

142. *Muscus squamosus, aquaticus, viticulis longissimis, chordam muscicam minorem representibus, foliis pyramidatis, acutis, costa donatis, Capitulis. . . .*

143. *Muscus squamosus, Alpinus, repens, viticulis tenuissimis, teretibus, foliis longiusculis, subrectis, pyramidatis, peracutis, capitulis oblongis sursum exprotractis, operculo brevissimo, acuto.*

144. *Muscus squamosus, repens, surculis tenuissimis, foliis Rusci, angustioribus, Capitulo oblongo, erecto, operculo brevissimo, mammoso.*

145. *Muscus squamosus, repens, perexiguus, viticulis capillaribus, foliis Rusci, in acutissimum, & longiusculum apicem tamquam pilum prolongatis, capitulis rotundis, operculo brevissimo, mammoso, pediculo sexquilineari insidente.*



146. *Muscus Squamosus, Alpinus, viticulis procumbentibus, plerumque indivisis, foliis unam partem spectantibus, capitulis erectis, brevibus pediculis insidentibus.*

147. *Muscus Squamosus minor, Alpinus, raxens, surculis tenuioribus, foliis concavis, triangularibus, unam partem spectantibus, capitulis oblongis, erectis, operculo cum mucrone brevi, acuto.*

148. *Muscus Pennatus, Splendens, arboraeus, minor, capitulis erectis, brevissimo pediculo fultis.*

149. *Muscus Squamosus, argenteus, surculis Cypripodinis, brevibus, ut plurimum indivisis, capitulis tres lineas longis, falcatis, & veluti pendulis, Cucurbitam longam representantibus, operculo brevissimo, mammoso.*

### Alga. *Marchantia*

*Marchantia*  
*Polytrichum*  
*Lin.* 1. *Marchantia major, Capitulo stellato, radiis teretibus, capsularum seminatum crenis in longiusculum veluti pilum desinentibus. flor. aurum. Tab. 1. f. 1.*  
Var. B praecedentis 2. *Marchantia Capitulo stellato, radiis teretibus. In ambulantibus hortorum, & ad umbratos, atque humidos parietes. Tab. 1. f. 2.*

3. *Marchantia foliis in medio atris, & non tepelatis, capitulo stellato, radiis teretibus. Tab. 1. f. 3.*

4. *Marchantia capitulo eleganter dissecto, radiis ad extremitatem complanatis, & infra cochlearis instar excavatis. — In aquarum stillicidiis. Tab. 1. f. 4.*

N. *foliis intense glaucis, capsulis atris crenatis, capitulis, ut jam diximus, a reliquis suis speciebus facile dignoscitur.*

Var. Y Praecedentis 5. *Marchantia Capitulo non dissecto. Circa fossas udas, ad aquarum scaturigines, &c. Tab. 1. f. 5.*

### *Hepatica*

*March. Conica. L.* 1. *Hepatica vulgaris, major, vel officinarum Italica. Ad font. scaturigines. Tab. 2. f. 1.*

*M. haemisphaerica*  
*Lin.* 2. *Hepatica media, capitulo haemisphaerico. In pariet. & sax. superficie, locis septentr. respicientibus, atque etiam ad umbratos. foss. margines. Tab. 2. f. 2.*



*Marchantia androgyna* Linn. 3. *Hepatica minor, angustifolia, capitulo hemisphaerico. Inter muscos, & saxorum crepidines.* Tab. 2. f. 3.

## *Lunularia* - pag. 4. Michel.

*March. Cruciata* Lin. 1. *Lunularia vulgaris.* - In humidis locis & fossarum aggeribus, & in spaciis hortorum ambuletis ubique copiosissima, raro florentem reperitur.

*Lunularia* dicitur a fructu Luna nascentis, vel deventantis modo falcato.

## *Marsilea* pag. 5. Michel.

*Jungermannia Epiphylla* L. 1. *Marsilea major, atro-virens, floribus albicantibus, à foliorum medio egredientibus.* T. 4. f. 1. Idem in locis ubi *Marchantia* 5 reperitur, aliisque similibus locis quae frequ.

*Jungermannia Pinguis* Lin. 2. *Marsilea media, pinguis, pallide-virens, floribus majoribus, nigricantibus, T. 4. f. 2. à foliorum latera egredientibus.* - Ubi Suprascripta.

3. *Marsilea terrestris, minima, foliis sinuatis, floribus nigricantibus, & T. 4. f. 3. foliorum lateribus provenientibus.* - In umbrosis, & humidis foss. aggeribus.

*Junag. furcata* L. 4. *Marsilea minima, angustifolia, floribus nigricantibus ex inferiori foli- T. 4. f. 4. orum parte a subhirsuta, & turbinata vagina erumpentibus.* - In umbrosis nemoribus arborum caudices circumvestiens, post diuturnam pluviam per annum vegetminat, ac floret.

pag. 6. 5. *Marsilea terrestris, minima, angustifolia, nigricans, flore sparsito.* T. 4. f. 5.

*Marsilea* dicitur a Comite Alojsio ferdinando Marsilio Bononiense.

## *Jungermannia*

*Minium Jungermannia* Lin. 1. *Jungermannia Alpina, palustris, purpurea, Cambria, foliis ro- T. 5. f. 16. tundionibus, auritis, tenuissime denticulatis.*

pag. 7. 2. *Jungermannia nemorosa, foliis acutioribus, auritis, tenuissime denticulatis.* T. 5. f. 8. flore insidente pediculo breviori.

3. *Jungermannia Alpina, supina, foliis acutioribus, auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo breviori.* - In rivulis.



pag. 7. michel.

Ordo II.

*Jungermannia* *coniplanata* L. *Jungermannia* foliis circinnatis, auritis, imbricatione dispositis, ex T. 5. f. 21.  
viridi flavescentibus. — In caudicibus arborum, & sepiariis plantis.

*Jungermannia* *asplenoides* Linn. B. *Jungermannia* major, foliis subrotundis, tenuissime denticulatis T. 5. f. 1.  
Ad aquarum rivulos, necnon in umbrosis sylvis ad arborum radices.

2. *Jungermannia* major, altera, foliis subrotundis, tenuissime denticulatis. T. 5. f. 2.

*Jungermannia* *trilobata* Linn. *Jungermannia* foliis latiusculis, obtusis, undulatis, & veluti angulosis. — Circa fossas udas sub nemorum umbris, sicut etiam in apricis eructis. T. 5. f. 10.

pag. 8.

2. *Jungermannia* *Alpina*, foliis subrotundis, latiusculis, angulosis. T. 5. f. 11.

1. *Jungermannia* *Major* foliis brevioribus, & obtusioribus, non denticulatis. — Ad arbores. T. 5. f. 3.

2. *Jungermannia* foliis oblongis, acuminatis. — Ex Anglia.

*J. Viticulosa* L. 3. *Jungermannia* *terrestris*, viticulis longis, foliis parvis, densissimis, ex rotunditate acuminatis. T. 5. f. 4.  
Ad saxa, sub umbris, & in eorum cavernis cum Lingua Cervina provenit.

*J. Polyantha* L. 4. *Jungermannia* *palustris*, repens, foliis subrotundis, densissimis, late virentibus ex rotunditate acuminatis. T. 5. f. 5.

*J. lanceolata* 5. *Jungermannia* *palustris*, minima, repens, foliis subrotundis, densissimis, late virentibus.

6. *Jungermannia* *palustris*, omnium minima, foliis subrotundis, densissimis, late virentibus. T. 5. f. 7.

*Jung. Varia* L. 1. *Jungermannia* repens foliis cordatis, carinatis. Per Cassane T. 5. f. 9.  
arum Sylvas, & ad earum radices.

*Mnium* *fissum* 2. *Jungermannia* *terrestris*, repens, foliis ex rotunditate acuminatis, bifidis, apertura pene visibili. — Ad arborum radices in sylvis, necnon in fossarum aggeribus. T. 5. f. 14.



*J. Bidentata* L. 3. *Jungermannia major*, repens, foliis bifidis.

T. 5.  
f. 12.

4. *Jungermannia minor* repens, foliis subrotundis, bifidis, vagina florum cylindracea. In Sylvanum foveis ad umbras. . . . .

T. 5. f. 13.

*J. Bicuspidata* L. 4. *Jungermannia minima*, repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea. . . . .

T. 6. f. 17.

5. *Jungermannia minima*, repens, foliis bifidis, vagina florum ventricosa. — Ipsa planta duplo minor est, quam exprimat icon. — ubi antecedens, & in Scilicidii's

T. 5. f. 15.

in Appendice

*Jungermannia Alpina*, viticulis tenuioribus, pinnatis, foliis quadratis, ac tridentatis, perexiguis. — Ad Arbores.

pag. 9.

*Jungermannia minima* foliis auritis, ex rotunditate acuminatis, flore nigricante, vagina cylindracea. T. nemora.

T. 6.  
f. 18.

2. *Jungermannia minima*, foliis auritis, ex rotunditate acuminatis, punctatis, ac veluti perforatis, floribus virescentibus, vagina cordiformi. — Ad Arborum radices. . . . .

T. 6.  
f. 19.

3. *Jungermannia omnium minima*, seu vix conspicua, Serpylli, aut Herniariae foliis, auritis, floribus ex albo-virescentibus, vagina cordiformi. — Plantula duplo minor est Icone. — p. arbores.

T. 6. f. 20.

*Jungermannia* a D. Ludovico Jungermannno. Rectore Car. horri Medici Altdorfini editi Altdorfii anno 1662. & 1677.

## Muscoides

*Muscoides squamosum*, saxatile, maximum, compressum, ex obscuro-virescens, foliis subrotundis nonnihil denticulatis. In opacis. . . . .

T. 6. f. 1.

2. *Muscoides squamosum*, majus, atro-virens, foliis subrotundis. In silvis per arborum caudices, & in vetustis parietibus, opacisque locis.

T. 6. f. 3.

3. *Muscoides squamosum*, medium, rotundifolium, atro-virens. . . . .

T. 6. f. 4.

*Jung. Tamarisci* 4. *Muscoides squamosum*, saxatile, nigro-purpureum, involucris angustioribus, foliis circinatis, minoribus. Ad arbores, & ad saxa. . . . .

T. 6. f. 5.



*Muscoides minimum*, foliis alternis, superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo femine carente. In arbor. T. 6. f. 6.  
Caudicibus &c.

*Muscoides terrestra*, repens, ex obscuro-virescens, foliis superioribus, & inferioribus ad extremitatem dentatis. Per margines, & aggeres viarum. T. 6. f. 2.

## *Targionia* pag. 3. Michel.

*Targionia minima & vulgaris.*

Tab. 3.

Lichen parvus, minimus, fructu orobi. C. B. Pin. 362.  
In ericetis, nec non in muscosis locis, & ad sylvarum margines.

*Targionia* a Doct. Cypriano Targionio Florentino  
Academico Botanico Sede.

## *Spheroкарpos* pag. 4. Michel.

*Spheroкарpos terrestris minima* In hortis in hieme, et T. 3. primovere.

*Spheroкарpos* dicitur a σφαῖρα Sphæra & καρπός  
fructus, quasi dicatur fructus sphaericus.

## *Anthoceros* pag. 10. Michel.

*Anthoceros major.* In ambulationis plerumque umbrosis, & in fossarum aggeribus. T. 7. f. 1.

2. *Anthoceros minor*, foliis magis carinatis, atque eleganter crenatis, subtus ineuroatis. In sylvis ericetis, & maccosa loca T. 7. f. 2.

*Anthoceros* dicitur a ἄνθος flos, & κέρας cornu, quasi  
diceret florem corniculatum.



## Blasia

*Blasiapusilla* Linn. *Blasia pusilla*, Lichenis pyxidati facie. Ad Scaturigines aquarum. T. 7.

*Blasia* dicta est a R. Patri Blasio Biagi congregationis Vallis-  
-umbrosæ Monacho, Botanico non gregario, &c.

pag. 15.

## Lenticula

Lent. dicitur, quod folium sit lenticulae forma.

- Lemna gibba* L. 1. *Lenticula palustris*, major, inferne magis convexa, fructu polyspermo. T. 11. f. 1.  
2. *Lenticula palustris*, media, pallide virens; inferne minus convexa, T. 11. f. 2.  
radicibus longissimis, fructu dispermo.  
3. *Lenticula palustris*, minima, atro-virens, utrinque pene convexa. T. 11. f. 3.

## Lenticularia pag. 16.

Lent. dicitur quasi planta ad Lenticulam accedens.

- Lemna polyrrhiza* L. 1. *Lenticularia* major, polyrrhiza, inferne atro-purpurea. In fossis stagn. T. 11. f. 1.  
2. *Lenticularia* media, monorrhiza, foliis oblongis, utrinque viridibus. T. 11. f. 2.  
ubi antecedens.  
3. *Lenticularia* minor, monorrhiza, foliis subrotundis, utrinque viridibus. T. 11. f. 3.  
In aquarum receptaculis.  
4. *Lenticularia* omnium minima, arrhiza. In piscinis.  
*Lemna trisulca* L. 5. *Lenticularia* ramosa, monorrhiza, foliis oblongis, pediculis lon- T. 11. f. 5.  
-gioribus donatis. In fossis lutulentis tam stagnantium, quam la-  
bentium aquarum.



## Montia

a Doctore Josepho Monti Mononicensi Botanices Professore &amp;c.

*Montia aquatica, major.* - In udis & circa lacunas & pifinas. T. 13. f. 1.*M. fontana* L. 2. *Montia aquatica, minor.* - *Portulaca arvensis*. C. B. pin. 288. T. 13. f. 2.ord. 1. & 11. *Riccia* pag. 106. Michel.  
fructu e rimis foliorum surgente, & supra acuminem foliorum planum se extollente*Riccia major*, coniandri Sapore, foliorum superficie, veluti tefe. T. 57. f. 1.  
lata, fructu subrotundo, aspero. - In herbidis montosis ab autumno  
usque ad Ver viget.2. *Riccia media*, obscure-virens, foliis alius sulcatis, in Superf. T. 57. f. 2.  
cie veluti punctatis, fructu pyramidato, glabro. - Inter muscos.

Fructu in foliorum substantia contento.

*Riccia minor, latifolia*, pinguis, aspergine Cristallina perfusa. T. 57. f. 3.  
Prunali, atque Vernali tempora in urbanis hortis ubique, & ita copiose  
crescit ut ab hac hortulani, & floricultores abhorreant.*R. Glauca* L. 2. *Riccia minima*, pinguis, foliis latiusculis, ample sulcatis, & T. 57. f. 4.  
glauco-virescentibus. Autumno germinare incipit, & usque ad totam  
Hyemem, & initio veris viget.3. *Riccia minima*, glauca, segmentis angustioribus, ad margines pili- T. 57. f. 5.  
latis. In liminibus vicarum.*R. Minima* L. 4. *Riccia minima*, nitida, segmentis angustioribus, acutis. T. 57. f. 6.*R. Chrysellina* L. *Riccia minima*, pinguis, aspergine Chrysellina perfusa. T. 57. f. 7.  
In Sylvis.6. *Riccia minima*, angustifolia, cinericia, segmentis crispis, non T. 57. f. 8.  
sulcatis. In Sylvis.7. *Riccia minima*, segmentis brevioribus, & obtusioribus, ample T. 57. f. 9.  
sulcatis. Ab autumno usque ad Aprilem inensem germinat in sylvis  
si tellus a frequenti Pluvia madefiat.*Riccia* ab Ill. mox et. *Riccio* Senatore &c. Pisano Acad. Auditore  
& Soc. Bot. florent. Socio. &c. &c.



## Salvinia

Tab. 68.

Marsilea natans. *Salvinia Vulgaris*, aquis innatans, foliis subrotundis, punctatis, late virentibus. In fossis paludosis, tam stagnantibus, quam lente fluentibus.

*Salvinia* a Doctissimo ac Celeberrimo Antonio M.<sup>o</sup> Salvinio patricio florentino valde a Cl. Micheli laudato.


































































































































































































































































































































































































































































































































Marchantia pag. 135.

Tab. 1.



Hepatica p. 135.

Tab. 2.



Tab. 4.

Lundbergia







Marsilea

Tab. 4.











fig. 1.



fig. 2. eadem ut f. 1.




Minium jungermannia L.

















Targionia

Tab. 3



Sphaerocarpos



B ● C ● D ●












Fig. 1



2












Fig. 1



Lenticula

2




3




Tab. 11.

Lenticularia


Fig. 1




2



3



5



4










Fig. 1.










Fig. 1.



Tab. 57

2.



3



4.



5.



6



7



8



9




































ordo-I.

Tab. 88.

fig. 1.  
*Clavaria*  
*hypoxylon.*

fig. 2.



ordo II

f. 2.



f. 1.





17. 181

181




181






fig. 1.


Tab. 86.



f. 2.  
Lichen pertusus.



f. 3.



Ceratospermum.

Sive κέρος cornu, et σπέρμα semen quasi. Semen cornutum.









Ordo I.

Tab. 60.

*Fistulina beylosoides* Bulliard  
*Boletus Hepaticus* L.



Ordo II.

Tab. 61.










Fig. 1.




F 2.












F2.





144

145




146








*Hydnum  
Coralloides*



3  
*Hydnum Occarium  
Gmelin. p. 1439.*



*Hydnum...  
Pectiniforme Gmel.  
p. 1439.*











p. 8.



2

p. 9.



3. Agar. Lingua Gmel. p. 1429.

p. 9.



4 p. 9.



5  
A. Caspicosus Gmel.  
pass II. pag. 1429.  
A. ochraceus Willd.  
prodr. fl. berol. n. 1098



6




7 p. 9.







fig. 1. *Peziza auricula* - Vid. Battarr. Tab. 3. F.  
 sed fig. *Michellii* Duplo Major. } *Auricularia tremelloides*  
 Bulliard. - <sup>metla</sup> *Mesenterica*  
 Comelin. p. 1440.





1837

1837

1837




7



*Tremella Nostoc. Linn.*

Tab. 67.

Fig. 1.



2

*Tremella Verrucosa Lin.*



THE



1872






f. 2.

f. 1. *Bol. suillus*.



f. 1.



3

f. 2. *B. Rubeolarius* Bulliard.  
Vid. Batarr. Tab. 30. fig. A.B.









4.  
*Boletus*  
*Infundibuliformis* Gm.  
Sicut et f. 8. & 10.

*Boletus coriaceus* Scop. var. 1. *Boletus exasperatus*  
Gmelin pars II. p. 1433.





Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or date.







*Boletus hirsutus* Gmel.

*Boletus lacteus* Gmel.











Top






18.

I

73



Vism. 7. VI.  
p. 334.  
et p. 336.  
Ag. plicatus.  
Ag. Trichopus  
Scopoli



f. 4. *Agaricus angulatus*. A. albus pileo plano, margine fimbriato repando-angulari,  
Lamellis raris, stipite elongato gracili. Gmelin. p. 1421.





ad et g. *Amietarium* Scop.  
refert.




















Chap. 78










f. 6. 8. *Ag. pileo fuscante-niveo, maculis striatis nigris subquamoso stripe tubulato valido  
 lamellisq.ue albis. Watsch. et. fung. 81. fig. 27. (B)*  
*Ag. Conspicatus. Wild. prodr. fl. berol. n. 1104 - an distincta spec. satis a citrato?*  
*(Gmel. p. 1419.)*





agaricus alliaceus. scopul.










Vitruv. Tom. VI.  
p. 334





f. c. *A. rosstratus* ,

et. pileo conico-campanulato striato plumbeo caudis cuculli rudimentis aspero,  
lamellis avris, stipite albedo, medio incrassato deorsum subulato. Gmel. p. 1428.











1

81




2

*Agaricus putridus* Scopoli



3

*Agaricus prebalus* Gmel. p. 1398.





4









*Helvella*  
*Gelatinosa*  
Bulliard.  
*H. Lubrica* Scopoli











**I**  
*Phallus Gigas.*  
 Gmelin p. 1448



**2**  
*Ph. Undosus. Gmel.*  
 Tom. II. p. 1448.



**3**  
*Phallus rete*  
 Gmel. ed. Linn. Tom. II.  
 pag. 1449.









3

*Phallus anastomosis* Gmel. ed. Linn.  
part. II. p. 1449. Tom. II.



- f. 1. *Pez. Crucibulum*. Gmel. p. 1454. n. 53.
- f. 2. *Pez. coronata*. Gmel. p. 1455. n. 57.
- f. 3. *Peziza Sceptum*. f. *Depressoglobosa* grisea extrinsecus rugosocostata, ore contracto  
vulgarum apicibus dentato, stipite albo elongato distincte inserto,  
Gmelin. Pars. II. pag. 1451. n. 6.
- f. 4. 11. *Pez. caliculata*. Gmel. p. 1452. n. 11. *Epidendra* Bull.
- f. 5. - *Pez. hians*. Gmel. p. 1453. n. 32.
- f. 8. *Helvella brunnea*. Gmel. p. 1450. n. 5.
- f. 9. *Phallus fungoides*. Gmelin. pars. II. tom. II. p. 1448.
- f. 10. *Helvella Tuba*. Gmel. p. 1451.
- f. 12. 13. *Peziza Nucans*. Gmel. p. 1452. n. 14.
- f. 14. - *Pez. conivalis* Gmel. p. 1453. n. 33.
- f. 15. *Pez. Virginea*. Gmel. p. 1453. n. 36. - *Pez. candidissima* ejusd. p. 1454. n. 40.
- f. 16. *Pez. Cruciformis*. Gmel. p. 1453. n. 35.
- f. 18. *Pez. Diadema*. Gmel. p. 1455. n. 62.
- f. 20. *Peziza Cupressi*. Gmel. p. 1454. n. 54.





*Helvella infundibuliformis*  
*Scopoli*




f. 7. *Cl. cylindrica* Gmel. p. 1445. n. 42.

f. 8. *Clavaria atra*. Gmel. et. noviss. Linn. pars II. p. 1443. n. 3.  
*Cl. pedunculata* Eiusd. p. 1445. n. 43.

f. 10. 11. *Clav. Lumbricalis* Gmelin. p. 1445. n. 44.

f. 13. *Cl. fistulosa* Gmel. p. 1445. n. 33.



















*Puccinia Halleri*  
*Glaria ~~Villanovi~~ Hill.*

Tab. 92<sup>1</sup>

fig I.



*Clavaria resinosorum*  
 Gmel. p. 1443. pars II.














f. 2. & 4.  
Mucor Mucedo L.




Mucor pag. 90.

95.



Fi.





Lycogala pag. 90.












*Mucor paniceus.*  
*Grmel. ed. Linn. p. 1485.*











*Lycoperdon  
squamosum  
Gmel. p. 1463.*



**Fig. I**  
*Lycoperdon  
gemmatum.  
Gmel. p. 1463.*



*Lycop. Lanatum Gmel. p. 1464.*



*Lycop. Muricatum Gmel. p. 1464.*




*Lycoperd. perfractum  
Gmel. p. 1464.*











*Lycopodium Caputatum* Smel. ed. Linn. novissima  
p. 1463. n. 10.



f. r. Lycopodium <sup>Polyrhizon</sup> ~~fruticosum~~ Smel. p. 1464.







Fig. I.

2




Lycosp.  
Polyrhizon  
Quel. p. 146.



3



4





f. 1. *Lycop. Geaster.* Gmel. p. 1468. n. 37.

f. 2. *L. Pedicellatum* Gmel. p. 1468. n. 38.


f. 3. *L. Corollinum* Gmel. p. 1468. n. 40.

f. 4. *L. Multifidum.* Gmel. p. 1468. n. 41.



Fig. 1

100



2




3




*Lycop. coronatum*

4



5



6













Fig. 1.



Cyathoides



3



4





178

Capitulum



179

Capitulum



































































Agaric. V. Michel. gen. 177. Tab. 6. Videretur *Fistulina hyglopora* -  
- des Mull.



*a cause d'opinion Politique*



